

护士执业资格考试《答疑周刊》2019 年第 21 期

消化系统考点汇总：

1. 鹅口疮：

主要致病菌：白色念球菌。

特征：口腔黏膜表面出现白色乳凝块样物。

漱口液：2%碳酸氢钠溶液，餐后 1 小时左右为宜。

局部治疗：局部涂抹 10 万~20 万 U/ml 制霉菌素鱼肝油混悬溶液。

鹅口疮患儿使用过的奶瓶应用 5%碳酸氢钠溶液浸泡 30 分钟后洗净再煮沸消毒。

2. 溃疡性口腔炎

主要致病菌：链球菌。

特征：口腔黏膜表面有纤维性炎性渗出物形成的灰白色假膜。

漱口液：3%过氧化氢或 0.1%依沙吡啶

局部治疗：涂 5%金霉素鱼肝油、锡类散等。

3. 疱疹性口腔炎

主要致病菌：单纯疱疹病毒。

特征：牙龈、舌、唇、颊粘膜上面覆盖黄白色纤维素性渗出物。

（疱疹性口腔炎应与柯萨奇病毒引起的疱疹性咽峡炎鉴别，疱疹性咽峡炎常发于春秋季节，疱疹主要在咽部和软腭，不累及牙龈和颊粘膜，颌下淋巴结不肿大）

漱口液：3%过氧化氢或 0.1%依沙吡啶。

局部治疗：局部可涂碘苷（疱疹净）抑制病毒，亦可喷西瓜霜、锡类散等中药。为预防继发感染，可涂 2.5%~5%金霉素鱼肝油。

4. 消化性溃疡的病因及表现小结：

鉴别点	胃溃疡（GU）	十二指肠溃疡（DU）
发病机制	保护因素减弱	侵袭因素增强
好发人群	中老年	青壮年
好发部位	胃角、胃窦小弯	十二指肠球部
疼痛规律	进食--疼痛--缓解	疼痛--进食--缓解
疼痛部位	剑突下正中或偏左	上腹正中或偏右
疼痛发作时间	进食后 1h 内疼痛，餐后痛	饥饿痛、夜间痛

5. 消化性溃疡常见并发症：

出血	最常见，呕血与黑便，DU 最多见
穿孔	痛难忍，抑酸不缓解，腹膜刺激征，膈下游离气体
幽门梗阻	反酸、嗝气、餐后重，呕酸宿食可减轻，低氯钾碱中毒
癌变	极少

