

【儿童口腔医学】

乳牙列中, 龋好发牙位

- A. 下颌乳磨牙
- B. 上颌乳磨牙
- C. 乳尖牙
- D. 乳中切牙
- E. 乳侧切牙

【正确答案】A

【答案解析】

乳牙患龋以下颌乳磨牙最多, 上颌乳磨牙和上颌乳前牙为次, 下颌乳前牙最少。乳牙龋病好发牙面为乳切牙的近中面和唇面, 乳尖牙的唇面和远中面, 第一乳磨牙的咬合面和远中面, 第二乳磨牙的咬合面和近中面。乳牙患龋成对称性, 左右同名牙可同时患龋。

【儿童口腔医学】

乳牙患龋几岁达到患龋高峰

- A. 2~3岁
- B. 3~4岁
- C. 5~8岁
- D. 9~10岁
- E. 11~12岁

【正确答案】C

【答案解析】

我国乳牙患龋情况的报道显示1岁左右起即直线上升, 5~8岁时达到高峰。

【牙周病学】

通过牙周探诊显示最有意义的指标是

- A. 牙周袋的深度
- B. 探及龈下牙石
- C. 袋内溢脓
- D. 附着水平
- E. 探诊出血

【正确答案】D

【答案解析】

牙周探诊是牙周炎诊断中最重要的检查方法。主要目的是了解有无牙周袋或附着丧失, 并探测其深度和附着水平, 此外, 还应观察探诊后是否出血, 探测龈下牙石的量及分布, 根分叉

是否受累。

【牙周病学】

与牙周炎关系密切的全身疾病是

- A. 肺炎
- B. 胆囊炎
- C. 胃炎
- D. 肾病
- E. 糖尿病

【正确答案】 E

【答案解析】

糖尿病伴发牙周病的病理机制可能是白细胞趋化和吞噬功能缺陷、组织内血管基底膜的改变、胶原合成减少、骨基质形成减少, 以及免疫调节能力下降, 使患者的抗感染能力下降、伤口愈合障碍。近年来发现, 糖化末端产物 (AGES) 与其细胞受体 (RAGE) 作用的加强是糖尿病患者牙周病加重的机制。