

【牙体牙髓病学】

下列急性根尖周炎骨膜下脓肿阶段的临床表现除外的是

- A. 移行沟变平
- B. 体温升高约 38℃
- C. 根尖部牙龈肿胀局限, 呈半球形隆起
- D. 白细胞增高
- E. 区域淋巴结肿大

【正确答案】C

【答案解析】急性化脓性根尖周炎的过程经历三个阶段, 其临床表现如下: ①根尖周脓肿: 自发持续性剧烈跳痛, 伸长感加重, 触痛重, 叩痛(+++), 松动Ⅱ~Ⅲ度, 患牙根尖部相应的唇、颊侧牙龈潮红, 有扞痛、肿胀不明显; ②骨膜下脓肿: 上述症状加重, 患者痛苦面容、根尖区牙龈肿胀明显、移行沟变平, 扞痛并有深部波动感; 区域淋巴结肿大、压痛, 相应面颊部软组织呈反应性水肿; 体温可有升高(约 38℃)。末梢血象白细胞增多(计数 1.0 万~1.2 万/mm³)。患牙所属区域的淋巴结可出现肿大和扞痛; ③黏膜下脓肿: 上述症状明显减轻, 相应根尖部的牙龈肿胀局限, 呈半球形隆起, 叩痛(+++), 扞诊波动感明显, 全身症状缓解。

【牙体牙髓病学】

急性根尖周炎最常见的典型自然排脓途径

- A. 根尖孔→根管→髓腔
- B. 根尖周→骨膜下→黏膜下
- C. 根尖周→骨膜下→皮肤下
- D. 根尖周→牙周间隙→龈沟
- E. 根尖周→骨髓腔→上颌窦

【正确答案】B

【答案解析】根尖周→骨膜下→黏膜下, 此排脓方式是急性根尖周炎最常见的典型自然发展过程。这种排脓途径较复杂, 并常伴发颌面部蜂窝组织炎。

【口腔黏膜病学】

以下关于带状疱疹描述正确的是

- A. 由水痘-带状疱疹病毒(HIV)所引起
- B. 侵犯儿童可引起带状疱疹
- C. 以弥散性小水疱为特征
- D. 以沿双侧周围神经分布
- E. 通常伴有明显的神经痛

【正确答案】E

【答案解析】带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒(VZV)所引起的,以沿单侧周围神经分布的簇集性小水疱为特征,常伴有明显的神经痛。水痘-带状疱疹病毒为本病的致病病原体,侵犯儿童可引起水痘,在成年人及老年人则引起带状疱疹。

【口腔黏膜病学】

下面哪项不是急性疱疹性口炎与疱疹样口疮的区别

- A. 好发年龄不同
- B. 性别差异
- C. 前者为急性发作、全身反应较重;后者为反复发作、全身反应较轻
- D. 前者病损表现为成簇小水疱;后者病损表现为散在小溃疡
- E. 前者病损可伴皮肤损害;后者病损无皮肤损害

【正确答案】B

【答案解析】口疮在临床上多见,最常见的是轻型,溃疡为圆形或椭圆形,数目一般较少亦较表浅,故不留瘢痕,若有感染则溃疡扩大且加深,但这种情况少见。重型往往有轻型的病史,多为1~2个大而深的溃疡或同时有1~2个较小的溃疡。病程长,疗效差。疱疹样口疮,溃疡小而数目多,散在分布呈口炎形式。周围黏膜充血,这与疱疹性口炎常难以区别。疱疹性口炎与疱疹样口疮无明显的性别差异。