

2020年《中药学综合知识与技能》模考大赛（三）

关注【正保医学教育网执业药师考试】公众号
及时获取更多执业药师考试资讯！



一、最佳选择题

1. 以《内经》理论为指导，理论联系实际，开创了内伤杂病辨证论治的体系的医学典籍是

- A. 《伤寒论》
- B. 《金匱要略方论》
- C. 《千金翼方》
- D. 《外台秘要》
- E. 《太平圣惠方》

【正确答案】B

【答案解析】《金匱要略方论》全书以《内经》理论为指导，理论联系实际，开创了内伤杂病辨证论治的体系，对后世临床医学的发展有深远影响。

2. 以下关于服药方式的表述，说法错误的是

- A. 咽喉含片是将药物含于口中，然后合并双唇，避免搅动舌头，直至药物完全溶解，在用药过程中应避免吃喝吞咽、抽烟等动作，不可咀嚼或吞咽药物
- B. 老人、儿童及吞咽困难的患者可将缓控释制剂碾碎服用
- C. 含服剂用药时需保持口腔湿润
- D. 胶剂可用水或黄酒加热熔化后服用，或兑入煎好的药液中加热烊化服用
- E. 茶剂用时以沸水泡汁或煎汁，不定时饮用

【正确答案】B

【答案解析】丸剂、散剂、片剂、胶囊剂等固体剂型通常直接以温开水送服。其中大蜜丸可咀嚼服用，或搓成小丸服用；老人、儿童及吞咽困难的患者可将普通片剂等碾碎服用，但应注意缓控释制剂不可碾碎，以免影响药物的生物利用度，如雷公藤缓释片等。含服剂用药时需保持口腔湿润，其中舌下含服速效救心丸、复方丹参滴丸、冠心病丹参滴丸等应将药物放于舌下。咽喉含片（丸）如草珊瑚含片、金嗓子喉宝、清咽滴丸等是将药物含于口中，然后合并双唇，避免搅动舌头，直至药物完全溶解，在用药过程中应避免吃喝吞咽、抽烟等动作，不可咀嚼或吞咽药物。颗粒剂用开水冲服。口服液、糖浆剂可直接服用。煎膏剂可以用温开水化开后服用。胶剂可用水或黄酒加热熔化后服用，或兑入煎好的药液中加热烊化服用，如阿胶、鳖甲胶、鹿角胶等。茶剂用时以沸水泡汁或煎汁，不定时饮用。

3. 中医学理论认为，“症”“证”“病”三者含义不同，下列表述中属于“病”的是

- A. 湿热

- B. 肝郁
- C. 肺胀
- D. 气虚
- E. 瘀血

【正确答案】C

【答案解析】病，即疾病的简称，指有特定的致病因素、发病规律和病理演变的异常病变过程，具有特定的症状和体征。ABDE 均为证，C 为病。

4. 任何疾病，尽管它的临床表现错综复杂，千变万化，但都可用阴或阳来加以概括辨析而运用于疾病的诊断辨证之中。下列疾病现象中属于阴的是

- A. 面色鲜明
- B. 咳声有力
- C. 脉象滑数
- D. 声低气怯
- E. 脉象洪大

【正确答案】D

【答案解析】在诊法方面，用阴阳的属性来分析四诊收集到的临床症状和体征。如以色泽的明暗分阴阳，鲜明者为病在阳分，晦暗者为病在阴分。以声息的动态分阴阳属性，语声高亢洪亮、多言而躁动者，多属实、属热，为阳；语声低微无力、少言而沉静者，多属虚、属寒，为阴；呼吸微弱，声低气怯，多属于阴证；呼吸有力，声高气粗，多属于阳证。以脉象部位分阴阳，则寸为阳，尺为阴；以至数分，则数者为阳，迟者为阴；以形态分，则浮大洪滑为阳，沉小细涩为阴。

5. 某女，28 岁。夫妻二人因琐事争吵，情志波动较大，且伴有胃脘胀满，不思饮食等情况。根据五行学说分析，此属

- A. 木疏土
- B. 木克土
- C. 木乘土
- D. 木侮土
- E. 土侮木

【正确答案】C

【答案解析】相乘，是相克太过致病。如由于肝气郁结或肝气上逆，影响脾胃的运化功能，即木旺乘土。

6. 因恐惧过度而出现二便失禁，摄纳不住的表现是

- A. 气上的症状
- B. 气下的症状
- C. 气乱的症状
- D. 气结的症状
- E. 气消的症状

【正确答案】B

【答案解析】恐则气下：是指恐惧过度，因恐而伤及肾气，肾气不固，可见二便失禁，摄纳不住；或恐惧不解，肾精不固，而发生腰酸膝软、遗精等病症。

7. 中医诊断学用以分辨疾病病位与病势浅深的纲领是

- A. 表里
- B. 寒热

- C. 虚实
- D. 五行
- E. 阴阳

【正确答案】 A

【答案解析】 表里用以分辨疾病病位与病势的浅深。

8. 某男, 70岁。症见目光晦暗, 瞳仁呆滞, 精神萎靡, 反应迟钝, 呼吸微弱。其临床意义是

- A. 假神
- B. 得神
- C. 失神
- D. 神乱
- E. 癫病

【正确答案】 C

【答案解析】 在疾病过程中, 如患者表现为目光晦暗、瞳仁呆滞、精神萎靡、反应迟钝、呼吸气微, 甚至神识昏迷、循衣摸床、撮空理线, 或猝倒而目闭口开、手撒、遗尿等, 均称为“失神”或“无神”。“失神”, 表示正气已伤, 病情严重, 预后不良。

9. 直肠癌患者的大便常表现为

- A. 脓状便
- B. 鲜血便
- C. 细条便
- D. 柏油便
- E. 白陶土便

【正确答案】 C

【答案解析】 细条便为直肠狭窄的表现, 主要见于直肠癌等。

10. 诊断心肌梗死最特异和敏感的首选标志物是

- A. UA
- B. Cr
- C. cTn
- D. FBG
- E. AMY

【正确答案】 C

【答案解析】 肌钙蛋白(cTn)是诊断心肌梗死最特异和敏感的首选标志物, cTn I是其中之一, 其生理作用是抑制肌动蛋白中的ATP酶活性, 使肌肉松弛, 防止肌纤维收缩。

11. 瘀血所致的崩漏证, 在治疗时应采取的治法是

- A. 热因热用
- B. 寒因寒用
- C. 塞因塞用
- D. 通因通用
- E. 实则泻之

【正确答案】 D

【答案解析】 通因通用: 通因通用又称“以通治通”, 是指针对通泄的临床表现, 用通利药物进行治疗。适用于因实而出现通利假象的真实假虚证。如热结旁流、湿热淋证、瘀血崩漏等。

12. 症见寒热往来, 胸胁苦满, 不欲饮食, 口苦咽干, 舌苔薄白, 脉弦, 治宜可选用的治法是

- A. 汗法
- B. 和法
- C. 温法
- D. 消法
- E. 补法

【正确答案】 B

【答案解析】 和法原为和解少阳而设, 适用于病在半表半里的少阳证。后世医家在和解少阳法的基础上, 扩展出调和肝脾法、调和肠胃法等。

和解少阳法: 适用于邪犯少阳之证。症见寒热往来, 胸胁苦满, 不欲饮食, 心烦喜呕, 口苦, 咽干, 目眩。舌苔薄白, 脉弦。

13. 某男, 64岁, 近一月来寒热持续不解, 恶寒较甚, 发热无汗, 身楚倦怠, 咳嗽, 咯痰无力, 舌淡苔白, 脉浮无力。治疗方剂宜首选

- A. 新加香薷饮
- B. 葱白七味饮
- C. 参苏饮
- D. 荆防败毒散
- E. 清瘟败毒饮

【正确答案】 C

【答案解析】 气虚感冒

【症状】 发热, 恶寒较甚, 无汗, 头痛鼻塞, 身楚倦怠, 咳嗽, 痰白, 咳痰无力。舌淡, 苔白, 脉浮而无力。

【治法】 益气解表。

【方剂应用】 基础方剂: 参苏饮。

14. 某女, 14岁。咳嗽多日, 痰黏, 色黄, 咽痛, 声音嘶哑, 舌边尖红, 苔微黄, 脉浮数。中医上应辨证为

- A. 风热犯肺证
- B. 风寒袭肺证
- C. 痰热郁肺证
- D. 痰湿壅肺证
- E. 风燥伤肺证

【正确答案】 A

【答案解析】 咳嗽——风热犯肺证【症状】 咳嗽频剧, 气粗, 或咳声嘎哑, 咳痰不爽, 痰黏稠或稠黄, 喉燥咽痛, 口渴, 鼻流黄涕, 头痛, 肢楚, 恶风身热。舌边尖红, 苔薄黄, 脉浮数。

15. 可参考喘证来辨证论治的西医疾病是

- A. 上呼吸道感染
- B. 多种神经症
- C. 肺源性心脏病
- D. 胃食管反流病
- E. 慢性肾脏疾病

【正确答案】 C

【答案解析】 喘即气喘、喘息。喘证是以呼吸困难, 甚至张口抬肩、鼻翼扇动、不能平卧为特征的疾病。西医学的肺炎、支气管炎、肺气肿、肺源性心脏病、心源性哮喘以及癆病等发生呼吸困难时, 可参考此内容辨证论治。

16. 肺胀是多种肺系疾患反复发作, 迁延不愈, 导致肺气胀满, 不得敛降的疾病。以下不属于肺胀疾病的临床表现是

- A. 胸部膨满, 憋闷如塞
- B. 喘息上气, 咳嗽痰多
- C. 烦躁心悸, 面色晦暗
- D. 唇甲青紫, 脘腹胀满
- E. 张口抬肩, 鼻翼煽动

【正确答案】 E

【答案解析】 肺胀是多种肺系疾患反复发作, 迁延不愈, 导致肺气胀满, 不得敛降的疾病, 临床表现为胸部膨满, 憋闷如塞, 喘息上气, 咳嗽痰多, 烦躁, 心悸, 面色晦暗, 或唇甲青紫, 脘腹胀满, 肢体浮肿等。西医学中慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心脏病有上述表现者, 可参考此内容辨证论治。

E 属于喘证的临床表现。

17. 周某某, 男, 18 岁, 夏季贪凉, 半小时之内吃了冰糕 3 个, 出现了胃痛暴作的症状, 喜温, 口和不渴, 喝热水后痛减, 舌淡, 苔薄白, 脉弦紧, 中医应辨证为

- A. 寒邪客胃证
- B. 饮食伤胃证
- C. 肝气犯胃证
- D. 湿热中阻证
- E. 脾胃虚寒证

【正确答案】 A

【答案解析】 胃痛——寒邪客胃证

【症状】 胃痛暴作, 喜温恶寒, 得温痛减, 口和不渴, 或喜热饮。舌淡, 苔薄白, 脉弦紧。

18. 某男, 56 岁。眩晕, 头重昏蒙, 伴视物旋转, 胸闷恶心, 呕吐痰涎, 食少多寐, 舌苔白腻, 脉濡。治宜选用

- A. 天麻钩藤饮
- B. 黄连温胆汤
- C. 藿香正气散
- D. 半夏厚朴汤
- E. 半夏白术天麻汤

【正确答案】 E

【答案解析】 眩晕——痰湿中阻证

【症状】 眩晕, 头重昏蒙, 或伴视物旋转, 胸闷恶心, 呕吐痰涎, 食少多寐。舌苔白腻, 脉濡。

【治法】 化痰祛湿, 健脾和胃。

【方剂应用】 基础方剂: 半夏白术天麻汤(半夏、白术、天麻、橘红、茯苓、甘草、生姜、大枣)

19. 下列哪项不是积证的特征

- A. 结块有形
- B. 结块固定不移
- C. 痛有定处
- D. 病在气分
- E. 是为脏病

【正确答案】 D

【答案解析】积属有形，结块固定不移，痛有定处，病在血分，是为脏病；聚属无形，包块聚散无常，痛无定处，病在气分，是为腑病。

20. 患者夜寐盗汗，五心烦热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。治疗应首选

- A. 黄连阿胶汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 当归六黄汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 甘麦大枣汤

【正确答案】C

【答案解析】汗证——阴虚火旺证

【症状】夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。

【治法】滋阴降火。

【方剂应用】基础方剂：当归六黄汤（当归、生地黄、熟地黄、黄连、黄芩、黄柏、黄芪）加减。

21. 瘀血腰痛，治宜选用的方剂是

- A. 身痛逐瘀汤加减
- B. 少腹逐瘀汤加减
- C. 血府逐瘀汤加减
- D. 膈下逐瘀汤加减
- E. 补阳还五汤加减

【正确答案】A

【答案解析】腰痛——瘀血腰痛【方剂应用】基础方剂：身痛逐瘀汤（秦艽、川芎、桃仁、红花、甘草、羌活、没药、当归、五灵脂、香附、牛膝、地龙）加减。

22. 某女，33岁，患有毛囊炎，皮肤红肿疼痛，溃后有少量脓液，治宜选用的中成药是

- A. 连翘败毒丸
- B. 芩连片
- C. 如意金黄散
- D. 老鹤草软膏
- E. 知柏地黄丸

【正确答案】D

【答案解析】患者为湿热蕴结所致的疖，治疗可选用的中成药有皮肤病血毒丸、老鹤草软膏。

23. 某女，28岁。乳房胀痛半年，左侧乳房有肿块，月经前增大明显，伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦，苔薄黄，脉弦滑。治疗宜采用的相应治法是

- A. 温阳化痰，疏肝解郁
- B. 疏肝解郁，理气畅中
- C. 健脾养心，补益气血
- D. 疏肝理气，活血化瘀
- E. 疏肝解郁，化痰散结

【正确答案】E

【答案解析】乳癖——肝郁痰凝证【治法】疏肝解郁，化痰散结。

24. 某妇人月经错后, 经量少, 色暗淡, 质清稀, 腰膝酸软, 头晕耳鸣, 面色晦暗, 舌淡, 苔薄白, 脉沉细。应选方

- A. 生化汤
- B. 归肾丸
- C. 温经汤
- D. 乌药汤
- E. 大补元煎

【正确答案】B

【答案解析】月经后期——肾虚证【方剂应用】基础方剂: 归肾丸(菟丝子、茯苓、山药、熟地、杜仲、当归、山茱萸、枸杞子)加减。

25. 某患者, 经行量多, 色紫黑, 有血块, 经行小腹疼痛, 经前腹胀, 舌质紫黯, 舌边尖有瘀点, 脉涩。最佳选方为

- A. 补阳还五汤
- B. 桃红四物汤
- C. 失笑散
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】C

【答案解析】根据患者症状“舌质紫暗, 舌尖有瘀点”等可辨证为月经过多——血瘀证。月经过多——血瘀证【方剂应用】基础方剂: 失笑散(炒蒲黄、五灵脂)加减。

26. 带下过多脾虚湿盛证治宜选方

- A. 一贯煎
- B. 完带汤
- C. 内补丸
- D. 止带方
- E. 参苓白术散

【正确答案】B

【答案解析】带下过多——脾虚湿盛证【方剂应用】基础方剂: 完带汤(人参、白术、山药、苍术、陈皮、柴胡、白芍、黑芥穗、车前子、甘草)加减。

27. 治疗厌食脾胃气虚证的首选方剂是

- A. 保和丸
- B. 异功散
- C. 四君子汤
- D. 补中益气汤
- E. 健脾丸

【正确答案】B

【答案解析】厌食——脾胃气虚证【方剂应用】基础方剂: 异功散(人参、白术、茯苓、陈皮、甘草)加减。

28. 某女, 58岁。咽部疼痛, 咳嗽时疼痛加剧, 咽部红肿, 颌下有髂核; 伴见发热恶风, 头痛, 咳嗽痰黄。舌质红, 苔黄, 脉浮数。治宜选方

- A. 养阴清肺汤
- B. 疏风清热汤

- C. 清咽利膈汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 瓜蒌薤白半夏汤

【正确答案】 B

【答案解析】 根据患者的症状“发热恶风，脉浮数，舌红苔黄”等可辨证为风热外袭型咽喉肿痛。咽喉肿痛——风热外袭证【方剂应用】基础方剂：疏风清热汤（荆芥、防风、牛蒡子、甘草、金银花、连翘、桑白皮、赤芍、桔梗、黄芩、天花粉、玄参、浙贝母）加减。

29. 某女，68岁。近期常感鸣如蝉，昼夜不息，安静时尤甚，听力逐渐下降。有腰膝酸软，头晕目眩，舌淡红，少苔，脉细弱。治疗应选用的治法是

- A. 清肝泻火，利湿通窍
- B. 疏风清热，宣肺利窍
- C. 补肾填精，滋耳复聪
- D. 健脾益气，聪耳通窍
- E. 清肝泻火，开郁通窍

【正确答案】 C

【答案解析】 根据患者症状应辨证为肾精亏损型耳鸣。耳鸣耳聋——肾精亏损证【治法】补肾填精，滋耳复聪。

30. 功能清热解毒，化瘀。可用于胆囊瘀肿，巩膜黄染，消化不良，中毒症，对黄疸性肝病疗效最佳的藏成药方剂是

- A. 十一味金色丸
- B. 十味黑冰片丸
- C. 二十九味能消散
- D. 萨热十三味鹏鸟丸
- E. 十三味薪冥丸

【正确答案】 A

【答案解析】 十一味金色丸，由金色诃子、黑冰片、波棱瓜子等11味药制成。功能清热解毒，化瘀。用于胆囊痞肿，巩膜黄染，消化不良，中毒症。对黄疸性肝病疗效最佳。

技巧：金黄。金=十一味金色丸，黄=巩膜黄染，黄疸性肝病。

31. 处方写枣皮，应付

- A. 吴茱萸
- B. 大枣
- C. 甘草
- D. 山茱萸
- E. 牡丹皮

【正确答案】 D

【答案解析】 山茱萸的别名有山萸肉、杭山萸、枣皮。

32. 使君子为治蛔虫病、蛲虫病之佳品，又为治小儿疳积之要药。小儿在用药时，一般炒香嚼服，一日总量不超过

- A. 5粒
- B. 10粒
- C. 15粒
- D. 20粒
- E. 25粒

【正确答案】D

【答案解析】使君子：小儿每岁1~1.5粒，炒香嚼服，一日总量不超过20粒。

33. 金匱肾气丸治疗肾虚作喘时，若久病不愈，兼有咽干烦躁者，常配以

- A. 参苓白术散
- B. 柴胡疏肝散
- C. 沙参麦冬汤
- D. 附子理中丸
- E. 麦味地黄丸

【正确答案】E

【答案解析】用金匱肾气丸补火助阳、纳气平喘功效治疗肾虚作喘；若久病不愈，阳损及阴，兼有咽干烦躁者，又应当配以麦味地黄丸或生脉散防止金匱肾气丸燥烈伤阴。

34. 《中国药典》“凡例”中，对中药[贮藏]项下的各名词术语进行了详细的解释，下面关于各名词术语的解释，说法错误的是

- A. 遮光系指用不透光的容器包装
- B. 避光系指避免日光直射
- C. 阴凉处系指不超过18℃的环境
- D. 冷处系指2℃~10℃的环境
- E. 常温系指10℃~30℃的环境

【正确答案】C

【答案解析】阴凉处系指不超过20℃的环境。故C项描述错误。

35. 中药养护中吸湿防潮法可采用的干燥剂是

- A. 干冰
- B. 生石灰
- C. 熟石灰
- D. 氯化钠
- E. 氢氧化钙

【正确答案】B

【答案解析】生石灰块，又名氧化钙，是传统养护方法中一种主要的吸潮剂。另无水氯化钙，是一种白色无定形的固体，也可作为干燥剂，重复使用。

36. 在合理用药的原则中，安全的含义首先是指

- A. 使用有毒药物时，应考虑是否适当
- B. 使用有毒药物时，应考虑选择合理剂量
- C. 应考虑所选药物是否安全，是否会对患者造成不良反应
- D. 应考虑用药出现不良反应后，是否另行选药
- E. 应考虑用药后如出现意外，是否有相应的处理措施

【正确答案】C

【答案解析】所谓安全，即保证用药安全。一名合格的执业药师在建议临床医师或指导患者使用中药或中成药时，必须把保证患者用药安全放在首位。无论所使用的药物是有毒者，还是无毒者，均应首先考虑所用药物是否安全，是否会对患者造成不良反应。

37. 当归四逆汤温经散寒，养血通脉，治疗血虚寒厥证。方中所用当归为

- A. 生当归
- B. 酒当归
- C. 土炒当归
- D. 盐当归
- E. 麸炒当归

【正确答案】A

【答案解析】当归四逆汤〔组成〕生当归桂枝去皮芍药细辛甘草炙通草大枣。

〔功用〕温经散寒，养血通脉。

〔主治〕血虚寒厥证。手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝。

38. 顺铂对于治疗恶性肿瘤有很好的临床疗效，但其易造成肝肾损伤。为保护肝肾，此时可联用的中药注射液是

- A. 参麦注射液
- B. 香丹注射液
- C. 艾迪注射液
- D. 丹红注射液
- E. 双黄连注射液

【正确答案】C

【答案解析】肿瘤患者接受化疗后常出现燥热伤津的阴虚内热或气阴两虚，治以滋阴润燥清热或益气养阴中药而取效。顺铂对于治疗恶性肿瘤有很好的临床疗效，但其易造成肝肾损伤，临床常将艾迪注射液和顺铂联用，艾迪注射液可能通过抗氧化作用，对肝肾均起保护作用。

39. 青黛有清热解毒、凉血消斑、泻火定惊的功效，用量1~3g，其不良反应不严重，有极少数的高敏患者会出现严重的不良反应，如转氨酶升高、头痛、水肿、红细胞减少、血小板减少，甚至骨髓严重抑制表现。此类伤害可能为

- A. 副作用
- B. 毒性作用
- C. 过敏反应
- D. 后遗作用
- E. 药物依赖性

【正确答案】C

【答案解析】与药物剂量无关的中药不良反应：该类型与药物固有的正常药理作用无关，而与药物变性（如药物有效成分降解产生有害物质）和人体特异体质（指患者的特殊遗传素质）有关。该类型与用药剂量无关，难以预测，经常规的毒理学筛选也很难发现，发生率虽较低，但危险性大，病死率较高。如青黛有清热解毒、凉血消斑、泻火定惊的功效，用量1~3g，其不良反应不严重，仅少量患者用药后有轻度恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹胀等胃肠道刺激症状，但仍有极少数的高敏患者会出现严重的不良反应，如转氨酶升高、头痛、水肿、红细胞减少、血小板减少，甚至骨髓严重抑制表现。此类伤害又可分为两种。（1）特异质反应；（2）过敏反应。

40. 因含有朱砂，如过量服用，可致急性肾功能衰竭的中成药是

- A. 牛黄上清丸
- B. 天王补心丸
- C. 牛黄降压丸
- D. 冠心苏合丸
- E. 牛黄解毒丸

【正确答案】B

【答案解析】含朱砂的中成药：安宫牛黄丸、牛黄清心丸、朱砂安神丸、天王补心丹、安神补脑丸、苏合香丸、人参再造丸、大活络丹等过量服用可产生各种中毒症状。泌尿系统表现为少尿、蛋白尿，严重者可致急性肾功能衰竭。

二、配伍选择题

1. A. 阴病治阳
- B. 阴中求阳
- C. 阳病治阴
- D. 阳中求阴
- E. 阴阳格拒

1) “益火之源，以消阴翳”的治法对应的治疗原则是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 若阳虚不能制阴而造成阴盛者，属虚寒证，不宜用辛温发散药以散阴寒，须用“益火之源，以消阴翳”即扶阳益火之法，以消退阴盛。这种治疗原则也称为“阴病治阳”。

2) “壮水之主，以制阳光”的治法对应的治疗原则是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 阴虚不能制阳而致阳亢者，属虚热证，一般不能用寒凉药直折其热，须用“壮水之主，以制阳光”即用滋阴壮水之法，以抑制阳亢火盛。这种治疗原则亦称为“阳病治阴”。

2. A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

1) 被称为“先天之本”的脏腑是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 肾藏有“先天之精”，为脏腑阴阳之本，生命之源，故称为“先天之本”。

2) 被称为“后天之本”的脏腑是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】脾为“后天之本”。饮食物由胃受纳腐熟，必须依赖于脾的运化功能，才能将水谷转化为精微物质，转输到心肺，布散于全身，从而使各个脏腑、组织、器官得到充足的营养，并通过心肺的作用化生气血，故“脾为后天之本，气血生化之源”。

3. A. 督脉
B. 任脉
C. 带脉
D. 络脉
E. 冲脉

1) 调节阳经气血，被称为“阳脉之海”的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】督脉调节阳经气血，故称“阳脉之海”。

2) 调节阴经气血，被称为“阴脉之海”的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】任脉调节阴经气血，故称“阴脉之海”。

3) 可以调节十二经气血，称为“十二经脉之海”的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】冲脉，调节十二经气血，故称“十二经脉之海”。

- 4. A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

1) 某女，41岁。闭经半年余，妊娠反应阴性，体检无其他疾病，来医院就诊。辨证为冲任亏虚、天癸早衰。根据藏象理论，与天癸密切相关的脏是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】肾精能化生“天癸”。所谓“天癸”，是随着肾中精气不断充盈，所产生的具有促进人体生殖器官发育成熟和维持人体生殖功能作用的精微物质。

2) 某女，35岁，经常情志抑郁，善太息，食少纳呆，月经不调，诊断为郁证。根据藏象理论，主司疏泄、条畅气机的脏是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】肝主疏泄，可调畅情志：情志活动以气机调畅、气血调和为重要条件。“肝喜条达而恶抑郁”为其生理特性。肝的疏泄功能正常，气机调畅，气血和平，则心情舒畅，情志活动才能正常。肝的疏泄功能障碍，气机失于调畅，则会导致精神情志活动的异常，如易于抑郁、善怒等。

- 5. A. 实中夹虚
- B. 虚中夹实
- C. 真虚假实
- D. 真实假虚
- E. 因虚致实

1) 某男，40岁。腹满痛拒按，潮热谵语，但下利清水。辨证为热结旁流，病机为“大实有羸状”，属于

- A.
- B.
- C.
- D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】因实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达，可导致真实假虚证，称为“大实有羸状”。

2) 某男，62岁。腹胀腹痛，时胀时止，食少便溏。自行服用气滞胃痛颗粒，症状不减。辨证为脾失健运，病机为“至虚有盛候”属于

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】C

【答案解析】因脏腑的气血不足，运化无力，可导致真虚假实证，称为“至虚有盛候”。

6. A. 水肿

B. 津液亏耗

C. 肝经风热

D. 脾虚

E. 肝风

目为肝之窍，同时五脏六腑之精气皆上注于目，故眼目的异常变化，不仅关系于肝，而且也能反映其他脏腑的病变。

1) 眼胞红肿，多为

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】C

【答案解析】眼胞红肿，多为肝经风热。

2) 目胞浮肿，如卧蚕状，多为

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】A

【答案解析】目胞浮肿，如卧蚕状，多为水肿。

3) 小儿睡眼露睛，多为

A.

B.

- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】小儿睡眼露睛，多属脾虚，气血不足。

- 7. A. 痰色白而清稀
- B. 痰色黄色黏稠
- C. 痰少难以排出
- D. 痰白易咯量多
- E. 咳吐脓血如粥

1) 寒痰多为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】痰色白而清稀，多为寒证。

2) 热痰多为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】痰色黄或白而黏稠者，多属热证。

3) 湿痰多为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】痰白易咯而量多者，为湿痰。

4) 燥痰多为

- A.
- B.

- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】痰少极黏，难以排出者，多属燥痰。

- 8. A. 气微
- B. 气粗
- C. 哮证
- D. 实喘
- E. 虚喘

1) 喘气时喉中有哮鸣声的现象，多为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】哮，是喘气时喉中有哮鸣声的现象。

2) 喘息气粗，声高息涌，唯以呼出为快，多为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】喘，指呼吸困难，短促急迫，甚则鼻翼扇动，或张口抬肩，不能平卧的称为喘。喘有虚实之分。若喘息气粗，声高息涌，唯以呼出为快的，属实喘，多因肺有实邪，气机不利所致。

3) 喘声低微息短，呼多吸少，气不得续，多为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】若喘声低微息短，呼多吸少，气不得续的，属虚喘，乃肺肾气虚，出纳无力之故。

9. A. 热因热用
B. 寒因寒用
C. 塞因塞用
D. 通因通用
E. 虚则补之

1) 对热结旁流应采用的治疗方法是

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】D

【答案解析】热结旁流，是阳明腑实证的表现。腑实证，大便一般多见燥结不通，但有时泄出黄臭的粪水，而不见燥屎泻出，若有阳明腑实证者，称之为“热结旁流”。主方大承气汤。通因通用通因通用又称“以通治通”，是指针对通泄的临床表现，用通利药物进行治疗。适用于因实而出现通利假象的真实假虚证。如热结旁流、湿热淋证、瘀血崩漏等。

2) 对真寒假热应采用的治疗方法是

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】A

【答案解析】热因热用：热因热用又称“以热治热”，是指针对假热的临床表现，用热性药物进行治疗。适用于阴寒内盛、格阳于外，反见假热之象的真寒假热证。

10. A. 归脾汤
B. 龙胆泻肝汤
C. 黄连温胆汤
D. 六味地黄丸合交泰丸
E. 安神定志丸合酸枣仁汤

1) 不寐之心脾两虚证的主治方剂是

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】A

【答案解析】不寐——心脾两虚证【方剂应用】基础方剂：归脾汤(人参、黄芪、白术、茯苓、龙眼肉、酸枣仁、木香、当归、远志、甘草、生姜、大枣)加减。

2) 不寐之心肾不交证的主治方剂是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】不寐——心肾不交证【方剂应用】基础方剂：六味地黄丸(熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、丹皮)合交泰丸(黄连、肉桂)加减。

3) 不寐之心胆气虚证的主治方剂是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】不寐——心胆气虚证【方剂应用】基础方剂：安神定志丸(人参、茯苓、茯神、菖蒲、远志、龙齿、朱砂)合酸枣仁汤(酸枣仁、知母、川芎、茯苓、甘草)加减。

11. A. 腹痛而泻，腹中雷鸣，攻窜作痛，伴有胸胁胀闷

B. 泄泻腹痛，泻下急迫，势如水注，肛门灼热

C. 泄泻清稀，甚则如水样，伴有恶寒发热

D. 泻下粪便臭如败卵，伴有不消化之物

E. 时溇时泻，迁延反复，食后脘闷不适

1) 泄泻湿热伤中证可见

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】泄泻——湿热伤中证【症状】泄泻腹痛，泻下急迫，势如水注，或泻而不爽，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数或濡数。

2) 泄泻肝气乘脾证可见

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 泄泻——肝气乘脾证【症状】腹痛而泻，腹中雷鸣，攻窜作痛，矢气频作，每因抑郁恼怒或情绪紧张之时而泻，素有胸胁胀闷，暖气食少。舌质淡，脉弦。

3) 泄泻寒湿内盛证可见

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 泄泻——寒湿内盛证【症状】泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，或兼见外感风寒，恶寒，发热，头痛，肢体酸痛。舌苔白或白腻，脉濡缓。

4) 泄泻食滞肠胃证可见

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 泄泻——食滞肠胃证【症状】腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，泻下伴有不消化食物，脘腹胀满，暖腐吞酸，不思饮食。舌淡红，苔垢浊或厚腻，脉滑实。

5) 泄泻脾胃虚弱证可见

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 泄泻——脾胃虚弱证【症状】大便时溏时泻，迁延反复，食少，食后脘闷不舒，稍进油腻食物，则大便次数增多，面色萎黄，神疲倦怠。舌质淡，苔白，脉细弱。

12. A. 头痛时作，受风尤剧

- B. 头痛而胀，便秘溲黄
- C. 头昏胀痛，心烦易怒
- D. 头痛隐隐，面色少华
- E. 头痛持久，痛如锥刺

1) 肝阳头痛典型症状是

- A.

- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】肝阳头痛【症状】头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，或兼胁痛。舌红苔黄，脉弦数。

2) 血虚头痛典型症状是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】血虚头痛【症状】头痛隐隐，时时昏晕，心悸失眠，面色少华，神疲乏力，遇劳加重。舌质淡，苔薄白，脉细弱。

3) 风寒头痛典型症状是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】风寒头痛【症状】头痛时作，痛连项背，常有拘急收紧感，伴恶风畏寒，受风尤剧，口不渴。舌苔薄白，脉浮紧。

4) 风热头痛典型症状是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】风热头痛【症状】头痛而胀，甚则头痛如裂，发热或恶风，口渴欲饮，面红目赤，或便秘溲黄。舌尖红，苔黄，脉浮数。

5) 瘀血头痛典型症状是

- A.
- B.
- C.

D.

E.

【正确答案】 E

【答案解析】 瘀血头痛【症状】头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，或有头部外伤史。舌紫暗，或有瘀斑，瘀点，苔薄白，脉细或细涩。

13. A. 益智仁

B. 柏子仁

C. 半夏

D. 当归

E. 枇杷叶

1) 处方直接写药名（或炒或炙），应调配蜜炙品的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 E

【答案解析】 处方直接写药名，应调配蜜炙的药材有枇杷叶、马兜铃等。

2) 处方直接写药名（或炒或炙），应调配盐炙品的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 A

【答案解析】 处方直接写药名，应调配盐炙品的是补骨脂、益智仁等。

14. A. 地肤子

B. 北豆根

C. 天仙子

D. 山豆根

E. 千金子

现行《中国药典》载有毒性药材和饮片共计 83 种，分为大毒、有毒、小毒等三类。

1) 以上属大毒的中药是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】C

【答案解析】

2) 以上属有毒的中药是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】

3) 以上属小毒的中药有

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】B

【答案解析】现行《中国药典》载有毒性药材和饮片共计 83 种，其中有大毒的药材和饮片 10 种，如川乌、马钱子（马钱子粉），天仙子、巴豆（巴豆霜）、草乌、斑蝥等；有毒的药材和饮片 42 种，如三颗针、山豆根、天南星（制天南星）、木鳖子、附子、雄黄等；有小毒的药材和饮片 31 种，如土鳖虫、川楝子、苦杏仁、北豆根、重楼、蛇床子等。

15. A. 僵蚕

B. 干漆

C. 延胡索

D. 吴茱萸

E. 王不留行

1) 处方直接写药名，需调配醋炙品的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】C

【答案解析】延胡索需要调配醋炙品。处方直接写药名（或炒或炙），需调配醋炙品，如延胡索等。

2) 处方直接写药名，需调配麸炒品的是

A.

- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】僵蚕需要调配麸炒品。处方直接写药名（或炒），需调配麸炒品，如僵蚕、白术、枳壳等。

- 16. A. 淡盐水
- B. 米汤
- C. 姜汤
- D. 黄酒
- E. 清茶

1) 服用云南白药宜选用的药引是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】对于跌打损伤、风寒湿痹等证，常用黄酒或白酒送服三七粉、云南白药、三七伤药片、七厘散、大活络丸、再造丸、醒消丸、跌打丸、独活寄生丸、腰痛宁胶囊等，以行药势，直达病所，黄酒一般用15~20ml，白酒酌减。

2) 服用消渴丸宜选用的药引是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】米汤具有温养脾胃、顾护胃气的功效，还可减少药物对肠胃的刺激，因此凡脾胃虚弱，素有胃肠道疾患的患者服用更衣丸、麻仁丸、消渴丸、四神丸等，以及服用治疗身体衰弱的补益类中成药如十全大补丸、人参养荣丸等，宜用米汤送服，小米、大米汤汁均可。

3) 服用六味地黄丸宜选用的药引是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】滋阴补肾的六味地黄丸、大补阴丸等宜用淡盐水送服，以取其引药入肾之功。

4) 服用川芎茶调散宜选用的药引是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 川芎茶调散用清茶送服，取其清热之效。

17. A. 维生素 B₁

- B. 氢氧化铝
- C. 氢氯噻嗪
- D. 格列本脲
- E. 马来酸氯苯那敏

1) 消糖灵胶囊含有的西药成分是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 消糖灵胶囊含有的西药成分是格列本脲。

2) 安神补脑液含有的西药成分是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 安神补脑液含有的西药成分是维生素 B₁。

3) 神曲胃痛片含有的西药成分是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】神曲胃痛片含有的西药成分是氢氧化铝、碳酸氢钠。

三、综合分析选择题

1. 患者，男，65岁，高热神昏，出现四肢厥冷、大汗淋漓、脉微欲绝。

1) 患者的表现属于

- A. 寒极生热
- B. 热极生寒
- C. 寒热并见
- D. 寒热往来
- E. 寒热错杂

【正确答案】B

【答案解析】患者属于邪热极盛，深伏于里，阳气被郁闭于内，不得外达肢体而格阴于外，故见热极生寒。

2) 上述患者的表现，体现阴阳的哪一种关系

- A. 相互交感
- B. 对立制约
- C. 阴阳平衡
- D. 相互转化
- E. 阴阳消长

【正确答案】D

【答案解析】阴阳的相互转化性，即在一定条件下，阴阳可以发生相互转化，阴可以转化为阳，阳也可以转化为阴。如属阴的寒证在一定条件下可以转化为属阳的热证；属阳的热证在一定条件下也可以转化为属阴的寒证。病变的寒热性质变化，其证候的阴阳属性也随之改变。

2. 某女，32岁。口舌生疮，烦躁焦虑，口干舌燥，小便短赤。舌尖红，苔薄黄，脉数。

1) 口舌生疮，舌尖红，病位在

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】B

【答案解析】心在舌的分布部位为舌尖。舌为心之苗，所以舌尖生疮，说明病位在心。

2) 脉数主病是

- A. 虚证
- B. 热证
- C. 阴证
- D. 寒证
- E. 表证

【正确答案】B

【答案解析】数脉主热证。

3. 某女, 40岁。心悸不安, 胸闷不舒, 心痛时作, 痛如针刺, 唇甲青紫。舌质紫暗, 有瘀斑, 脉涩。

1) 其辨证是

- A. 痰火扰心证
- B. 心虚胆怯证
- C. 阴虚火旺证
- D. 瘀阻心脉证
- E. 心血不足证

【正确答案】D

【答案解析】心悸——瘀阻心脉证

【症状】心悸不安, 胸闷不舒, 心痛时作, 痛如针刺, 唇甲青紫。舌质紫暗或有瘀斑, 脉涩或结或代。

2) 其治法是

- A. 清热化痰, 宁心安神
- B. 补血养心, 益气安神
- C. 活血化瘀, 理气通络
- D. 温补心阳, 安神定悸
- E. 镇惊定志, 养心安神

【正确答案】C

【答案解析】心悸——瘀阻心脉证【治法】活血化瘀, 理气通络。

3) 治疗时可选用的中成药不包括

- A. 血府逐瘀口服液
- B. 七叶神安片
- C. 稳心颗粒
- D. 参松养心胶囊
- E. 芪苈强心胶囊

【正确答案】E

【答案解析】心悸——瘀阻心脉证可选用的中成药有血府逐瘀口服液、七叶神安片、稳心颗粒、参松养心胶囊。

4) 患者在用药时, 作为药师给出的建议, 不正确的是

- A. 心悸兼有血瘀阻络之头痛, 宜选用血府逐瘀口服液
- B. 心气不足、心血瘀阻之心悸兼失眠者, 宜选用七叶神安片
- C. 气阴两虚、瘀血阻络之心悸, 宜选用稳心颗粒
- D. 气阴两虚、心络瘀阻兼有内热者, 可同时服用参松养心胶囊和生脉饮
- E. 气虚血瘀者慎用血府逐瘀口服液

【正确答案】D

【答案解析】心悸——瘀阻心脉证可选用的中成药有血府逐瘀口服液、七叶神安片、稳心颗粒、参松养心胶囊。
中成药的合理用药与用药指导

(1) 以上四药均可用于瘀阻心脉之心悸。心悸兼有血瘀阻络之头痛及气郁之急躁易怒、内热烦闷者,宜选用血府逐瘀口服液。心气不足、心血瘀阻之心悸兼失眠者,宜选用七叶神安片。气阴两虚、瘀血阻络之心悸,宜选用稳心颗粒或参松养心胶囊。参松养心胶囊除益气养阴、活血通络外,兼有清心安神之功,对气阴两虚、心络瘀阻兼有内热者更佳。

(2) 孕妇禁用血府逐瘀口服液、七叶神安片、参松养心胶囊。气虚血瘀者慎用血府逐瘀口服液。孕妇慎用稳心颗粒。服用稳心颗粒时,应将药液充分搅匀,勿将杯底药粉丢弃。七叶神安片宜饭后服用。

(3) 不建议将参松养心胶囊与生脉饮等组成重复的中成药同时使用,因属重复用药。

4. 某男, 52岁。近来胁肋隐痛, 悠悠不休, 遇劳加重, 口干咽燥, 心中烦热, 头晕目眩, 舌红少苔, 脉细弦而数。

1) 中医辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 气血亏虚证
- C. 肝胆湿热证
- D. 瘀血阻络证
- E. 肝络失养证

【正确答案】 E

【答案解析】 胁痛——肝络失养证【症状】 胁肋隐痛, 悠悠不休, 遇劳加重, 口干咽燥, 心中烦热, 头晕目眩。舌红少苔, 脉细弦而数。

2) 治疗宜采用的治法是

- A. 疏肝理气
- B. 祛瘀通络
- C. 清热利湿
- D. 养阴柔肝
- E. 平肝潜阳

【正确答案】 D

【答案解析】 胁痛——肝络失养证【治法】 养阴柔肝。

3) 治宜选用的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 济川煎
- C. 一贯煎
- D. 玉女煎
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】 C

【答案解析】 胁痛——肝络失养证【方剂应用】 基础方剂: 一贯煎(北沙参、麦冬、当归、生地黄、枸杞子、川楝子)

5. 患者, 男, 36岁, 建筑工人。双膝关节反复疼痛6年。今年3月天气突然转冷, 关节疼痛加剧, 痛处固定, 局部较冷, 热敷后疼痛稍减, 关节屈伸不利。舌质淡红而润, 苔白而薄腻, 脉弦紧。

1) 其诊断是

- A. 行痹
- B. 痛痹
- C. 着痹
- D. 热痹
- E. 寒痹

【正确答案】 B

【答案解析】 痹证——痛痹

【症状】 肢体关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒则痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，局部皮肤或有寒冷感。舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。

2) 其治法是

- A. 散寒通络，祛风除湿
- B. 培补肝肾，舒筋止痛
- C. 清热通络，祛风除湿
- D. 补益肝肾，滋阴清热
- E. 化痰行瘀，蠲痹通络

【正确答案】 A

【答案解析】 痹证——痛痹【治法】 散寒通络，祛风除湿。

3) 治疗应首选的方剂是

- A. 薏苡仁汤
- B. 防风汤
- C. 乌头汤
- D. 白虎桂枝汤
- E. 独活寄生汤

【正确答案】 C

【答案解析】 痹证——痛痹【方剂应用】 基础方剂：乌头汤(川乌、芍药、麻黄、黄芪、甘草)加减。

6. 患者 68 岁，恶寒重，低热，头身疼痛，鼻痒，鼻流清涕，吐稀白痰，伴慢性支气管炎。

1) 从患者症状看，患者证属

- A. 风热感冒
- B. 风寒感冒
- C. 时行感冒
- D. 体虚感冒
- E. 阳虚外感

【正确答案】 B

【答案解析】 风寒感冒的症状主要有恶寒重，发热轻，无汗头痛，肢体酸痛，或鼻塞声重，或鼻痒喷嚏，流涕清稀，咽痒，咳嗽，痰吐稀白。舌苔薄白，脉浮紧。

2) 适用于治疗风寒感冒的方剂有

- A. 参苏饮
- B. 血府逐瘀汤
- C. 右归饮
- D. 荆防败毒散
- E. 柴胡疏肝散

【正确答案】D

【答案解析】治疗风寒感冒，可以使用的方剂是“荆防败毒散”。

3) 患者如果有慢性支气管炎，日久会出现肺阴虚，可以选用下列哪个药物。

- A. 大黄
- B. 黄芩
- C. 人参
- D. 紫草
- E. 西洋参

【正确答案】E

【答案解析】老年慢性支气管炎日久会出现肺阴虚象，宜用西洋参、沙参等，益气养阴清热。

4) 老年患者在用药的时候，在剂量的使用上应该注意

- A. 首次服用剂量减半
- B. 首次服用剂量加倍
- C. 按照说明书服用
- D. 从最大剂量服用
- E. 从最小剂量服用

【正确答案】E

【答案解析】老年人肝肾功能多有不同程度的减退或合并多器官严重疾病。因此，用药要因人而异，一般应从“最小剂量”开始。尤其对体质较弱，病情较重的患者切不可随意加药。

7. 一女性患者，56岁，近日出现眩晕的症状，且活动后症状加剧，面色?白，唇甲无华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少。舌淡，脉细弱。遂入院就诊。入院后中药煎剂治疗1个月后，病情好转，但是有口干、夜寐不安等症状，给予参麦注射液100ml静脉滴注，用药2分钟后，患者突感四肢麻木、头昏、胸闷、出汗、心悸、全身不适，继而出现呼吸困难、濒死感、口唇及肢端发绀、四肢厥冷、面色苍白等。

1) 依据中医理论，患者的症状应辨证为

- A. 肝火上扰型眩晕
- B. 气血亏虚型眩晕
- C. 痰浊上蒙型眩晕
- D. 肝肾阴虚型眩晕
- E. 痰火扰心型眩晕

【正确答案】B

【答案解析】“面色?白，神疲懒言”等为气虚，“唇甲无华”为血虚，故应辨证为眩晕——气血亏虚证。

2) 临床上使用参麦注射液时，作为执业药师，不应给出的用药指导是

- A. 临床上应严格按照参麦注射液的适应证范围使用,使用时务必加强用药监护
- B. 对有药物过敏史或过敏体质的患者应避免使用
- C. 孕妇及老年人慎用参麦注射液
- D. 新生儿、婴幼儿禁用参麦注射液
- E. 本品含人参,不宜与细辛、白芍等药物同时使用

【正确答案】E

【答案解析】参麦注射液的用药指导中,因为参麦注射液含有人参,根据十八反“诸参辛芍叛藜芦”和十九畏中“人参最怕五灵脂”等,参麦注射液不宜与藜芦、五灵脂等药物合用。故E项说法错误。

四、多项选择题

- 1. 执业药师在咨询服务和用药指导过程中,需特别提示的情形有
 - A. 首次使用的药品
 - B. 多种药物合并应用
 - C. 使用含有毒成分的药品
 - D. 处方用法与说明书不一致
 - E. 使用需特别条件贮存的药品

【正确答案】ABCDE

【答案解析】执业药师需特别提示的特殊情况:

- (1) 患者同时使用2种或2种以上含同一成分的药品时;或合并用药较多时。
- (2) 当患者用药后出现不良反应时;或既往有曾发生过不良反应史。
- (3) 当患者依从性不好时;或患者认为疗效不理想时或剂量不足以有效时。
- (4) 病情需要,处方中配药剂量超过规定剂量时(需医师双签字)。处方中用法用量与说明书不一致时。或非药品说明书中所指示的用法、用量、适应证时。
- (5) 超越说明书范围的适应证或超过说明书范围的使用剂量(需医师双签字确认)。
- (6) 患者正在使用的药物中有配伍禁忌或配伍不当时(如有明显配伍禁忌时应第一时间联系该医师以避免纠纷的发生)。
- (7) 第一次使用该药的患者。
- (8) 近期药品说明书有修改(如商品名、适应证、剂量、有效期、贮存条件、药品不良反应)。
- (9) 患者所用的药品近期发现严重或罕见的不良反应。
- (10) 使用含有毒中药或有毒成份药品的患者。
- (11) 同一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大或剂量接近阈值时。
- (12) 药品被重新分装,而包装的标识物不清晰时。
- (13) 使用需特殊贮存条件的药品时;或使用临近有效期药品时。

- 2. 厌食脾胃气虚证可选用的中成药有

- A. 保和丸
- B. 大山楂丸
- C. 参苓白术散
- D. 儿宝颗粒
- E. 启脾丸

【正确答案】CE

【答案解析】厌食脾胃气虚证常用的中成药有参苓白术散、启脾丸。

3. 根据蒙医药理论, 七素又称为七精, 分别为

- A. 血
- B. 肉
- C. 骨
- D. 筋
- E. 精华

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 七素又称七精。分别为精华、血、肉、脂、骨、髓及红或白精, 是机体的构成物质。

4. 药师调剂处方时必须做到“四查十对”。其中“四查”指的是

- A. 查处方
- B. 查药品
- C. 查配伍禁忌
- D. 查用药合理性
- E. 查临床诊断

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 四查的内容包括: 查处方, 对科别、姓名、年龄; 查药品, 对药名、剂型、规格、数量; 查配伍禁忌, 对药品性状、用法用量; 查用药合理性, 对临床诊断。

“四查十对”记忆技巧: 方三品四配二合一。

5. 临方制剂加工, 又称个体化制剂加工。开展中药临方制剂加工服务的单位, 应具备的条件有

- A. 应有符合相应规定的制剂场所和与加工剂型相匹配的制剂设备
- B. 应制定加工服务的质量管理制度, 有相应的管理制度和岗位操作规程、设备操作规程
- C. 制剂加工人员应熟练掌握传统中药制剂制作技能, 每年接受系统培训
- D. 对临方制剂加工从审方、调配、剂型加工乃至包装检查、发放等全过程, 应建立追溯机制和质量监管体系
- E. 对其加工的药品质量负责, 确保安全

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 开展中药临方制剂加工服务的单位, 应有符合相应规定的制剂场所和与加工剂型相匹配的制剂设备; 应制定加工服务的质量管理制度, 有相应的管理制度和岗位操作规程、设备操作规程等; 制剂加工人员应熟练掌握传统中药制剂制作技能, 每年接受系统培训; 对临方制剂加工从审方、调配、剂型加工乃至包装检查、发放等全过程, 应建立追溯机制和质量监管体系, 并对其加工的药品质量负责, 确保安全。

6. 与丙谷胺联合治疗消化性溃疡, 有协同作用, 现已制成复方丙谷胺(胃丙胺)的中药有

- A. 黄柏
- B. 黄连
- C. 冰片
- D. 甘草
- E. 白芍

【正确答案】 CDE

【答案解析】 丙谷胺与甘草、白芍、冰片一起治疗消化性溃疡, 有协同作用, 并已制成复方丙谷胺(胃丙胺)。

7. 与低分子右旋糖酐同用, 可提高心肌梗死的抢救成功率的中药注射剂有

- A. 丹参注射液
- B. 柴胡注射液
- C. 黄芪注射液

D. 鱼腥草注射液

E. 川芎嗪注射液

【正确答案】ACE

【答案解析】丹参注射液、黄芪注射液、川芎嗪注射液等与低分子右旋糖酐、能量合剂等同用，可提高心肌梗死的抢救成功率。

8. 与西药化疗药联用，可降低患者因化疗药而导致的白细胞降低等不良反应的中药有

A. 黄芪

B. 人参

C. 当归

D. 山茱萸

E. 刺五加

【正确答案】ABCDE

【答案解析】黄芪、人参、女贞子、刺五加、当归、山茱萸等，与西药化疗药联用，可降低患者因化疗药而导致的白细胞降低等不良反应。

9. 肾功能不全者用药的基本原则和使用注意事项是

A. 明确疾病的诊断和治疗目标

B. 忌用有肾毒性的药物

C. 注意药物的相互作用，避免产生新的肾损害

D. 坚持少而精的用药原则

E. 定期检查，及时调整治疗方案

【正确答案】ABCDE

【答案解析】肾功能不全者用药基本原则和注意事项包括：

(1) 明确疾病诊断和治疗目标；

(2) 忌用有肾毒性的药物；

(3) 注意药物相互作用，避免产生新的肾损害；

(4) 坚持少而精的用药原则；

(5) 定期检查，及时调整治疗方案。

10. 引起肝损伤的含砷类的中药有

A. 砒石

B. 铅丹

C. 雄黄

D. 朱砂

E. 代赭石

【正确答案】ACE

【答案解析】含砷类的中包括有砒石、雄黄、代赭石等，其毒性成分主要是三氧化二砷（As₂O₃），即砒霜，其原浆毒作用可抑制含巯基酶活性，使肝脂肪变性，肝小叶中心坏死，心、肠充血，皮细胞坏死。