

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2022 年第 28 期

问题索引:

1. 【问题】若需再次接受 ESWL 治疗, 间隔时间至少为?
2. 【问题】隔离区怎么划分?
3. 【问题】利多卡因是局麻药, 为何会用利多卡因来治疗室性心率失常呢?
4. 【问题】咯血怎么分级?
5. 【问题】儿童心肺复苏的按压深度是多少?

具体解答:

1. 【问题】若需再次接受 ESWL 治疗, 间隔时间至少为?

【解答】体外冲击波碎石 (ESWL) 大多数上尿路结石、结石以下输尿管通畅、无狭窄适用此法, 最适宜于 <2.5cm 的结石。两次治疗间隔时间应大于 7 天。

2. 【问题】隔离区怎么划分?

【解答】隔离区域的划分

区域	范围
清洁区	更衣室、配膳室、值班室及库房等
半污染区	医护办公室、化验室、病区内走廊等
污染区	病室、厕所、浴室等[医学教育/网]

3. 【问题】利多卡因是局麻药, 为何会用利多卡因来治疗室性心率失常呢?

【解答】利多卡因属于 I 类钠通道阻滞药, 阻滞钠通道的激活状态和失活状态, 通道恢复至静息态时, 阻滞作用迅速解除。因此, 利多卡因对除极化组织 (缺血区) 作用强, 对缺血或强心苷中毒所致除极化型心律失常有较强的抑制作用。主要治疗室性心律失常, 如心脏手术, 心导管术, 急性心肌梗死或强心苷中毒所致的室性心动过速或心室纤颤。[医学 教育网]

4. 【问题】咯血怎么分级?

【解答】(1) 少量咯血为 <100ml/d;

- (2) 中量咯血为 100~500ml/d; [医学教育网]
- (3) 大量咯血为 >500ml/d 或 1 次咯血量 >300ml。

5. 【问题】儿童心肺复苏的按压深度是多少?

【解答】儿童心肺复苏的按压深度至少为胸廓前后径的 1/3 (婴儿约为 4cm、儿童约为 5cm、青春期儿童最大不超过 6cm)。

