

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2022 年第 32 期

问题索引：

- 1.【问题】肝性脑病患者为什么不能用维生素 B6 治疗？
- 2.【问题】早期直肠癌主要临床表现？
- 3.【问题】绞窄性肠梗阻体征？
- 4.【问题】结肠癌临床表现？
- 5.【问题】术中切下的肿瘤标本，应如何处理？

具体解答：

- 1.【问题】肝性脑病患者为什么不能用维生素 B6 治疗？

【解答】肝性脑病禁用维生素 B6 是因为在治疗肝性脑病时需要用药物多巴胺来降低血氨，而维生素 B6 会影响多巴胺的吸收，[医学教育网原创]从而会影响肝性脑病的治疗。

- 2.【问题】早期直肠癌主要临床表现？

【解答】直肠癌：早期直肠癌主要表现为排便习惯改变和便血，病人便意频繁、便前肛门下坠感、里急后重、排便不尽感等；待癌肿表面破溃继发感染时，大便表面带血及黏液，严重时出现脓血便。癌肿增大可使肠管狭窄，初时大便变形、变细。随着癌肿增大出现不完全性肠梗阻征象[医学教育网原创]。

- 3.【问题】绞窄性肠梗阻体征？

【解答】绞窄性肠梗阻：不仅有肠内容物通过受阻，同时发生肠管血运障碍。症状为腹痛发作间隙时间缩短，呈持续性剧烈腹痛伴阵发性加重。[医学教育网原创]可排出血性黏液样粪便。体征：绞窄性肠梗阻时腹腔内有渗液，可有移动性浊音。有固定性压痛和腹膜刺激征，可触及有压痛的肠祥包块。

- 4.【问题】结肠癌临床表现？

【解答】[医学教育网原创]结肠癌：最早出现的症状是排便习惯及粪便性状的变化，多表现为排便次数增加，腹泻、便秘、粪便中带脓血或黏液。常伴有定位不确切的持续性腹部隐痛。当癌肿较大时出现腹部肿块，若癌肿堵塞肠腔或压迫肠管，可引起慢性低位不完全性肠梗阻征象。晚期出现恶病质和转移症状。

- 5.【问题】术中切下的肿瘤标本，应如何处理？

【解答】切下的病理组织不得丢失，[医学教育网原创]应交巡回护士放入标本瓶内保。



正保医学教育网

www.med66.com