

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2022年第16期

问题索引:

1. 胃痞与鼓胀如何鉴别?
2. 宫腔注入的适应证是什么?
3. 抽动障碍的诊断要点是什么?

具体解答:

1. 胃痞与鼓胀如何鉴别?

胃痞与鼓胀的相同症状是

- A. 自觉腹部胀满
- B. 外有胀大之形
- C. 触之无形
- D. 按之无痛
- E. 心下痞塞

【答案】A

【解析】胃痞与鼓胀两者均为自觉腹部胀满的病证,但鼓胀以腹部胀大如鼓、皮色苍黄、脉络暴露为主症,胃痞则以自觉满闷不舒、外无胀形为特征。鼓胀发于大腹,胃痞则在胃脘;鼓胀按之腹皮绷急,胃痛却按之柔软[医学教育网原创]。

2. 宫腔注入的适应证是什么?

冯某,因输卵管阻塞而致继发不孕,宜选择何种外治法

- A. 坐浴
- B. 阴道冲洗
- C. 阴道纳药
- D. 宫腔注入
- E. 贴敷

【答案】D

【解析】宫腔注入:将中药制成注射剂,常规外阴、阴道、宫颈消毒后,将药剂注入宫腔及输卵管腔内,以了解输卵管畅通情况,或治疗宫腔及输卵管粘连、

阻塞造成的月经不调、痛经、不孕症等, 治以活血化瘀为主佐清热解毒, 药如丹参、当归、川芎、红花、莪术、鱼腥草等, 常用复方丹参注射液、复方当归注射液、鱼腥草注射液等注射剂。本法能使宫腔及输卵管腔内保持较高的药物浓度, 有改善局部血液循环, 抗菌消炎, 促进粘连松解及吸收, 以及加压推注的钝性分离等综合治疗作用, 已成为目前治疗宫腔、输卵管阻塞或粘连的有效方法之一[医学教育网原创]。

### 3. 抽动障碍的诊断要点是什么?

以下哪项不是抽动障碍的诊断要点

- A. 起病年龄在 2~12 岁, 可有疾病后及情致失调的诱因或家族史
- B. 有固定的肌肉快速收缩, 无节律性, 以固定方式出现, 抽动时伴不自主发声
- C. 抽动不受意志控制, 可暂时不发作
- D. 病状呈慢性过程, 病程呈明显波动性
- E. 脑电图正常或非特异性异常, 实验室检查无特殊异常, 智力正常

【答案】C

【解析】抽动障碍诊断要点

(1) 起病年龄在 2~12 岁, 可有疾病后及情志失调的诱因, 或有家族史。  
(2) 不自主的眼、面、颈、肩及上下肢肌肉快速收缩, 以固定方式重复出现, 无节律性, 入睡后消失。在抽动时, 可出现异常的发音, 如咯咯、咳声、呻吟声或粗言秽语。

(3) 抽动能受意志遏制, 可暂时不发作。

(4) 病状呈慢性过程, 但病程呈明显波动性。

(5) 实验室检查多无特殊异常, 脑电图正常或非特异性异常。智力测试基本正常[医学教育网原创]。