

护士资格《专业实务》模考试卷

一、A1 型题

1. 下列哪项属于高血压 3 级

- A.  $BP \geq 130$  和（或）85mmHg
- B.  $BP \geq 140$  和（或）90mmHg
- C.  $BP \geq 180$  和（或）110mmHg
- D.  $BP \geq 160$  和（或）100mmHg
- E.  $BP \geq 170$  和（或）105mmHg

2. 心脏骤停最主要的病因是

- A. 心肌病
- B. 急性心肌炎
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 冠心病及其并发症
- E. 溺水

3. 阑尾手术切口的标志点为

- A. 麦氏点
- B. 华氏点
- C. 墨氏点
- D. 雷氏点
- E. 左下腹

4. 下列胆道 T 管的护理不妥的是

- A. 妥善固定
- B. 保持通畅
- C. 每日按时冲洗
- D. 每日更换引流瓶
- E. 记录引流量和性质



5. 典型的夏柯（Charcot）三联征常提示

- A. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 胆总管结石
- E. 胆道蛔虫病

6. 外痔疼痛见于

- A. 便秘时
- B. 便血时
- C. 腹泻时
- D. 血栓性外痔
- E. 压迫时

7. 胆道系统疾病的检查后，容易并发腹腔内出血的是

- A. 经皮肝穿刺胆道造影（PTC）
- B. 术中胆管造影
- C. 纤维胆道镜
- D. B超
- E. 经内镜逆行胆胰管造影（ERCP）

8. 癫痫患者的健康教育，以下不妥的是

- A. 不可参加攀高活动
- B. 开车要有人陪同
- C. 不可参加游泳运动
- D. 不可使用神经兴奋药物
- E. 需长期正规用药

9. 小儿第二个生长高峰是

- A. 出生~1岁
- B. 2岁
- C. 出生后前3个月
- D. 新生儿期
- E. 青春期

10. 胸围可以反映

- A. 胸廓的发育程度
- B. 骨骼的发育程度
- C. 脊柱的发育程度
- D. 膈肌的发育程度
- E. 心脏的发育程度

11. 新生儿生后应坚持家庭访视，家庭访视不包括下列哪项

- A. 出院后1~2天内初访
- B. 生后5~7天周访
- C. 生后10~14天半月访
- D. 生后27~28天满月访
- E. 生后1~2天内初访

12. 关于婴儿大小便训练，开始把尿的年龄是

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月
- D. 4个月
- E. 5个月

13. 老年人的晶态智力一般不随年龄的增长而减退。晶态智力是指

- A. 理解能力
- B. 反应速度
- C. 近期记忆力
- D. 思维敏捷度
- E. 知觉整合能力

14. 依据《医疗事故处理条例》关于医疗事故叙述错误的是

- A. 医疗事故的主体是医疗机构与医务人员
- B. 医疗事故是过失行为
- C. 医疗事故对患者要有人身损害的后果
- D. 医疗事故常常是由于疏忽造成的
- E. 四级医疗事故比严重护理差错程度轻

15. 护理质量缺陷表现下列哪项除外

- A. 护理事故
- B. 护理差错
- C. 护理人员编制不足
- D. 护理投诉
- E. 医疗纠纷

16. 以下不属于危重患者抢救中的护理道德的是

- A. 果断与审慎
- B. 理解和任怨
- C. 机警与敏捷
- D. 热情与关怀
- E. 慎独与协作

17. 以下情形中，不应撤销护士执业注册的是

- A. 非卫生行政部门进行的护士执业注册

- B. 以欺骗、贿赂等不正当手段取得的护士执业注册
- C. 违反法定程序作出的护士执业注册
- D. 护士死亡或者丧失行为能力
- E. 违反护士管理办法

18. 下列哪项不属于五味

- A. 色
- B. 酸
- C. 甘
- D. 辛
- E. 咸

19. 小儿怕黑、做噩梦，不敢一个人在卧室睡觉，常需大人陪伴的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

20. 患者，男性，50岁，因急性中度一氧化碳中毒、意识障碍入院。经吸氧、支持及对症治疗后，患者意识恢复。2周后患者突然出现失语、不能站立、偏瘫，大小便失禁。查体：T36.5℃，P85次/分，R16次/分，BP125/70mmHg，双侧病理反射阳性。首先需要考虑的诊断是

- A. 急性脑出血
- B. 药物中毒
- C. 中枢神经系统感染
- D. 急性脑梗死
- E. 急性一氧化碳中毒迟发性脑病

21. 某孕妇，孕 28 周，腹部检查确定为 ROA，听胎心正确的位置是

- A. 脐上稍偏右
- B. 脐上稍偏左
- C. 脐下稍偏右
- D. 脐下稍偏左
- E. 脐周

22. 患者，女性，58 岁，因帕金森病服用左旋多巴治疗。下列提示症状改善、治疗有效的指标是

- A. 肌肉强直
- B. 心境
- C. 食欲
- D. 警戒性
- E. 平衡功能

23. 某患儿因“新生儿硬肿症”入院，家长可能出现的心理反应中不包括

- A. 焦虑不安
- B. 否认疾病
- C. 角色紊乱
- D. 害怕担忧
- E. 自我责怪

24. 原发性支气管肺癌晚期患者最突出的症状是

- A. 咳嗽、咯血
- B. 咳嗽、胸痛
- C. 胸痛、呼吸困难
- D. 咯血、呼吸困难
- E. 咳嗽、呼吸困难

25. 羊水过多且无胎儿畸形的护理，不包括

- A. 孕妇低盐饮食
- B. 配合医生经腹穿刺放羊水
- C. 放羊水时严格无菌操作
- D. 一旦诊断，立即终止妊娠
- E. 注意预防产后出血

26. 患者诊断为痢时，血常规检查最可能出现的结果是

- A. 嗜酸性粒细胞增加
- B. 中性粒细胞比例增加
- C. 红细胞计数增加
- D. 中幼粒细胞计数增加
- E. 嗜碱性粒细胞增加

27. 关于先天性心脏病患儿的个性、心理特征的表现，叙述不正确的是

- A. 性格内向
- B. 依赖心理增强
- C. 情绪易波动
- D. 恐惧感
- E. 聪明、记忆力强

28. 某医院组织结构从最高领导院长到基层一线管理者科室主任及护士长是一个纵向的权利线，下属人员只接受一个上级的命令，所有人明确上下级关系。这种组织结构属于

- A. 委员会组织
- B. 职能型
- C. 直线-职能型
- D. 矩阵式
- E. 直线型

29. 孕妇咨询首次产检时间，护士指导正确的是

- A. 妊娠 12 周前
- B. 妊娠 20 周
- C. 自觉胎动时
- D. 妊娠期有异常时产检
- E. 随意时间

30. 生理性贫血出现在小儿出生后

- A. 2 个月以内
- B. 2~3 个月
- C. 4~6 个月
- D. 6~8 个月
- E. 8~10 个月

31. 通常煎药用火是

- A. 先文火, 后武火
- B. 一直文火煎煮
- C. 一直武火慢熬
- D. 先武火, 后文火
- E. 武火、文火交替

32. 重症肺炎患儿发生腹胀、肠鸣音减弱甚至消失是由于

- A. 消化不良
- B. 中毒性肠麻痹
- C. 低钠血症
- D. 低钾血症
- E. 低钙血症

33. 护士的公众距离指沟通双方的距离在

- A. <50cm
- B. 50~100cm
- C. 200~300cm
- D. 300~400cm
- E. >400cm

34. 产褥期是指产后

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 6 周

35. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病累及的部位有

- A. 神经末梢、脊神经根、脑神经
- B. 神经末梢、脊神经根、脑干
- C. 神经末梢、脑神经根、脊髓
- D. 神经末梢、脑神经、脊髓
- E. 脊神经、脑神经、脑干

36. 护士在向患者解释心电图时，关于 P 波，正确的解释是

- A. P 波增宽代表心房肥厚
- B. P 波增高代表心动过缓
- C. P 波代表心房除极
- D. P 波代表心室除极
- E. 正常情况下，持续时间为 0.12 秒以上

37. 有关第一产程的说法，正确的是

- A. 宫口扩张至 6cm 为活跃期
- B. 活跃期最长时间为 4 小时
- C. 产妇必须卧床，抬高臀部
- D. 宫缩时，产妇可以用腹压
- E. 所有产妇均进行温肥皂水灌肠

38. 静脉输液发生空气栓塞时，造成患者死亡的原因是空气阻塞了

- A. 肺动脉入口
- B. 肺静脉入口
- C. 主动脉入口
- D. 上腔静脉入口
- E. 下腔静脉入口

39. 对流行性乙型脑炎极期最严重的三大症状的描述，正确的是

- A. 意识障碍、呼吸衰竭、循环衰竭
- B. 高热、惊厥、呼吸衰竭
- C. 高热、意识障碍、呼吸衰竭
- D. 高热、意识障碍、循环衰竭
- E. 惊厥、呼吸衰竭、循环衰竭

40. 患者，男性，30 岁，肛裂。该疾病好发部位为肛管后正中线，相当于膝胸位的

- A. 3 点钟处
- B. 6 点钟处
- C. 9 点钟处
- D. 12 点钟处
- E. 以上均不对

41. 患者，男性，46岁。因肝硬化腹水入院，放腹水后出现精神错乱，幻觉，嗜睡伴有扑翼样震颤，脑电图异常等表现，护士采取的饮食护理措施应除外

- A. 以碳水化合物为主的饮食
- B. 钠盐限制在 1.5~2.0g/d
- C. 静脉补充葡萄糖提供给热量
- D. 昏迷者鼻饲流质饮食
- E. 清醒后，提供动物性蛋白质

42. 慢性肺源性心脏病的最常见原发病是

- A. 支气管哮喘
- B. 胸廓畸形
- C. 肺结核
- D. 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿
- E. 支气管扩张症

43. 列为甲类传染病的病种是

- A. 病毒性肝炎、流脑
- B. 流脑、肺结核
- C. 艾滋病、禽流感
- D. 非典型肺炎、手足口病
- E. 鼠疫、霍乱

44. 患者，男性，26岁，民工。在作业中不慎从高空坠落，头痛、呕吐急诊入院，诊断为脑挫裂伤。为预防脑水肿，降低颅内压，应采取的体位是

- A. 仰卧位
- A.
- B. 头高足低位
- C. 半坐卧位
- D. 端坐位

E. 俯卧位

45. 诱发癫痫的因素不包括

- A. 高热
- B. 睡眠不足
- C. 大量饮酒
- D. 体育活动
- E. 精神刺激

46. 下列临床表现与放置宫内节育器无关的是

- A. 腰酸腹胀
- B. 体重增加
- C. 子宫穿孔
- D. 经期延长
- E. 子宫内膜炎

47. 经腹输卵管结扎术后应休息

- A. 3~4 周
- B. 1~2 周
- C. 2~3 周
- D. 1 周
- E. 2 周

48. 哪一条不符合儿童运动发育规律

- A. 先画圆，后画人
- B. 先前进，后倒退
- C. 先抬头，后坐、立、行
- D. 从臂至手，从脚到腿
- E. 先握物，后抓物

49. 小儿营养中等的情况下，测量上臂围的值应该是

- A. 10.5cm
- B. 11.5cm
- C. 12.5cm
- D. 14.5cm
- E. 15.5cm

50. 婴儿开始有主动进食要求的年龄是

- A. 6~7 个月
- B. 7~8 个月
- C. 8~9 个月
- D. 9~10 个月
- E. 10~12 个月

51. 按热量计算，8 个月小儿所需的热量为

- A. 770kcal
- B. 800kcal
- C. 1100kcal
- D. 990kcal
- E. 900kcal

52. 幼儿期小儿蛋白质的供给量为

- A. 10g
- B. 20g
- C. 30g
- D. 40g
- E. 50g

53. “一人一针一管”执行率在护理质量评价中属于

- A. 要素质量评价
- B. 环节质量评价
- C. 终末质量评价
- D. 基础质量评价
- E. 行为过程评价

54. 关于 PDCA 循环管理中计划阶段的步骤应除外

- A. 调查质量现状，分析并找出问题
- B. 按照拟定的质量目标组织实施
- C. 拟定针对主要原因的对策和措施
- D. 找出影响质量的主要因素
- E. 分析并提出产生质量问题的可能原因

55. 公正不仅指形式上的类似，更强调公正的

- A. 本质
- B. 内容
- C. 基础
- D. 内涵
- E. 意义

56. 对于医疗卫生机构中发生的殴打护士情形，进行行政处罚的机关是

- A. 医疗卫生机构保卫部门
- B. 卫生管理机构
- C. 医疗卫生机构
- D. 公安机关
- E. 劳动保障部机构

57. 频发室性期前收缩的定义是

- A. 室性期前收缩 > 60 次/分钟
- B. 室性期前收缩 > 30 次/分钟
- C. 室性期前收缩 > 20 次/分钟
- D. 室性期前收缩 > 10 次/分钟
- E. 室性期前收缩 > 5 次/分钟

58. 不属于冠心病的临床类型是

- A. 隐匿型
- B. 心绞痛型
- C. 肥厚型心肌病型
- D. 心肌梗死型
- E. 猝死型

59. 窦性心动过缓，心率不低于 50 次/分，常采用的措施是

- A. 不需特殊治疗
- B. 口服麻黄碱
- C. 静滴去甲肾上腺素
- D. 皮下注射麻黄碱
- E. 含服异丙肾肾上腺素

60. 胃肠减压期间的护理措施错误的是

- A. 病人应禁食及停口服药物
- B. 随时观察吸引是否有效
- C. 加强口腔护理
- D. 及时更换收集瓶
- E. 若发现胃管有鲜红血液吸出，继续持续吸引

## 二、A2 型题

61. 患者女性，50岁。因高血压3年，血压控制不好，来医院就诊，护士给其进行健康教育时，讲解原发性高血压治疗的目的是

- A. 降低颅内压
- B. 预防和延缓并发症的发生
- C. 明确高血压的原因
- D. 减轻体重
- E. 推迟动脉硬化

62. 患者女性，54岁。近几日持续出现胸前区疼痛，就诊过程中患者突然发生意识模糊，面色苍白，血压测不出。医护人员立即为其进行CPR。护士评估患者的重点内容是

- A. 表情
- B. 尿量
- C. 肌张力
- D. 大动脉搏动
- E. 中心静脉压

63. 8个月。近3天来腹泻每天达10多次，为黄绿色稀水样大便，且伴呕吐就诊。医生诊断除腹泻外，尚有酸碱失衡，需住院治疗。婴儿腹泻时，常见的酸碱平衡失调是

- A. 代谢性碱中毒
- B. 代谢性酸中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 混合性酸中毒

64. 女，45岁，肠穿孔致弥漫性腹膜炎。其后期最易引起

- A. 绞窄性肠梗阻
- B. 麻痹性肠梗阻

- C. 单纯性肠梗阻
- D. 血运性肠梗阻
- E. 痉挛性肠梗阻

65. 田女士，50岁，右上腹部疼痛1天，体温39℃，巩膜黄染，B超示胆总管结石，为警惕急性重症胆管炎，病情观察中要特别注意

- A. 体温、面色
- B. 血压、神志
- C. 腹部体征
- D. 恶心、呕吐
- E. 血、白细胞计数

66. 女，52岁。右上腹阵发性绞痛伴右肩背部放射痛，B超发现胆囊增大，胆囊壁增厚，胆囊内有结石光团和声影。其治疗原则是

- A. 胆囊切除
- B. 胆囊造瘘
- C. 抗炎
- D. 胆总管切开
- E. 禁食

67. 李辉生，50岁，患肝硬化已3年，常有刷牙出血，皮肤反复出现出血点，查血小板 $180 \times 10^9/L$  ( $180000/\mu l$ )，出血原因是

- A. 凝血因子减少
- B. 维生素C缺乏
- C. 毛细血管壁通透性增强
- D. 弥散性血管内凝血
- E. 血小板功能不好

68. 患者，男，68岁。热爱书法经常练字，但近期情绪常激动，有时心情抑郁，出现不能独立洗澡、刷牙、上厕所等，练字时字越写越小。请问此症状是

- A. 阿尔茨海默
- B. 抑郁症
- C. 帕金森
- D. 痴呆症
- E. 癔症

69. 患儿，3岁。高热惊厥，在急诊科经止惊、给氧等紧急处理后，情况稳定，欲送儿科病房做进一步治疗，运送过程中最适宜的供氧装置是

- A. 氧气筒
- B. 氧气枕
- C. 中心管道
- D. 人工呼吸机
- E. 简易呼吸器

70. 患儿男，20天，母乳喂养，每天8~10次，体重3.8kg，为了防止室内空气干燥，家长询问护士室内的湿度，护士告知正确的是

- A. 40%
- B. 50%
- C. 55%
- D. 65%
- E. 70%

71. 患者，男性，50岁。肝脏移植术后第1天。目前由1名护士专对该患者进行24小时监护。该种护理工作方式属于

- A. 个案护理
- B. 功能制护理
- C. 小组护理

D. 责任制护理

E. 临床路径

72. 患者，女性，34岁，入院诊断为特发性血小板减少性紫癜。该患者治疗首选

A. 肾上腺糖皮质激素

B. 脾脏切除术

C. 输浓缩血小板

D. 环磷酰胺静脉推注

E. 静脉滴注大剂量丙种球蛋白

73. 下列有关女性新生儿的特点，错误的是

A. 大、小阴唇分化良好

B. 阴道出现少量流血

C. 乳腺肿大

D. 阴道分泌少量白色糊状物

E. 阴道黏膜有皱褶

74. 某孕妇，28岁，妊娠7个月。体检发现HBsAg(+)，其余均正常。为避免新生儿感染乙型肝炎病毒，目前最重要的健康指导是

A. 立即肌内注射乙肝免疫球蛋白

B. 积极开展护肝治疗

C. 尽早抗病毒治疗

D. 新生儿出生后，立即接种乙肝疫苗并联合使用乙肝免疫球蛋白

E. 立即全程接种乙肝疫苗

75. 患者，男性，62岁，患高血压多年。近1年来血压常为180/110mmHg左右，近1周呼吸困难、咳嗽，胸部X线呈左心室扩大，肺淤血，眼底检查出血，尿常规正常。应考虑

- A. 高血压病 1 级（中度危险组）
- B. 高血压病 2 级（高度危险组）
- C. 高血压危象
- D. 恶性高血压
- E. 高血压病 3 级（极高危险组）

76. 小儿白细胞分类中，中性粒细胞与淋巴细胞两次交叉的时间分别是

- A. 生后 4~6 天与 4~6 周
- B. 生后 4~6 天与 4~6 个月
- C. 生后 4~6 个月与 4~6 岁
- D. 生后 4~6 天与 4~6 岁
- E. 生后 4~6 周与 4~6 岁

77. 化脓性脑膜炎的脑脊液与结核性脑膜炎的脑脊液最主要的不同点是

- A. 细胞数增高
- B. 可以检出细菌
- C. 蛋白增高
- D. 糖含量降低
- E. 外观混浊甚至脓样

78. 患者，男性，65 岁。以腹泻急诊入院，确诊为鼠疫。因病情严重，最终患者死亡。对此患者尸体的处理，正确的是

- A. 立即火化
- B. 于停尸屉内冷藏保存待检
- C. 立即进行卫生处理，就近火化
- D. 上报卫生防疫部门批准后火化
- E. 立即送往偏远地方填埋

79. 患者，男性，48岁。受凉后哮喘发作。2天来呼吸困难加重，皮肤潮红、多汗，眼球结膜水肿。应给予

- A. 低流量持续吸氧
- B. 高流量间歇吸氧
- C. 高流量持续吸氧
- D. 低流量间歇吸氧
- E. 乙醇湿化吸氧

80. 某医院消化内科护士为患者用双气囊三腔管压迫止血期间，患者突然出现躁动、发绀、呼吸困难。此时应立即

- A. 报告医生
- B. 排空气囊内气体
- C. 应用呼吸兴奋剂
- D. 应用镇静剂
- E. 吸氧

81. 当疑为窒息的患者出现下列哪项时，应实施海姆立克手法抢救

- A. 开始发绀
- B. 桡动脉搏动消失
- C. 只能简短的说话
- D. 剧烈咳嗽
- E. 因气道阻塞无法说话

82. 患者，女性，28岁，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>。停经5个月余、无胎动，临床确诊为葡萄胎。首选的处理是

- A. 清宫术
- B. 切除子宫
- C. 化疗
- D. 放疗

E. 观察

83. 患者，男性，58岁。出现剧烈头痛、烦躁等，上周出现视力模糊征象来就诊。查体：血压200/110mmHg，心率180次/分，心浊音界向左下扩大。该患者可能是

- A. 高血压脑血管病
- B. 高血压1级
- C. 高血压2级
- D. 高血压危象
- E. 恶性高血压

84. 患者，女性，52岁，有冠心病史。本次因晕厥，心电图示二度II型房室传导阻滞住院，今晨患者再次晕倒，意识不清，伴抽搐，颈动脉搏动未触及，目前最主要的抢救措施是

- A. 通知医师
- B. 建立静脉通路
- C. 心电图检查
- D. 人工呼吸
- E. 心肺复苏

85. 患者，女性，28岁，第一胎。产后第2天起，持续3天体温在37.5℃，宫缩良好，恶露呈淡红色，无臭味。体检：双乳软，无硬结，腹部无压痛，会阴伤口红肿。考虑其发热最可能的原因是

- A. 尿路感染
- B. 会阴伤口感染
- C. 乳腺炎
- D. 上呼吸道感染
- E. 乳头皲裂

86. 患者，女性，24岁。患子宫内膜异位症，以下叙述错误的是

- A. 继发性痛经
- B. 疼痛进行性加重
- C. 最常发生于卵巢
- D. 可在子宫直肠陷凹处触及痛性结节
- E. 首选辅助检查为B超

87. 患者，男性，55岁，因COPD发作入院。今晨出现咳嗽、咳黏液痰，此时护理的重点应是

- A. 呼吸锻炼
- B. 高蛋白饮食
- C. 补充液体
- D. 吸氧
- E. 加强口腔护理

88. 患者，男性，肿瘤患者。采用放射治疗，局部照射部位皮肤出现水肿、糜烂、渗出，可使用

- A. 0.2%薄荷淀粉
- B. 2%甲紫
- C. 2.5%碘酊
- D. 75%乙醇
- E. 3%过氧化氢溶液

89. 患者，男性，35岁。十二指肠溃疡病史3年余，急性发作2天。今中午饱餐后突感上腹剧烈疼痛，伴腹肌紧张、压痛、反跳痛，肝浊音界消失。该患者最可能并发了

- A. 大出血
- B. 幽门梗阻
- C. 急性胰腺炎

D. 急性胃扩张

E. 急性穿孔

90. 患者，男性，75岁。糖尿病患者，左侧足部患有严重溃疡，经治疗，病情未减轻，且有发生败血症的危险，此时为保证患者的生命需要对患者截肢。这里包含的冲突是

A. 有利原则与公正原则的冲突

B. 有利原则与尊重原则的冲突

C. 不伤害原则与有利原则的冲突

D. 不伤害原则与公正原则的冲突

E. 不伤害原则与尊重原则的冲突

91. 患者，女，43岁。因高热入院。患者处于体温上升期的表现为

A. 畏寒、皮肤苍白、无汗

B. 畏寒、皮肤潮红、无汗

C. 畏寒、皮肤苍白、出汗

D. 畏寒、皮肤潮红、出汗

E. 畏寒、皮肤厥冷、出汗

92. 患者，女性，70岁，不慎摔倒致右股骨转子间骨折，伴移位。因心功能不全不宜进行手术治疗，采用骨牵引。应重点预防的并发症是

A. 骨筋膜室综合征

B. 脂肪栓塞

C. 坠积性肺炎

D. 肌肉挛缩

E. 创伤性关节炎

93. 患者，男性，29岁，交通意外致胫腓骨干骨折，护士在早期应注意观察的并发症是

- A. 缺血性骨坏死
- B. 缺血性肌挛缩
- C. 骨筋膜室综合征
- D. 创伤性关节炎
- E. 愈合障碍

94. 患者，男性，32岁，和妻子发生口角后，口服敌敌畏，出现头晕、恶心、呕吐、瞳孔缩小，考虑为轻度有机磷中毒，全血胆碱酯酶活力是

- A. <30%
- B. 30%~50%
- C. <50%
- D. 50%~70%
- E. <90%

95. 患者，女性，24岁，因一氧化碳中毒1天后入院。查体：深昏迷，面色苍白，四肢湿冷、尿少，血COHb55%，诊断为急性一氧化碳中毒。最恰当的用氧原则是

- A. 高压氧治疗
- B. 高流量间断吸氧
- C. 低流量间断吸氧
- D. 高流量持续吸氧
- E. 低流量持续吸氧

96. 患者，男性，30岁，双下肢及胸腹部烧伤6小时。血压70/50mmHg，中心静脉压3cmH<sub>2</sub>O，尿量15ml/h，表明该病人存在

- A. 心功能不全
- B. 血容量严重不足
- C. 血容量过多
- D. 毛细血管过度收缩

E. 肾功能不全

97. 患者，男性，56岁，因车祸外伤入院，瘫痪，不能自行进餐，护士为患者喂食时，错误的是

- A. 每匙不超过 1/2
- B. 注意速度适中
- C. 温度适宜
- D. 进餐顺序遵照患者的习惯
- E. 进食水或流质食物，可用饮水管吸吮

98. 患者，男性，78岁。反复咳嗽、喘息 20 年，5 年前诊断为 COPD，2 天前合并肺部感染入院。目前患者的诊断为肺源性心脏病，首先应选用的药物是

- A. 洋地黄
- B. 糖皮质激素
- C. 利尿剂
- D. 抗生素
- E. 抗心律失常药

99. 35 岁男性，健康，今晨空腹去献血。原则上，献血的年龄不超过

- A. 50 周岁
- B. 55 周岁
- C. 60 周岁
- D. 65 周岁
- E. 70 周岁

100. 患者，男性，62 岁，多饮多尿、体重减轻 2 个月入院，诊断为 2 型糖尿病，对患者的并发症进行评估，首先应检查的部位是

- A. 关节
- B. 淋巴结

- C. 眼底
- D. 咽喉
- E. 腹部

101. 患者，男性，63岁。因扩张型心肌病，心力衰竭住院。自诉稍事活动即可出现呼吸困难、乏力、心悸等症状。该患者的活动原则是

- A. 限制重体力活动
- B. 不限制活动, 但应增加午休时间
- C. 可起床活动, 但需增加活动中的间歇时间和睡眠时间
- D. 以卧床休息、限制活动为宜
- E. 严格卧床休息

102. 患者，男性，38岁，因气胸行胸膜腔闭式引流时，发现胸瓶长玻璃管内水柱无波动，嘱患者作深呼吸后，水柱仍无波动，提示

- A. 胸膜腔内负压尚未恢复
- B. 胸膜腔内负压已恢复
- C. 胸膜腔内负压过大
- D. 胸膜腔内负压过小
- E. 胸腔闭式引流管阻塞

103. 患者，男性，21岁，颅脑外伤3小时。诊断颅底骨折的主要依据是

- A. 眼睑青紫
- B. 脑脊液漏
- C. 球结膜下出血
- D. 耳后皮下瘀斑
- E. 脑神经损伤的症状

104. 患者，男，35岁。颈部外伤后致急性蜂窝织炎，该疾病最严重的后果是

- A. 休克

- B. 呼吸困难、窒息
- C. 全身感染
- D. 颅内感染
- E. 高热

105. 患者，男性，45岁，剖腹探查术后7天，用力排便后腹部切口裂开。导致切口裂开不正确的的原因是

- A. 切口感染
- B. 腹内压过高
- C. 营养不良
- D. 切口过大
- E. 缝合不牢

106. 患者，男性，42岁。痛风病史9年，该患者患痛风的诱因不包括

- A. 酗酒
- B. 过度疲劳
- C. 感染
- D. 低蛋白饮食
- E. 寒冷刺激

107. 患者，男性，58岁。突然剧烈头痛、呕吐8小时，无发热，否认高血压病史。体检：血压120/75mmHg，右侧瞳孔直径3.5mm，对光反射消失，上睑下垂，眼球向上、下及内侧不能，颈项强直，克氏征阳性，CT示脑正中裂及右侧大脑外侧裂、枕大池呈高密度影，最可能的诊断是

- A. 脑干出血
- B. 脑室出血
- C. 内囊出血
- D. 小脑出血
- E. 蛛网膜下隙出血

108. 患儿，男，11岁。因外伤入院，需输血。进行交叉配血试验应选择的真空采血管的颜色是

- A. 蓝
- B. 红
- C. 紫
- D. 绿
- E. 灰

109. 患儿，女，10个月。2018年9月因发热、呕吐、腹泻入院。大便为黄色蛋花汤样，每日10余次，量多、无腥臭味。前囟、眼窝稍凹陷，尿量减少，大便镜检(-)。对该患儿的治疗，不恰当的是

- A. 及时、足量使用广谱抗生素
- B. 补液
- C. 补钾
- D. 应用双歧杆菌
- E. 使用蒙脱石散

110. 下列关于脑血管疾病患者的护理措施，不正确的是

- A. 脑出血发病24~48h内避免搬动
- B. 脑出血患者应取侧卧位，头部稍抬高
- C. 脑血栓患者应取平卧位
- D. 脑血栓患者头部使用冰袋及冷敷
- E. 急性脑出血发病24小时内应禁食

111. 患者男性，28岁，原有癫痫大发作史，今晨起有多次抽搐发作。间歇期意识模糊，两便失禁，中午来院急诊，紧急处理措施是

- A. 鼻饲抗癫痫药
- B. 静脉推注地西洋

- C. 肌注苯巴比妥
- D. 0.1%水和氯醛保留灌肠
- E. 20%甘露醇静脉滴注

112. 患儿，5岁。自幼口唇发绀，生长发育落后，活动后喜蹲踞。今晨突然发生意识障碍，惊厥。可能发生了

- A. 颅内出血
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 高血压脑病
- D. 法洛四联症脑缺氧发作
- E. 低血糖

113. 护士误给某青霉素过敏的患者注射青霉素，造成患者死亡，此事故属于

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 严重护理差错

114. 护士小张和小王在同一个病房工作，病房护理人员分为两组，每组3人，她们分别为组长。带领护士为患者提供服务，护士们互相配合完成工作。这种工作模式是

- A. 个案护理
- B. 功能制护理
- C. 责任制护理
- D. 小组护理
- E. 临床路径

115. 李先生，65岁，患高血压7年，2日前开始血压突然升高，出现剧烈头痛、呕吐、抽搐、昏迷。最可能的疾病是

- A. 恶性高血压
- B. 高血压危象
- C. 高血压脑病
- D. 脑出血
- E. 脑血栓形成

116. 某新生儿，出生后医生告知家属该小儿患有先天性心脏病：法洛四联症。该疾病合适的手术年龄为

- A. 1~2岁
- B. 3~5岁
- C. 5~9岁
- D. 9~12岁
- E. 12岁以后

117. 患者，女性，28岁。急性坏疽性阑尾炎手术后，出现尿频、尿急，大便次数增多，里急后重、发热。应提示为

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 细菌性痢疾
- C. 阿米巴痢疾
- D. 盆腔脓肿
- E. 过敏性结肠炎

118. 患儿男，5个月，混合喂养，腹泻2个月，大便5~6次/天，稀或糊状便，无脓血，食欲好，体重6.2kg，护士认为患儿最可能是

- A. 慢性腹泻
- B. 感染性腹泻
- C. 生理性腹泻

D. 饮食性腹泻

E. 迁延性腹泻

119. 患者，男性，20岁。运动员，饱食后，进行操练，多次空翻，突然腹痛、腹胀、恶心、呕吐，肛门无排气和排便，现腹部呈阵发性绞痛，腹部检查右腹有一肠袢，初步诊断

A. 肠套叠

B. 肠扭转

C. 粘连性肠梗阻

D. 嵌顿疝

E. 肠肿瘤

120. 患者男性，52岁，因四肢乏力12小时，加重伴呼吸困难2小时入院。抽血： $K^+$ 2.11mmol/L， $CO_2$ 20.3mmol/L。突然出现呼吸、心脏骤停。可能的病因是

A. 药物中毒

B. 低钾血症

C. 冠心病

D. 贫血

E. 窒息

正保医学教育网  
答案部分

www.med66.com

### 一、A1型题

1. 【正确答案】C

【答案解析】高血压的分级：1级高血压：收缩压140~159和（或）舒张压90~99mmHg；2级高血压：收缩压160~179和（或）舒张压100~109mmHg；3级高血压：收缩压 $\geq$ 180和（或）舒张压 $\geq$ 110mmHg。

2. 【正确答案】D

【答案解析】引起心脏骤停可以是心脏本身（心源性）的原因，也可以是非心脏性（非心源性）的原因。

（1）心源性原因：以冠心病最为多见，占 80%。其他如瓣膜病变、心肌炎、心肌病、高度房室传导阻滞、遗传性 QT 间期延长、预激综合征，某些先天性心脏病等也可以引起心脏骤停。

（2）非心源性原因：电击、雷击、溺水、严重的电解质与酸碱平衡紊乱、药物中毒或过敏、麻醉和手术中的意外等。

3. 【正确答案】A

【答案解析】阑尾的体表投影在脐与右髂前上棘连线中外 1/3 交界处，称为麦氏点（McBurney 点）。是选择阑尾手术切口的标志点。

4. 【正确答案】C

【答案解析】T 管应保持引流管通畅，如有阻塞，可用手由近向远挤压引流管或用少量无菌生理盐水缓慢冲洗，切勿用力推注，但不是每日简单冲洗。故 C 选项描述错误。

5. 【正确答案】D

【答案解析】考察胆管结石临床表现。当结石阻塞胆管并继发感染时可致典型的胆管炎症状：急腹痛、高热寒战和黄疸，称为 Charcot 三联征。

6. 【正确答案】D

【答案解析】外痔在肛缘呈局限性隆起，常无明显症状。当肛缘皮下静脉丛形成血栓时，出现肛门剧痛，肛管皮下可见暗紫色肿物，边界清楚，触痛明显，称为血栓性外痔。

7. 【正确答案】A

【答案解析】经皮肝穿刺胆道造影（PTC）检查可诱发腹腔内出血、胆漏、胆道感染等并发症。

8. 【正确答案】B

【答案解析】癫痫患者平时应建立良好的生活习惯，劳逸结合，保持睡眠充足。减少精神和感觉刺激，如避免长时间地看电视、洗浴、玩游戏机等，尽量不去舞厅、歌厅、游戏厅，禁忌游泳和蒸汽浴，禁止驾驶，不可使用神经兴奋药物，需长期正规用药。故选 B。

9. 【正确答案】E

【答案解析】生长发育在整个小儿时期不断进行，呈一连续的过程，但各年龄阶段生长发育的速度不同。一般年龄越小，体格增长越快。出生后以最初 6 个月生长最快，尤其是头 3 个月，出现生后第一个生长高峰；后半年生长速度逐渐减慢，至青春期又猛然加快，出现第二个生长高峰。

10. 【正确答案】A

【答案解析】胸围大小与肺、胸廓的发育密切相关。

11. 【正确答案】E

【答案解析】坚持家庭访视：出院回家后 1~2 天内的初访，生后 5~7 天的周访，半月访视，满月访视。

12. 【正确答案】C

【答案解析】大小便训练：婴儿 3 个月后可以把尿，会坐后可以练习大小便坐盆，每次约 3~5 分钟。

13. 【正确答案】A

【答案解析】晶态智力：指通过学习和掌握社会文化经验而获得的智力，如词汇、理解力和常识等。晶态智力主要与后天的知识、文化、经验的积累有关，

所以并不一定随年龄的增长而减退，甚至还有可能提高，直至70~80岁后，才出现缓慢减退。

14. 【正确答案】E

【答案解析】医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。主体是医疗机构及其医务人员，A是正确的。医疗事故的行为具有违法性，属于过失行为，故B正确。过失造成患者人身损害，故C正确。过失可分为疏忽大意过失和过分自信过失，D是正确的。

四级医疗事故是造成患者明显人身损害或其他后果的。严重护理差错是指在护理工作中，由于技术或者责任原因发生错误，虽然给患者造成了身心痛苦或影响了治疗工作，但未造成严重后果和构成事故者。E描述有误。

15. 【正确答案】C

【答案解析】考察护理质量缺陷相关概念。护理质量缺陷表现为患者对护理的不满意、医疗事故、医疗纠纷，包括护理事故、护理差错、护理投诉等。

16. 【正确答案】D

【答案解析】选项D是护理一般病患需要的，但是对抢救危重病人此项暂不需要。

17. 【正确答案】D

【答案解析】“撤销”多适用于权利证书本身就存在不符合法律规定的情形，或采用欺骗等其他非法手段取得，或因业务程序不当所取得。权利证书自始就不符合规定。

“注销”是指到期或不适应法律规定的情形出现而依法注销，其前提是证件权利人持有的证件是通过合法途径取得的。

护士死亡或者丧失民事行为能力的，原注册部门办理注销执业注册。

此题问的是不应撤销护士执业注册的，此题应该选择D。

18. 【正确答案】A

【答案解析】中医饮食上五味指的是酸、苦、甘、辛、咸。

19. 【正确答案】D

【答案解析】学龄前期小儿睡眠护理：因学龄前期儿童想象力极其丰富，可导致儿童怕黑、做噩梦等，儿童不敢一个人在卧室睡觉，常需要成人的陪伴。

20. 【正确答案】E

【答案解析】急性一氧化碳中毒患者在意识障碍恢复后，经过2~60天的“假愈期”，可出现神经精神症状，为急性一氧化碳中毒迟发脑病。

21. 【正确答案】C

【答案解析】孕期听胎心在靠近胎背侧听的最清楚，此孕妇为ROA，因此在脐下稍偏右听的最清楚。

22. 【正确答案】A

【答案解析】左旋多巴治疗有效的指标是肌肉强直。

23. 【正确答案】B

【答案解析】新生儿硬肿症以寒冷损伤最多见，家长有护理不当的责任，因此会自我责怪；同时，可能会出现角色紊乱的心理——自己是爱孩子的家长还是害孩子的坏人？婴儿入院，家长一般都会出现焦虑不安和害怕担忧的心理反应。皮肤硬肿明显能看到，故不会出现否认疾病的心理反应。

24. 【正确答案】C

【答案解析】支气管肺癌晚期癌肿侵犯至胸背神经，可引起胸痛，同时癌肿增大可引起呼吸困难。

25. 【正确答案】D

【答案解析】羊水过多胎儿无畸形，因此临床主要是减轻症状，延长孕周，不需要立即终止妊娠。

26. 【正确答案】B

【答案解析】痛血常规检查白细胞计数及中性粒细胞比例明显增加。

27. 【正确答案】E

【答案解析】先天性心脏病是胎儿时期心脏血管发育异常而致心血管的畸形，是小儿最常见的心脏病。由于体循环血量减少或血氧下降的影响多会造成生长发育迟缓，不会出现记忆力增强的现象。与此同时，正常的活动、游戏、学习受到不同程度的限制和影响，可能会出现抑郁、焦虑、自卑、恐惧等心理从而有性格内向，情绪不稳，依赖心理增强的表现。故选E。

28. 【正确答案】E

【答案解析】直线型组织结构包括直线型、职能型、直线-职能参谋型、矩阵型、委员会及团队六种类型。直线型结构是最简单的一种组织类型。它有一个纵向的权利线，从最高领导逐步到基层一线管理者，从而构成直线结构，为管理人员提供指挥他人、要求下属行为与组织目标保持一致的权利。

29. 【正确答案】A

【答案解析】首次产检应该在确定早孕时，因此选择早期妊娠阶段即孕12周以前。

30. 【正确答案】B

【答案解析】婴儿出生以后红细胞数和血红蛋白量开始下降，至2~3个月时，红细胞数降至 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白降至100g/L，出现轻度贫血，称之为“生理性贫血”。

31. 【正确答案】D

【答案解析】煎药用火：通常遵循“先武后文”的原则。一般在未沸腾前用武火，沸后用文火，以免水分迅速蒸发，影响药物有效成分的浸出。

32. 【正确答案】B

【答案解析】重症肺炎患儿发生中毒性肠麻痹时出现明显的腹胀，呼吸困难加重，肠鸣音消失。

33. 【正确答案】E

【答案解析】公众区：指沟通双方距离在 4m 以上，一般用于正式公开讲话中，如上课、开会等。

34. 【正确答案】E

【答案解析】从胎盘娩出至产妇除乳腺外全身各器官恢复至非孕期状态的一段时期称为产褥期，一般为 6 周。

35. 【正确答案】A

【答案解析】急性炎症性脱髓鞘性多发性神经炎又称吉兰-巴雷综合征（GBS），是神经系统由体液和细胞共同介导的单向性自身免疫性疾病，主要侵犯脊神经根、脊神经和脑神经，主要病变是周围神经广泛的炎症节段性脱髓鞘。

36. 【正确答案】C

【答案解析】P 波代表心房除极的电位变化。

37. 【正确答案】A

【答案解析】第一产程分为潜伏期和活跃期，从临产开始到宫口扩张至 6cm 为活跃期，产妇正常情况下不需要抬高臀部。

38. 【正确答案】A

【答案解析】当发生空气栓塞时，空气进入静脉，可随血流先进入右心房，再进入右心室。如空气量少，则随着心脏的收缩被右心室压入肺动脉，并分散到肺小动脉内，最后经毛细血管吸收，因而损害较小；如空气量大，则空气在右心室内阻塞肺动脉入口，使血液不能进入肺内进行气体交换，引起机体严重缺氧，甚至导致病人死亡。

39. 【正确答案】B

【答案解析】高热、惊厥及呼吸衰竭是乙脑极期的严重症状，三者相互影响，呼吸衰竭常为致死的主要原因。

40. 【正确答案】D

【答案解析】肛裂是肛管皮肤的全层裂伤后所形成的慢性溃疡，常发生在肛管后正中线，即胸膝位时肛门的12点处。

41. 【正确答案】E

【答案解析】肝性脑病昏迷期应禁食蛋白质，清醒后可逐步增加蛋白饮食，每天控制在20g以内，最好给予植物蛋白，如豆制品。

42. 【正确答案】D

【答案解析】慢性肺源性心脏病病因：以慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿最多见，约占80%~90%。故选D。

43. 【正确答案】E

【答案解析】甲类传染病：鼠疫、霍乱。

44. 【正确答案】B

【答案解析】脑挫裂伤患者为预防脑水肿，降低颅内压，应采取的体位是头高足低位，有利于颅内静脉回流。

45. 【正确答案】D

【答案解析】高热、缺睡、疲劳、饥饿、便秘、饮酒、大量饮酒、闪光、精神刺激和一过性代谢紊乱等情况，都能诱发癫痫发作。

46. 【正确答案】B

【答案解析】体重增加与放置宫内节育器无关。宫内节育器的不良反应及并发症：出血，腰酸腹胀，感染，节育器嵌顿，节育器异位，脱落，带器妊娠等。

47. 【正确答案】A

【答案解析】经腹输卵管结扎护理措施：①作好术前准备。②术后观察体温、脉搏及有无腹痛等。③术后观察出血、血肿等，发现异常及时处理。④保持伤口敷料干燥、清洁，以免感染。⑤鼓励早日下床活动。⑥术后休息3~4周，禁止性生活2周。

48. 【正确答案】D

【答案解析】从臂至手，从腿到脚。

49. 【正确答案】C

【答案解析】上臂围12.5~13.5cm为营养中等。

50. 【正确答案】D

【答案解析】9~10个月的婴儿开始有主动进食的要求，可先训练自己抓取食物的能力，尽早让婴儿学习自己用勺进食。

51. 【正确答案】B

【答案解析】8个月小儿体重为：7~12个月：体重(kg)=6(kg)+月龄×0.25(kg)=8kg。

小儿每日需要能量为  $100\text{kcal/kg}$  ( $460\text{kJ/kg}$ )。所以

$8 \times 100\text{kcal/kg} = 800\text{kcal/kg}$ 。

52. 【正确答案】D

【答案解析】幼儿期小儿蛋白质每日  $40\text{g}$ ，其中，优质蛋白应占总蛋白  $1/3 \sim 1/2$ 。

53. 【正确答案】B

【答案解析】环节质量主要指护理工作活动过程质量，包括管理工作及护理业务技术活动过程。如执行医嘱、观察病情、患者管理、护理文件书写、技术操作、心理护理、健康教育等。本题属于技术操作，应该选B，环节质量评价。

54. 【正确答案】B

【答案解析】计划阶段分4个步骤：①分析现状，找出存在的质量问题；②分析原因和影响因素；③找出主要的影响；④制定改善质量的措施，提出行动计划，并预计效果。

55. 【正确答案】B

【答案解析】公正不仅指形式上的类似，更强调公正的内容。

56. 【正确答案】D

【答案解析】对于医疗卫生机构中发生的殴打护士情形，进行行政处罚的机关是公安机关。

57. 【正确答案】E

【答案解析】期前收缩  $> 5$  次/分钟称频发性期前收缩。

58. 【正确答案】C

【答案解析】根据冠状动脉病变的部位、范围及病变严重程度、心肌缺血程度，1979年WHO将本病分为以下五种类型：

(1) 无症状性心肌缺血：亦称隐匿型冠心病。病人无自觉症状，而静息或负荷试验时心电图有心肌缺血性表现（ST段压低、T波低平或倒置），或心肌灌注不足的核素心肌显像表现。

(2) 心绞痛：有发作性胸骨后疼痛，为一过性心肌供血不足引起，心肌可无组织形态改变或有纤维化改变。

(3) 心肌梗死：由于冠状动脉闭塞以致心肌急性缺血坏死，症状严重，常伴有心力衰竭、心律失常、心源性休克等严重并发症。

(4) 缺血性心肌病：临床表现与原发性扩张型心肌病类似，表现为心脏增大、心力衰竭和心律失常。为长期心肌缺血导致心肌纤维化所致。

(5) 猝死：因原发性心脏骤停而猝然死亡，多为缺血心肌局部发生电生理紊乱引起严重室性心律失常所致。

59. 【正确答案】A

【答案解析】无症状的窦性心动过缓通常不必治疗。如因心率过慢而出现症状者则可用阿托品、麻黄碱或异丙肾上腺素等药物，症状不能缓解者可考虑心脏起搏治疗。

60. 【正确答案】E

【答案解析】胃肠减压期间若发现胃管有鲜红血液吸出，应暂停吸引以免加重出血。

## 二、A2型题

61. 【正确答案】B

【答案解析】高血压的治疗目的是预防或延缓并发症的发生。

62. 【正确答案】D

【答案解析】心肺复苏的有效指标是大动脉可扪及搏动。

63. 【正确答案】B

【答案解析】考察小儿腹泻的临床表现。其中代谢性酸中毒是较为常见。

64. 【正确答案】B

【答案解析】考察麻痹性肠梗阻的病因。麻痹性肠梗阻见于急性弥漫性腹膜炎、腹部手术后、腹膜后血肿或感染等。

65. 【正确答案】B

【答案解析】急性重症胆管炎是胆总管完全梗阻并发感染，胆管内充满脓性胆汁，引起胆管内高压，并扩散至肝血窦引起胆源性败血症和感染性休克，出现夏柯三联征及休克和意识障碍。故应特别注意血压、神志等变化。

66. 【正确答案】A

【答案解析】考察胆囊炎的治疗原则。主要为胆囊切除术。手术时机和手术方式取决于病人的病情。

67. 【正确答案】A

【答案解析】肝硬化失代偿期症状——出血倾向和贫血：常有皮肤紫癜、牙龈出血、鼻出血、胃肠出血等倾向，病人可有程度不同的贫血，主要与肝合成凝血因子减少、脾功能亢进、肠道吸收障碍、营养不良、毛细血管脆性增加等因素有关。

68. 【正确答案】C

【答案解析】起病缓慢，逐渐进展。多数首发症状为动作不灵活和震颤

1. 静止性震颤：常从一侧上肢开始，上肢震颤重于下肢

1) 呈现有规律的拇指对掌屈曲的不自主震颤：如同“搓丸”样动作。

2) 因具有静止时震颤明显，动作时减轻，入睡后消失等特点，故称为“静止性震颤”

3) 随病程进展，震颤可逐步累及下颌、唇、面和四肢

2. 肌强直 本病的主要特征之一

特点：多从一侧的上肢或下肢的近端开始，逐渐蔓延至远端、对侧和全身的肌肉表现：

1) 被动运动关节时的“铅管样强直”

2) 如合并有震颤，可表现为“齿轮样强直”

3) 出现头部前倾，躯干俯屈，上臂内收，肘关节屈曲，腕关节伸直，手指内收，拇指对掌，指间关节伸直，髋、膝关节均略屈曲等特殊姿势。

3. 运动减少

① “写字过小”；

② “慌张或前冲步态”；

③ “面具脸”；

④ 日常活动受限；

⑤ 严重病人：可因口、舌、腭及咽部肌肉运动障碍而出现流涎。

进食时食物在口中咀嚼无力，咽食时发噎或反呛。甚至发生吞咽困难。

此外，病人还可出现顽固性便秘、排尿不畅、出汗、言语障碍等

⑥ 未及时治疗的晚期病人：

可有痴呆、忧郁症，也可因严重肌强直和继发性关节僵硬，使病人长期卧床而并发肺炎和压疮。

69. 【正确答案】B

【答案解析】氧气枕法适用于家庭氧疗、抢救危重病人或转移病人途中。故选B，主要考虑运送急诊患者氧疗设备需要方便携带。

70. 【正确答案】C

【答案解析】冬季室内温度保持在20~22℃，湿度55%。夏季应避免室内温度过高。

71. 【正确答案】A

**【答案解析】**个案护理：是指一个患者所需要的全部护理由一名当班护士全面负责，护理人员直接管理某个患者，即由专人负责实施个体化护理。常用于危重症患者、大手术后需要特殊护理的患者。

功能制护理：是以工作中心为主的护理方式，将工作的特点和内容划分几个部分，以岗位分工，如处理医嘱的主班护士、治疗护士、药疗护士、生活护理护士等。

小组护理：是将护理人员和患者分成若干小组，一个或一组护士负责一组患者的护理方式。小组成员由不同级别的护理人员组成，小组组长负责制订护理计划和措施，指导小组成员共同参与和完成护理任务。

责任制护理：是由责任护士和相应辅助护士对患者进行有计划有目的的整体护理，要求患者从入院到出院，由责任护士和其辅助护士负责。每个护理人员负责一定数量的患者，以患者为中心，以护理计划为内容，对患者实施有计划的、系统的、全面的整体护理。

系统性整体护理是自 20 世纪 90 年代以来开展的新型护理模式。是责任制护理的进一步完善。

72. **【正确答案】**A

**【答案解析】**肾上腺糖皮质激素：为特发性血小板减少性紫癜首选药物，该类物质可以抑制血小板与抗体结合，及阻止单核-巨噬细胞吞噬破坏血小板（主要是在脾、肝），并降低血管壁通透性。

73. **【正确答案】**E

**【答案解析】**女性新生儿的内生殖器官属于幼稚状态，因此有皱襞是错误的。

74. **【正确答案】**D

**【答案解析】**对于妊娠孕妇，患有病毒性肝炎，为阻断母婴传播，对新生儿最适宜的预防方法是应用乙肝疫苗+高效价乙肝免疫球蛋白注射。故选 D。

75. **【正确答案】**E

【答案解析】高血压 3 级有并发症，属于极高危。

76. 【正确答案】D

【答案解析】中性粒细胞与淋巴细胞的比例大致相等的时间是生后 4~6 天及 4~6 岁。

77. 【正确答案】E

【答案解析】化脓性脑膜炎的脑脊液外观混浊甚至脓样，结核性脑膜炎的脑脊液为毛玻璃样。

78. 【正确答案】C

【答案解析】鼠疫属于甲类传染病，尸体处理正确的方法是立即进行卫生处理，就近火化。

79. 【正确答案】A

【答案解析】患者呼吸困难，皮肤潮红、多汗，眼球结膜水肿等表现提示二氧化碳潴留，要警惕发生 II 型呼衰、肺性脑病，因此选择低流量持续吸氧。

80. 【正确答案】B

【答案解析】当胃囊充气不足或破裂时，食管囊可向上移动，阻塞于喉部而引起窒息，观察有无突然发生的呼吸困难或窒息表现。发现患者有此表现，立即排空气囊内气体。

81. 【正确答案】E

【答案解析】海姆立克急救法运用于呼吸道异物导致窒息的快速急救手法。

82. 【正确答案】A

【答案解析】葡萄胎的诊断一经确定后，应立即给予清除。故选 A。

83. 【正确答案】D

【答案解析】高血压危象：在高血压早期与晚期均可发生。主要表现为头痛、烦躁、眩晕、心悸、气急、视力模糊、恶心、呕吐等症状，同时可伴有动脉痉挛和累及靶器官缺血症状。

84. 【正确答案】E

【答案解析】对于心脏骤停的患者，最主要的抢救措施是心肺复苏。

85. 【正确答案】B

【答案解析】该产妇出现感染征象，查体会阴伤口红肿，其他部位无感染。

86. 【正确答案】E

【答案解析】对于子宫内膜异位症的患者，首选检查方法为腹腔镜检查。

87. 【正确答案】C

【答案解析】对于 COPD 发作的病人，应鼓励患者多饮水，以稀释痰液，促进痰液排出，必要时可静脉补充液体，该题题干部分已明确提出患者咳黏液痰，因而更需注意液体的补充。

88. 【正确答案】B

【答案解析】放疗皮肤干性反应表现为红斑、有烧灼和刺痒感，湿性反应表现为高度充血、水肿渗出、糜烂。干性反应可用不含金属（氧化锌等）的粉剂如冰片或 0.2%薄荷淀粉止痒，湿性反应可涂 2%甲紫或氢化可的松霜，不必包扎；水疱可涂硼酸软膏，包扎 1~2 日，待渗出吸收后改用暴露疗法。

89. 【正确答案】E

【答案解析】穿孔：常发生于十二指肠溃疡，主要表现为腹部剧痛和具有急性腹膜炎的体征。当溃疡病病人腹部疼痛变为持续性，进食或用抑酸药后长时间疼

痛不能缓解，并向背部或两侧上腹部放射时，常提示可能出现穿孔。根据题干中信息提示，故选 E。

90. 【正确答案】 C

【答案解析】在医学实践中，不伤害是指在诊治、护理过程中不使患者的身心受到损伤。有利原则又称有益原则。在医学实践中，有利原则有狭义和广义之分。狭义有利原则是指医务人员履行对患者有利的德行，即医务人员的诊治、护理行为对患者确有助益，既能减轻痛苦或同时又能促进康复；广义的有利原则不仅对患者有利，而且医务人员的行为有利于医学事业和医学科学的发展，有利于促进人群、人类的健康和福利。然而，通常有利原则首先是指狭义的说法。由上看出，有利原则比不伤害原则的内容广泛，层次也高。

91. 【正确答案】 A

【答案解析】体温上升期的特点为产热大于散热，故患者出现畏寒、皮肤苍白、无汗。

92. 【正确答案】 C

【答案解析】坠积性肺炎：主要发生于因骨折长期卧床不起者。故选 C。

93. 【正确答案】 C

【答案解析】骨筋膜室综合征常见于前臂和小腿骨折，主要表现为肢体剧痛、肿胀、指（趾）呈屈曲状、活动受限、局部肤色苍白或发绀，常由骨折血肿、组织水肿或石膏管过紧引起。其余选项均为晚期并发症。

94. 【正确答案】 D

【答案解析】有机磷轻度中毒：全血胆碱酯酶活力一般在 50%~70%。

95. 【正确答案】 A

【答案解析】一氧化碳严重中毒病人给予高压氧治疗，可加速碳氧血红蛋白解离，促进一氧化碳排出。

96. 【正确答案】B

【答案解析】血压低、中心静脉压低、尿量少，说明血容量严重不足，应充分补液。

97. 【正确答案】A

【答案解析】瘫痪患者需要喂食时，应按照其进食习惯、次序与方法等耐心喂食。每次喂食量及速度要适中，温度适宜，饭与菜、固体与液体食物应轮流喂食。进食流质饮食的病人，可使用吸管。故选 A。

98. 【正确答案】D

【答案解析】对于慢性肺源性心脏病急性加重期的患者，应首先积极控制感染，参考痰菌培养及药敏试验选择抗生素。

99. 【正确答案】B

【答案解析】《献血法》第二条规定“国家实行无偿献血制度。国家提倡十八周岁至五十五周岁的健康公民自愿献血。”

100. 【正确答案】C

【答案解析】糖尿病患者微血管病变：主要表现在视网膜、肾、神经和心肌组织，其中尤以糖尿病肾病和视网膜病变为重要。

101. 【正确答案】D

【答案解析】由稍事休息即出现症状，判断患者心功能为Ⅲ级，以卧床休息、限制活动为宜。

102. 【正确答案】E

【答案解析】胸腔闭式引流正常的水柱上下波动为4~6cm，若波动停止，表明该系统有堵塞或肺已完全膨胀。

103. 【正确答案】B

【答案解析】颅底骨折：多为强烈间接暴力引起，常伴有硬脑膜破裂，引起脑脊液外漏或颅内积气，故诊断颅底骨折的主要依据是脑脊液漏。

104. 【正确答案】B

【答案解析】口底、颌下与颈部的急性蜂窝织炎，易致喉头水肿、气管受压，引起呼吸困难甚至窒息。

105. 【正确答案】D

【答案解析】术后切口裂开的主要原因有营养不良、缝合不好、腹内压力突然增高、切口感染等。

106. 【正确答案】D

【答案解析】痛风：多于春秋发病，酗酒、过度疲劳、关节受伤、关节疲劳、手术、感染、寒冷、摄入高蛋白和高嘌呤食物等为常见的发病诱因。故选D。

107. 【正确答案】E

【答案解析】蛛网膜下腔出血起病急骤，常在活动中突然发病，表现为剧烈头痛，喷射性呕吐，脑膜刺激征阳性，一般无肢体瘫痪。故选E。

108. 【正确答案】C

【答案解析】紫色盖头的抗凝管是用EDTA的钠盐或钾盐作为抗凝剂，使用EDTA抗凝做交叉配血。如果是用肝素或枸橼酸钠做抗凝剂的血浆，操作时要多加3~5滴凝聚胺剂中和其抗凝作用，故其他颜色的真空采血管都不合适。

109. 【正确答案】A

【答案解析】该患儿患病时间为9月份，大便特点为黄色，蛋花汤样，每日10余次，量多，无腥臭味，符合轮状病毒引起的秋季腹泻，治疗时大量使用抗生素不恰当。

110. 【正确答案】D

【答案解析】脑血栓病人采取平卧位，以便使较多血液供给脑部，头部禁止使用冰袋及冷敷，以免脑血管收缩、血流减慢而使脑血流量减少。故选D。

111. 【正确答案】B

【答案解析】安定（地西洋）

主治：焦虑症及各种神经官能症。失眠。抗癫痫：与其他抗癫痫药合用，治疗癫痫小发作和大发作。静注安定是控制癫痫持续状态的首选药物。

112. 【正确答案】D

【答案解析】法洛四联症即：室间隔缺损、主动脉骑跨、肺动脉狭窄和右心室肥厚。临床表现为发绀，发育不良，体格生长落后，部分患儿智力低下，蹲踞现象，杵状指，年长儿常诉头痛、头昏。故本病例患儿因缺氧导致意识障碍。故选D。

113. 【正确答案】A

【答案解析】一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的。

二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的。

三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的。

四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

114. 【正确答案】D

【答案解析】小组护理是将护理人员和患者分成若干小组，一个或一组护士负责一组患者的护理方式。小组成员由不同级别的护理人员组成，小组组长负责制订护理计划和措施，指导小组成员共同参与和完成护理任务。

115. 【正确答案】C

【答案解析】高血压脑病：重症高血压病人易发生。临床表现以脑病症状和体征为特点，严重头痛、呕吐、意识障碍、精神错乱、抽搐，甚至昏迷。本题患者的症状符合高血压脑病，故选择C。

116. 【正确答案】C

【答案解析】本题考察法洛四联症外科治疗。绝大多数患儿可施行根治术。轻症患儿，手术年龄以5~9岁为宜。根治有困难可做姑息手术即体肺分流术。

117. 【正确答案】D

【答案解析】考察并发症。阑尾炎术后出现直肠刺激征，提示盆腔脓肿。直肠刺激症状：直肠、肛门、外阴部坠胀、坠痛、里急后重感和大便次数增多。

118. 【正确答案】C

【答案解析】题干“5个月的患儿”“大便无脓血”“食欲好”提示生理性腹泻。

孩子胃肠功能尚未发育成熟或是过敏性体质而导致腹泻。多见于6个月以内母乳喂养的有过敏体质的婴儿。这些孩子外观常显得比较虚胖，并且脸部常有湿疹，出生后不久就出现稀水样大便、伴有奶瓣或少许透明黏液，或有酸味，但无臭味，大便每天多达7~8次。孩子除大便次数多不成形外，无其他不适，精神好、食欲佳，体重照常增长。生理性腹泻一般不影响孩子的发育，不需要治疗，随着月龄的增长，按时添加泥糊状食品，大便就能逐渐转为正常。

119. 【正确答案】B

【答案解析】考察肠扭转的病因。年轻男性，饱餐后剧烈运动后出现肠梗阻表现，以及腹部不对称表现，提示肠扭转。

120. 【正确答案】B

【答案解析】题干除了“抽血： $K^+$ 2.11mmol/L， $CO_2$ 20.3mmol/L”均低于正常值，没有其他提示，故此患者产生心脏骤停的原因是严重电解质与酸碱平衡紊乱。血清钾 3.5~5.5mmol/L，低钾血症会导致心脏功能异常：表现为心动过速、血压下降、心室颤动和心脏停搏。

