

主管护师《专业知识》模考试卷

一、A1 型题

1. 下列对于高血压诊断的说法正确的是

- A. 不同时间测量两次血压，一次超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- B. 测量两次血压，均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- C. 测量三次血压，均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- D. 不同时间测量三次血压，均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- E. 不同时间测量三次血压，一次超过正常血压值的高限可诊断为高血压

2.

下列哪个选项不属于肝性脑病的临床分期

- A. 前驱期
- B. 昏迷前期
- C. 昏睡期
- D. 昏迷期
- E. 昏迷后期

3.

肝硬化患者出现持续性白细胞减少，与下列哪个选项关系最大

- A. 脾功能亢进
- B. 营养吸收障碍
- C. 上消化道出血
- D. 肝肾综合征
- E. 低蛋白血症

4.

急性胰腺炎患者不可使用的止痛剂是

- A. 阿托品

- B. 东莨菪碱
- C. 山莨菪碱
- D. 吗啡
- E. 哌替啶

5.

双气囊三腔管压迫止血适用于

- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 急性出血性糜烂性胃炎出血
- C. 胃癌并出血
- D. 胆道出血
- E. 消化性溃疡并发出血

6.

治疗消化性溃疡时为杀灭幽门螺杆菌，首选的药物是

- A. 阿莫西林
- B. 甲硝唑
- C. 奥美拉唑
- D. 碳酸氢钠
- E. 硫糖铝

7.

原发性肝癌患者突然出现腹部剧痛及腹膜刺激征，首先应考虑的是

- A. 肝癌腹膜转移
- B. 肝癌结节破裂
- C. 急性胃穿孔
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性胰腺炎

8.

慢性肾衰竭后期的病人，一旦出现下列哪种情况提示病情严重

- A. 少尿、高血钾
- B. 中度贫血
- C. 乏力、食欲减退
- D. 水肿、低钠血症
- E. 呼气有尿臭味

9.

毒物排泄的主要途径为

- A. 肝
- B. 肠道
- C. 呼吸道
- D. 胆管
- E. 肾

10.

对吸入性有机磷农药中毒者，抢救的关键是

- A. 保持呼吸道通畅
- B. 及时导泻
- C. 撤离中毒环境
- D. 彻底洗胃
- E. 大剂量使用解磷定

11.

格林-巴利综合征患者可能危及生命的并发症是

- A. 癔症发作

- B. 脑神经损伤
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸肌瘫痪
- E. 压疮

12.

帕金森病患者躯体呈前倾前屈姿势，行走时上肢协同摆动动作消失或减少，起步和终止均有困难，步距缩小，这种特殊步态称为

- A. 醉汉步态
- B. 跨越步态
- C. 划圈步态
- D. 鸭步
- E. 慌张步态

13.

帕金森患者的临床表现不应有

- A. 静止性震颤
- B. 面具样脸
- C. 慌张步态
- D. 写字过小征
- E. 角膜 K-F 环

14.

蛛网膜下腔出血患者最突出的表现是

- A. 恶心、呕吐
- B. 剧烈头痛
- C. 烦躁不安
- D. 意识障碍

E. 偏瘫失语

15.

慢性支气管炎最突出的症状是

- A. 长期反复咳嗽
- B. 有传染性
- C. 时有胸痛
- D. 反复发热
- E. 少量咯血

16.

支气管哮喘典型的临床症状是

- A. 胸闷
- B. 胸痛
- C. 咯血
- D. 干咳
- E. 反复发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难

17.

重度哮喘的处理不包括

- A. 补液
- B. 吸氧
- C. 静滴氨茶碱
- D. 注射毛花苷 C
- E. 给予糖皮质激素

18.

慢性肺源性心脏病肺、心功能失代偿期出现神志恍惚、谵妄，则可能出现了

- A. 休克
- B. 出血
- C. 昏迷
- D. 肺性脑病
- E. 心力衰竭

19.

干性支气管扩张是指

- A. 干咳为主
- B. 病变局限于上叶
- C. 仅有早晨咳嗽及咳痰
- D. 仅有反复咯血，一般无咳嗽、咳痰
- E. 纤维支气管镜检见支气管黏膜干燥、萎缩

20.

肺炎球菌肺炎患者最具特征性的症状是

- A. 寒战、高热
- B. 胸痛
- C. 咳嗽
- D. 呼吸困难
- E. 咳铁锈色痰

21.

肺炎球菌肺炎的抗菌治疗应首选

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 阿米卡星（丁胺卡那霉素）

E. 头孢菌素类

22.

下列属于全杀菌药的抗结核药物是

- A. 链霉素
- B. 异烟肼
- C. 对氨基水杨酸
- D. 乙胺丁醇
- E. 阿司匹林

23.

肺脓肿患者的热型常呈

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 波状热
- E. 不规则热

24.

自发性气胸的治疗应首选

- A. 鼻塞给氧
- B. 排气减压
- C. 镇静止痛
- D. 镇咳祛痰
- E. 手术治疗

25.

心源性呼吸困难的主要原因是



正保医学教育网

www.med66.com

- A. 肺循环淤血
- B. 体循环淤血
- C. 气道痉挛狭窄
- D. 呼吸中枢兴奋
- E. 极度紧张、恐慌

26.

急性肾衰病人的饮食护理中错误的是

- A. 高蛋白
- B. 高热量
- C. 充足维生素
- D. 忌含钾丰富的食物
- E. 控制入水量

27.

急性肾衰竭少尿期营养供给时，错误的方法

- A. 每日摄钠 1~2g
- B. 限制含钾的食物
- C. 高热量饮食以糖为主
- D. 充足的维生素
- E. 高蛋白饮食

28.

属于 ARDS 初期表现的是

- A. 发绀
- B. 呼吸困难
- C. 肺内明显湿啰音
- D. 代谢性酸中毒

E. 意识障碍

29.

病人呼吸骤停后，最简单且有效的建立人工呼吸的方法是

- A. 麻醉机
- B. 人工呼吸机
- C. 气管插管呼吸
- D. 简易气囊呼吸器
- E. 口对口人工呼吸

30.

心搏骤停病人首选的复苏药物是

- A. 阿托品
- B. 碳酸氢钠
- C. 利多卡因
- D. 肾上腺素
- E. 异丙肾上腺素

31.

破伤风治疗最重要的环节是

- A. 镇静、解痉
- B. 局部创口处理
- C. 注射破伤风抗毒素
- D. 全身支持疗法
- E. 病室安静，减少刺激

32.

当在为年轻女性体检时，发现乳房肿块，最常见的疾病是

- A. 乳腺癌
- B. 乳管内乳头状瘤
- C. 乳房肉瘤
- D. 乳腺纤维腺瘤
- E. 乳腺囊性增生病

33.

急性乳腺炎后期治疗的最主要措施是

- A. 外敷药物
- B. 患乳停止哺乳
- C. 热敷
- D. 全身用抗生素
- E. 切开引流

34.

小儿肠套叠粪便的特点是

- A. 脓血便
- B. 黏液便
- C. 果酱样血便
- D. 柏油样便
- E. 白陶土便

35.

肛裂的疼痛特点是

- A. 有两次高峰
- B. 便血
- C. 便秘
- D. 排便时疼痛



E. 便后疼痛

36.

内痔的主要表现是

- A. 肛门疼痛
- B. 大便时滴血
- C. 血栓形成
- D. 黏液血便
- E. 肛门周围红肿

37.

门静脉高压症最凶险的并发症是

- A. 感染
- B. 贫血
- C. 大出血
- D. 肝性脑病
- E. 低蛋白血症

38.

早期原发性肝癌最有效的治疗方法是

- A. 肝切除术
- B. 肝移植术
- C. 肿瘤穿刺注射抗癌药物
- D. 化学治疗
- E. 放射治疗

39.

胆总管结石合并急性胆管炎时表现为

- A. 腹痛
- B. 寒战
- C. 高热
- D. 黄疸
- E. 以上都有

40.

急腹症最突出的表现为

- A. 腹痛
- B. 败血症
- C. 休克
- D. 恶心、呕吐
- E. 腹泻

41.

颅内压增高的重要客观体征是

- A. 头痛
- B. 呕吐
- C. 视乳头水肿
- D. 咳嗽
- E. 失明

42.

颅内肿瘤病人最常见的共有表现是

- A. 意识障碍
- B. 癫痫
- C. 颅内压增高
- D. 运动障碍



E. 视力障碍

43.

牵引的主要作用不包括

- A. 肢体制动、减轻疾病
- B. 骨折和脱位的复位和固定
- C. 促进患肢血液供应
- D. 矫正和预防挛缩畸形的肢体
- E. 解除肌肉痉挛，防止畸形

44.

椎动脉型颈椎病最突出的症状是

- A. 恶心
- B. 猝倒
- C. 头痛头晕
- D. 视物不清
- E. 耳鸣耳聋

45.

多数腰椎管狭窄症患者的治疗原则是

- A. 非手术治疗
- B. 椎板切除
- C. 神经根扩大术
- D. 神经根粘连松解术
- E. 脊柱融合内固定术

46.

腰椎间盘突出症时，可以减轻椎间隙压力、促进髓核还纳的治疗方法是

- A. 给予镇痛药
- B. 骨盆牵引
- C. 腰背肌锻炼
- D. 睡软床
- E. 硬膜外注射皮质激素

47.

由于骨生长方向出现异常，长骨干骺区再塑形错误，病人会生长

- A. 骨肉瘤
- B. 转移瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 尤文肉瘤
- E. 骨巨细胞瘤

48.

患者男性，29岁。体重60kg，烧伤面积为60%，7小时后入院，经注射吗啡，头孢类抗生素和生理盐水1000ml，仍有休克。应考虑为

- A. 神经性休克
- B. 感染性休克
- C. 心源性休克
- D. 低血容量性休克
- E. 中毒性休克

49.

乳腺癌在病理上恶性程度最大的是

- A. 腺样囊性癌
- B. 乳头湿疹样癌
- C. 炎性乳腺癌

- D. 导管内癌
- E. 小叶原位癌

50.

对于妊娠合并急性病毒性肝炎的描述，错误的是

- A. 肝炎患者原则上不宜妊娠
- B. 孕早期不宜终止妊娠，因可增加肝损害
- C. 妊娠晚期应预防妊娠期高血压疾病
- D. 分娩期应预防产后出血
- E. 产褥期应用抗生素预防感染

51.

纠正异常宫缩采用的方法为

- A. 给镇静药
- B. 50%硫酸镁液湿热敷
- C. 宫口开全，指导产妇屏气用力
- D. 温肥皂水灌肠
- E. 24h 一次肛查

52.

下述哪种情况可使用催产素

- A. 宫颈水肿
- B. 头盆不称
- C. 不协调性宫缩乏力
- D. 协调性宫缩乏力
- E. 子宫痉挛性狭窄环

53.

骨盆的入口平面狭窄，影响胎头的

- A. 衔接
- B. 内旋转
- C. 外旋转
- D. 复位
- E. 俯屈

54.

最常用的臀位矫正方法是

- A. 胸膝卧位
- B. 激光照射
- C. 针刺至阴穴
- D. 外转胎位术
- E. 红光照射

55.

为避免早产儿发生呼吸窘迫综合征，可在分娩前使用

- A. 尼可刹米
- B. 纳洛酮
- C. 地塞米松
- D. 维生素 C
- E. 紫杉醇

56.

抢救羊水栓塞的首要措施是

- A. 纠正 DIC 及继发纤溶
- B. 纠正呼吸循环衰竭
- C. 纠正肾功能衰竭

- D. 立即终止妊娠
- E. 切除子宫

57.

妇科检查错误的是

- A. 嘱排空膀胱
- B. 取膀胱截石位
- C. 使用消毒器具
- D. 对所有病人均作阴道检查
- E. 月经期一般不做内诊

58.

白带呈泡沫状，阴道黏膜散在红斑点，可用

- A. 甲硝唑
- B. 孕激素
- C. 雌激素
- D. 制霉菌素
- E. 5%碳酸氢钠冲洗

59.

下列不属于非特异性外阴炎临床表现的是

- A. 外阴皮肤瘙痒
- B. 排尿时外阴灼痛
- C. 外阴皮肤充血、肿胀
- D. 外阴皮肤溃疡或湿疹
- E. 白带增多呈脓性

60.

艾滋病的机会性感染死亡的主要原因是

- A. 隐孢子虫
- B. 肺孢子菌肺炎
- C. 无菌性脑炎
- D. 外阴疱疹病毒感染
- E. 尖锐湿疣

61.

慢性盆腔炎的临床表现不包括

- A. 不孕
- B. 月经不调
- C. 下腹隐痛
- D. 异位妊娠
- E. 恶心、呕吐

62.

对外阴尖锐湿疣的处理错误的是

- A. 病灶小可用三氯醋酸涂局部
- B. 局部用 5% 氟尿嘧啶液贴敷
- C. 病灶较大可行手术切除
- D. 以全身应用抗生素为主
- E. 可用激光或冷冻治疗

63.

针对尖锐湿疣不合适的处理措施是

- A. 局部用药为主
- B. 孕妇无需治疗，选择剖宫产终止妊娠即可
- C. 大的尖锐湿疣可行手术切除

- D. 治疗期间禁止性生活
- E. 可用冷冻或 CO₂ 激光治疗

64.

急性淋病的治疗，首选治疗药物是

- A. 红霉素+链霉素
- B. 头孢曲松钠+红霉素
- C. 庆大霉素+甲硝唑
- D. 阿米卡星
- E. 青霉素+四环素

65.

初乳中含量较多的免疫因子是

- A. IgG
- B. IgD
- C. sIgA
- D. IgM
- E. IgE

66.

新生儿发生硬肿症后最主要的治疗原则为

- A. 复温
- B. 预防感染
- C. 合理喂养
- D. 预防肺出血
- E. 及早使用抗生素

67.

新生儿颅内出血一般发生于生后

- A. 1~2 日内
- B. 2~3 日内
- C. 3~5 日内
- D. 5~7 日内
- E. 6 日内

68.

维生素 D 缺乏性佝偻病激期的主要临床表现是

- A. 睡眠不安，易惊
- B. 肌肉松弛
- C. 多汗、低热
- D. 骨骼系统改变
- E. 枕秃

69.

咽-结合膜热的病原体为

- A. 柯萨奇病毒
- B. 腺病毒
- C. 葡萄球菌

D. 溶血性链球菌

E. 鼻病毒

70.

法洛四联症患儿喜蹲踞位是因为

- A. 心脑血管血量增加
- B. 缓解漏斗部痉挛
- C. 腔静脉回心血量增加

- D. 休息，缓解疲劳
- E. 增加循环阻力，减少右向左分流血量

71.

急性肾小球肾炎前驱感染-呼吸道感染通常在肾炎发病前

- A. 1~2 周
- B. 2~3 周
- C. 4~6 周
- D. 1~3 天
- E. 5~7 天

72.

下列哪项不是化脓性脑膜炎的治疗原则

- A. 早期用药
- B. 大剂量用药
- C. 对症处理
- D. 坚持用药
- E. 联合用药

73.

结核性脑膜炎晚期的表现为

- A. 性情改变
- B. 呕吐
- C. 脑膜刺激征阳性
- D. 发热
- E. 呈强直状态

二、A2 型题

74. 患者，男性，63岁，持续心前区痛5小时，确诊为急性心肌梗死收入监护室，监测中发现患者出现心室纤颤，此时责任护士应即刻采取的首要措施是

- A. 静脉注射利多卡因
- B. 静脉注射异丙肾上腺素
- C. 静脉注射毛花苷C
- D. 非同步直流电除颤
- E. 同步直流电除颤

75.

患者，女性，32岁，5天前出现发热、乏力、恶心、食欲下降，查巩膜轻度黄染，肝肋下1cm，质软，血常规示RBC 4.5×10^{12} ，WBC $6.5 \times 10^9/L$ ，肝功能示ALT760U/L，总胆红素 $54 \mu\text{mol/L}$ 。该患者的诊断首先应考虑为

- A. 伤寒
- B. 急性食物中毒
- C. 病毒性肝炎
- D. 肝硬化
- E. 钩体病

76.

男，78岁。3小时前突发心悸、喘憋、不能平卧，既往高血压病史30余年，医生确诊为高血压心脏病，急性左心衰，给予患者强心、利尿、扩血管等药物治疗。关于药物护理不正确的是

- A. 严格记录出入液量
- B. 注意电解质是否紊乱
- C. 硝普钠应每4小时重新配制一次
- D. 加快输液速度以防止扩血管后发生低血压
- E. 观察患者有无恶心、呕吐、心悸、头痛等反应

77.

男性，58岁。有慢性支气管炎、肺气肿病史多年，于阵咳后突然出现呼吸困难、右胸刺痛，并逐渐加重。该患者最可能的诊断是

- A. 气胸
- B. 呼吸衰竭
- C. 支气管哮喘
- D. 慢支急性发作
- E. 急性心肌梗死

78.

男性，46岁，腹部被自行车车把撞击伤2小时后出现面色苍白，脉搏120次/分，血压70/50mmHg，全腹腹膜刺激征(+)，腹腔穿刺抽出不凝血液，诊断可能是

- A. 胃穿孔
- B. 腹壁血肿
- C. 肝脾破裂
- D. 结肠破裂
- E. 急性胰腺炎

79.

男性，62岁。近3个月逐渐出现上腹部不适，进食后饱胀，嗝气，纤维胃镜发现大弯侧胃壁上1cm大小块状肿物。与周围组织界限不清，病理回报恶性诊断为胃癌，患者首选的治疗方法是

- A. 手术
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 免疫治疗
- E. 保守治疗

80.

某患者绝经 6 年，近来有阴道少量流血，刮宫时发现：刮出物为沉渣样组织，可能的诊断为

- A. 宫颈癌
- B. 子宫内膜癌
- C. 子宫肌瘤
- D. 附件囊肿
- E. 老年性阴道炎

81.

患者 58 岁，已绝经 8 年，因不规则出血来院检查诊断子宫内膜癌，下述哪项不是该病特点

- A. 生长缓慢
- B. 转移较晚
- C. 绝经后妇女多见
- D. 疼痛出现较早
- E. 糖尿病患者患病高

82.

女，28 岁，14 岁月经来潮，周期正常。现停经 45 天，阴道流血持续 20 天，时多时少，无腹痛。妇科检查：宫颈光滑，颈管内有透明分泌物，作涂片见羊齿植物叶状结晶，子宫前位正常大小，附件未及。可能的诊断是

- A. 异位妊娠
- B. 流产
- C. 子宫内膜不规则脱落
- D. 无排卵性功血
- E. 黄体功能不足

83. 46

岁患者，近1年来月经不规律，现停经48d，发生阴道大出血。妇检：宫颈中度糜烂，子宫饱满，稍软，首选的止血方法是

- A. 雄激素
- B. 孕激素
- C. 雌激素
- D. 刮宫
- E. 止血+补血药

84.

王女士，有糖尿病史，近日发现外阴瘙痒，阴道有大量白色稠厚豆渣样白带，最可能的疾病是

- A. 外阴阴道假丝酵母菌病
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 慢性宫颈炎
- D. 子宫内膜炎
- E. 输卵管炎

85.

李女士因患滴虫性阴道炎，准备口服甲硝唑，正确的是

- A. 200mg，每日3次，连服10天
- B. 200mg，每日2次，连服10天
- C. 400mg，每日3次，连服7天
- D. 400mg，每日2次，连服10天
- E. 400mg，每日2次，连服7天

86.

某患儿3岁，突发腹痛、腹胀、急性腹泻来院就诊，患儿粪便表现为红色果酱样便，发病第三天，突然表现为发热、面色苍白，继而发生了休克，治疗休克时，应按照下列哪种休克进行治疗

- A. 低血容量性休克
- B. 感染性休克
- C. 心源性休克
- D. 神经源性休克
- E. 过敏性休克

87.

某1周岁小儿，在秋季发生腹泻，并有呼吸道症状，3~8天后痊愈。此患儿可能由哪种微生物感染

- A. 轮状病毒
- B. 链球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 真菌
- E. 金黄色葡萄球菌

88.

某8个月患儿因感染性休克入院治疗，目前确诊为休克，护士不应当在患儿身上观察到

- A. 脉搏细速
- B. 四肢湿冷
- C. 呼吸急促
- D. 全天尿量500ml
- E. 脉压小

三、A3/A4型题

患者，男性，40岁。主因突发剧烈头痛3小时，伴呕吐，查体：体温37.3℃，血压140/80mmHg，颈抵抗，Kernig征(+)。

89. 诊断首先考虑

- A. 脑出血
- B. 结核性脑膜炎
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑梗死
- E. 偏头痛发作

90. 该患者最可靠的诊断依据是

- A. 剧烈头痛、呕吐
- B. 偏瘫
- C. Kernig征
- D. 腰椎穿刺为均匀一致血性脑脊液
- E. 头颅MRI

91. 确定护理诊断时应除外

- A. 疼痛：头痛
- B. 焦虑、恐惧
- C. 潜在并发症：再出血
- D. 体液过多
- E. 知识缺乏

92. 患者致命的并发症为

- A. 脑积水
- B. 脑血管痉挛
- C. 再出血

- D. 神经源性心脏
- E. 脑疝

患者女性，50岁。近几年来逐渐出现心悸、乏力、活动后气急。体检发现：心脏向左下扩大。主动脉瓣区听诊叹息样杂音。

93. 首先考虑的诊断是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肥厚型梗阻性心肌病

94. 对诊断最有价值的检查方法是

- A. 胸部 X 线摄片
- B. 超声心动图
- C. 冠状动脉造影
- D. 心电图
- E. 心脏核素检查

女性，28岁，平时月经规律，周期29天，因停经50d，少量阴道痛2d入院。妇科检查：阴道有少量暗褐色血液，宫颈着色、举痛，子宫增大，右侧附件增厚，压痛。

95. 根据患者的临床表现，有可能诊断为

- A. 异位妊娠
- B. 先兆流产

- C. 子宫肌瘤
- D. 葡萄胎
- E. 输卵管炎症

96. 首选简易的辅助方法是

- A. 诊断性刮宫
- B. 阴道镜检查
- C. 盆腔 B 超检查
- D. 宫腔镜检查
- E. 腹腔镜检查

患儿男，2 岁。T39℃，1 小时前以上感急诊入院，治疗期间患儿突然出现双眼凝视，全身抽搐，意识丧失。

97. 该患儿最可能的诊断是

- A. 高热惊厥
- B. 低钙惊厥
- C. 中毒性脑病
- D. 癫痫
- E. 化脓性脑膜炎

98. 对该患儿首要的处理措施是

- A. 针刺人中、百会等穴位以控制惊厥
- B. 寻找病因
- C. 应用抗惊厥药物
- D. 按医嘱给予抗生素治疗
- E. 向家长讲解惊厥的预防及急救

99. 惊厥的护理措施中正确的是

- A. 立即送抢救室
- B. 首先给予脱水处理
- C. 大声喊叫唤醒患儿
- D. 勿牵拉、按压肢体
- E. 吸入纯氧

100. 患儿出院时进行健康指导的重点是

- A. 体格锻炼的方法
- B. 完成计划免疫
- C. 讲解惊厥的预防及急救措施
- D. 半年后做脑电图检查
- E. 做健康体检

2022年主管护师《专业知识》考前模考大赛（二）答案部分

一、A1型题

1.

【正确答案】D

【答案解析】①在机体休息状态下，收缩压大于140mmHg，舒张压大于90mmHg；
②不在同一天的两次测量都到达以上标准即可诊断为高血压。

2.

【正确答案】E

【答案解析】肝性脑病的临床分期为：潜伏期、前驱期、昏迷前期、昏睡期、昏迷期。

3.

【正确答案】A

【答案解析】肝硬化患者代偿期血常规多正常，失代偿期有轻重不同的贫血，伴脾功能亢进时白细胞和血小板计数减少。

4.

【正确答案】D

【答案解析】急性胰腺炎患者解痉镇痛治疗时禁用吗啡，以防引起 Oddi 括约肌痉挛，加重病情。

5.

【正确答案】A

【答案解析】双气囊三腔管压迫止血是治疗门静脉高压引起的食管-胃底静脉曲张破裂大出血的重要措施。

6.

【正确答案】C

【答案解析】PPI 是根除幽门螺杆菌基础药物。常用奥美拉唑（洛赛克）、兰索拉唑、泮托拉唑。

7.

【正确答案】B

【答案解析】肝癌结节破裂出血：约 10% 的病人死于肝癌结节破裂出血。破裂可局限于肝包膜下，表现为局部疼痛；如肝包膜下出血迅速增多则形成压痛性包块；也可破入腹腔引起急性腹膜炎。

8.

【正确答案】A

【答案解析】本题考查慢性肾衰竭的临床表现。慢性肾衰竭病人出现少尿、高血钾的时候，会导致肌肉无力、心律失常，甚至心脏骤停。故高血钾属于慢性肾衰竭的急重症，当血钾高于 6.5mmol/L 时，已属于透析指征。所以，当患者出现少尿、高血钾的时候提示病情严重。贫血、食欲减退、水肿、低钠和呼出尿臭味的气体等，虽然也属于慢性肾衰竭晚期的表现，但是均不会危及生命，所以不能提示病情严重。

9.

【正确答案】E

【答案解析】本题考查的是毒物排出的知识。毒物排泄的主要途径为肾，其次可经胆道、大肠的黏膜排泄。

10.

【正确答案】C

【答案解析】吸入性中毒最关键的是首先撤离中毒的环境。

11.

【正确答案】D

【答案解析】格林-巴利综合征患者主要死因为呼吸肌麻痹、肺部感染及心力衰竭。

12.

【正确答案】E

【答案解析】帕金森病患者颈肌、躯干肌强直可使躯体呈前屈姿势，行走时起步和终止均有困难，上肢协同摆动动作消失或减少，步距缩短，碎步、人往前冲，呈“慌张步态”。

13.

【正确答案】E

【答案解析】帕金森患者的临床表现有：①静止性震颤；②面具样脸；③慌张步态；④写字过小征。

14.

【正确答案】B

【答案解析】蛛网膜下腔出血时，脑膜刺激征明显，故头痛剧烈。

15.

【正确答案】A

【答案解析】慢性支气管炎的特点为缓慢起病，反复急性发作，逐渐加重。主要症状有慢性咳嗽、咳痰、喘息。

16.

【正确答案】E

【答案解析】胸闷可见于任何缺氧状态，如心力衰竭，排除A；胸痛可见于胸廓内脏器病变、神经病变、血管、骨骼病变等，如肋骨骨折，故排除B；咯血可见于肺癌、肺结核、支气管扩张等疾病，与题干不符，可排除C；哮喘反复发作，喉、支气管黏膜层大量炎症细胞浸润，黏液腺增生，基底膜增厚，支气管平滑肌增生，通气功能明显降低。典型的支气管哮喘表现为反复发作性喘息，急性发作时，两肺闻及弥漫性哮鸣音，以呼气期为主。

17.

【正确答案】D

【答案解析】重度哮喘时需给氧，用氨茶碱扩张支气管，增强呼吸肌收缩；糖皮质激素静滴，阻止呼吸道炎症发展，降低气道高反应性；并适当补液，维持水、电解质平衡。而毛花苷C为强心剂，可增强心肌收缩力，如无心衰，不需应用。

18.

【正确答案】D

【答案解析】慢性肺源性心脏病肺、心功能失代偿期呼吸困难加重，夜间为甚，常有头痛、失眠、食欲下降等，甚至出现表情淡漠、神志恍惚、谵妄等，这是肺性脑病的典型表现。

19.

【正确答案】D

【答案解析】干性支气管扩张多发生于引流好的部位，不易感染，不一定局限于上叶，故排除B；以咯血为唯一症状，平时咳嗽、咳痰不明显，故排除A、C，而选项D正确；纤维支气管镜检无支气管黏膜干燥、萎缩，故排除E。

20.

【正确答案】E

【答案解析】寒战、高热是许多感染性疾病的共同临床表现，不具有特征性，排除A；胸痛可见于胸廓内脏器病变、神经病变、血管、骨骼病变等，如肋骨骨折，故排除B；咳嗽可见于慢支、肺癌、肺结核、支气管扩张等疾病，与题干不符，可排除C；呼吸困难可见于任何缺氧状态，如心力衰竭，排除D；而肺炎球菌肺炎在红色肝样变期肺泡腔内的红细胞被巨噬细胞吞噬，形成含铁血黄素，经痰液排出，故痰液呈铁锈色。

21.

【正确答案】A

【答案解析】肺炎球菌对青霉素敏感，所以首选青霉素治疗。

22.

【正确答案】B

【答案解析】链霉素对细胞内的结核菌作用小，为半杀菌药；对氨基水杨酸为抑菌药；乙胺丁醇为抑菌药；阿司匹林为解热镇痛药，只有异烟肼是全杀菌药。

23.

【正确答案】B

【答案解析】肺脓肿患者因全身免疫与呼吸道防御清除功能下降，导致肺部严重感染，多有全身毒血症的表现，而出现畏寒、高热，为弛张热。

24.

【正确答案】B

【答案解析】气胸患者因空气进入胸膜腔造成胸膜腔内压力升高，肺脏被压缩影响气体交换，静脉回心血流受阻，影响心、肺功能，严重者可导致呼吸、循环衰竭，甚至死亡。故首先应排气减压，去除病因。鼻塞给氧、镇静止痛、镇咳祛痰只是对症治疗。排气减压只需胸腔穿刺即可，只有慢性气胸、反复发作的气胸及肺大疱才考虑手术治疗。

25.

【正确答案】A

【答案解析】心源性呼吸困难是心衰的常见症状，临床上左心衰竭最常见，左心衰竭以肺循环淤血及心排量降低表现为主。

26.

【正确答案】A

【答案解析】急性肾衰竭患者应该选择优质蛋白质，而不是高蛋白。

27.

【正确答案】E

【答案解析】少尿期应维持营养和供给热量，目的是减少蛋白分解代谢至最低限度，减缓尿素氮和肌酐的升高，减轻代谢性酸中毒和高血钾。

28.

【正确答案】B

【答案解析】ARDS 初期表现是呼吸困难、呼吸窘迫感，一般性给氧病情不能改善。

29.

【正确答案】E

【答案解析】题中 5 选项均可为病人建立人工呼吸，但最为简单的方法是口对口人工呼吸。

30.

【正确答案】D

【答案解析】肾上腺素是心脏复苏的首选药，能增强心传导系统的自律性和心脏收缩力，提高血压，并能使心室纤颤由细颤转为粗颤，使除颤器效果更好。

31.

【正确答案】A

【答案解析】破伤风治疗最重要的是镇静、解痉。

32.

【正确答案】D

【答案解析】乳腺纤维腺瘤是女性常见的乳房肿瘤，高发年龄是 20~25 岁。

33.

【正确答案】E

【答案解析】急性乳腺炎后期脓肿形成后，主要治疗措施是及时作脓肿切开引流。

34.

【正确答案】C

【答案解析】肠套叠多见于2岁以内的儿童，常为突然发作剧烈的阵发性腹痛，伴有呕吐和果酱样血便，腹部可扪及腊肠形、稍有压痛的腹部肿块。

35.

【正确答案】A

【答案解析】肛裂病人最主要的症状是排便时及排便后肛门部疼痛，疼痛的特点是有两次高峰。

36.

【正确答案】B

【答案解析】内痔位于齿状线以上，表面覆盖直肠黏膜。好发于直肠下端的左侧、右前或右后方（截石位3、7、11点）。主要表现为排便时无痛性出血和痔块脱出，分为4期。

37.

【正确答案】C

【答案解析】门静脉高压症病人出现大出血可导致低血容量性休克而死亡，是最凶险的并发症。

38.

【正确答案】A

【答案解析】经临床验证，肝切除术是目前治疗肝癌最有效的方法。手术不能切除的肝癌可视病情单独或联合应用肿瘤穿刺注射抗癌药物、化疗和放疗，有一定疗效；而选项B肝移植的远期疗效尚欠理想。因此答案为A。

39.

【正确答案】E

【答案解析】胆总管结石阻塞胆管并继发感染时可致典型的胆管炎症状，急腹痛、寒战高热和黄疸，称为Charcot三联征。

40.

【正确答案】A

【答案解析】腹痛是急腹症的主要症状，根据腹痛的诱因、始发部位、性质、程度、伴发症状及体格检查可确诊为不同的腹部疾病。因此选A。其他选项均非急腹症的典型症状，可排除。

41.

【正确答案】C

【答案解析】因为头痛是颅内压增高最常见的症状，呕吐也是颅内压增高的症状，而不是体征，故排除A、B。咳嗽和失明不是颅内压增高的典型表现，故排除D、E。故选C。

42.

【正确答案】C

【答案解析】颅内肿瘤因病理类型和所在部位不同，有不同的临床表现，但颅内压增高和局灶症状是其共同的表现。其中约90%以上的病人出现颅内压增高症状和体征。

43.

【正确答案】C

【答案解析】牵引的目的和作用有骨折疼痛；脱位的复位和固定；矫形治疗法；缓解肌肉痉挛，防止畸形；肢体制动，减轻预防畸形和病理性骨折。

44.

【正确答案】B

【答案解析】椎动脉型颈椎病是由椎动脉供血不足所致，常由于颈椎退行性变、颈椎横突孔增生狭窄、上关节突增生肥大、周围韧带松弛或钙化对椎动脉刺激

或压迫引起。表现为椎-基底动脉缺血症状，主要有颈性眩晕，即颈部活动时引起眩晕，尤其仰头，平衡障碍和共济失调，甚至猝倒。

45.

【正确答案】A

【答案解析】非手术治疗：多数病人经非手术治疗可以得到缓解。

46.

【正确答案】B

【答案解析】骨盆牵引、卧硬板床可减轻间盘受压，促进髓核还纳。

47.

【正确答案】C

【答案解析】骨软骨瘤好发于长管状骨的干骺端，属于骨生长方向的异常和长骨干骺端的再塑错误，它的结构包括骨组织和其上的软骨帽。

骨生长方向出现异常，但是生长出来的还是正常骨，因此会导致骨软骨瘤的形成。

48.

【正确答案】D

【答案解析】大面积烧伤后易发生神经性休克、感染性休克和低血容量性休克。注射吗啡后可减少神经性休克；发病时间短，已经应用抗生素，暂不考虑感染性休克；患者烧伤面积为60%，根据烧伤患者补液公式，该患者第1个8小时约需输入2700ml液体，目前仅补生理盐水1000ml，补液量远远不足，故选D。

49.

【正确答案】C

【答案解析】乳腺癌病理分型方法较多，目前我国常用方法分为非浸润性癌（包括乳头湿疹样癌、导管内癌、小叶原位癌等），属早期，预后较好，故B、

D、E 不对；早期浸润性癌；浸润性特殊癌（包括腺样囊性癌等），此型癌细胞一般分化程度高，预后尚好，故 A 不对；浸润性非特殊癌，一般分化低，预后差，而炎性乳腺癌属于此类，其转移概率高，是乳腺癌中预后最差的病理类型。

50.

【正确答案】B

【答案解析】妊娠合并急性病毒性肝炎原则上不宜妊娠，孕早期确诊者应及时终止妊娠。

51.

【正确答案】A

【答案解析】不协调性子宫收缩乏力治疗原则是恢复子宫收缩的生理极性和对称性，给予适当的镇静药，使产妇充分休息后恢复为协调性子宫收缩。

52.

【正确答案】D

【答案解析】协调性子宫收缩乏力胎儿可经阴道分娩者，采取加强宫缩的措施，促进产程进展。缩宫素静脉滴注，5%葡萄糖 500ml 中加入缩宫素 2.5U 摇匀，开始滴速为 8 滴/分，以后根据宫缩调整滴速，一般每分钟不超过 40 滴，使宫缩间隔 2~3 分钟，持续 40~50 秒，个别不敏感者可酌情增加缩宫素浓度。

53.

【正确答案】A

【答案解析】骨盆的入口平面狭窄表现为胎头衔接受阻，不能入盆。

54.

【正确答案】A

【答案解析】妊娠 30 周以后胎位仍不正常者，则根据不同情况给予矫正。常用的矫正方法有胸膝卧位、激光照射或艾灸至阴穴和外转胎位术。最常用的为胸膝卧位。

55.

【正确答案】C

【答案解析】地塞米松可以促进胎肺成熟，预防早产儿呼吸窘迫综合征的发生。

56.

【正确答案】B

【答案解析】一旦出现羊水栓塞的临床表现，应立即给予紧急处理，首先是纠正缺氧，解除肺动脉高压，防止心衰，抗过敏，抗休克。

57.

【正确答案】D

【答案解析】未婚妇女一般仅限于直肠-腹部诊，禁作双合诊和阴道窥器检查。

58.

【正确答案】A

【答案解析】白带呈泡沫状提示是滴虫性阴道炎。

滴虫性阴道炎全身治疗：口服甲硝唑 400mg，每日两次，连服 7 天或初次治疗选用甲硝唑 2g，单次口服。

59.

【正确答案】E

【答案解析】非特异性外阴炎的症状是外阴皮肤黏膜瘙痒、疼痛、灼热，性交及排尿排便时加重。体征有局部充血、肿胀、糜烂，有抓痕，局部红肿、湿疹，偶见溃疡，皮肤黏膜粗糙增厚、皸裂或呈棕色改变。故前四个选项是正确的，E 不属于非特异性外阴炎的临床表现，故选 E。

60.

【正确答案】B

【答案解析】肺孢子菌肺炎最为常见，是艾滋病机会性感染死亡的主要原因。念珠菌、疱疹和巨细胞病毒、结核杆菌、卡波西肉瘤均可侵犯肺部。

61.

【正确答案】E

【答案解析】不孕、月经不调、下腹隐痛、异位妊娠均是慢性盆腔炎的临床表现。

62.

【正确答案】D

【答案解析】外阴尖锐湿疣的治疗以局部用药为主，常用药物为三氯醋酸、5% 氟尿嘧啶等，也可用冷冻治疗，激光治疗，大的尖锐湿疣可行手术切除。

63.

【正确答案】B

【答案解析】妊娠期尖锐湿疣可坚持局部治疗或手术，若病灶位于外阴、阴道、子宫颈，阴道分娩易造成软产道裂伤、出血，因此应行剖宫产术结束分娩。

64.

【正确答案】B

【答案解析】急性淋病治疗首选药物以第三代头孢菌素为主，夫妻同时治疗，因此正确选项为B。

65.

【正确答案】C

【答案解析】解析：母乳中含丰富的免疫因子，有效抵抗病原微生物的侵袭，增强婴儿免疫力，尤以母初乳 sIgA 为高。

66.

【正确答案】A

【答案解析】新生儿硬肿症最主要最关键的治疗原则是逐步复温。

67.

【正确答案】A

【答案解析】颅内出血的症状、体征与出血部位及出血量有关，一般生后 1~2 日内出现。

68.

【正确答案】D

【答案解析】激期除有初期症状外，主要表现为骨骼改变和运动功能以及智力发育迟缓。

69.

【正确答案】B

【答案解析】咽-结合膜热：病原体为腺病毒（3、7 型），好发于春夏季，可在集体小儿机构中流行。临床以发热、咽炎、结合膜炎为特征，主要表现为高热、咽痛、眼部刺痛、畏光、流泪等。

70.

【正确答案】E

【答案解析】法洛四联症患者活动后，常主动蹲踞片刻，蹲踞时下肢屈曲，使静脉回心血量减少，减轻心脏负荷，同时下肢动脉受压，循环阻力增大，使右向左分流减少，使缺氧症状暂时得到缓解。

71.

【正确答案】A

【答案解析】急性肾小球肾炎最常见的病因是A组β溶血性链球菌引起的急性上呼吸道感染或皮肤感染后的一种免疫复合物性肾小球肾炎。呼吸道感染至肾炎发病约1~2周，而皮肤感染则稍长，约2~3周。

72.

【正确答案】B

【答案解析】化脓性脑膜炎除早期、联合、坚持用药、对症处理、治疗并发症及支持疗法外，主要采取抗生素进行病原学治疗。

73.

【正确答案】E

【答案解析】结核性脑膜炎晚期（昏迷期）：约1~3周，上述症状逐渐加重，由意识朦胧、半昏迷进入完全昏迷。频繁惊厥甚至可呈强直状态。患儿极度消瘦，明显出现水、盐代谢紊乱。最终死于脑疝。性情改变、精神呆滞、喜哭、易怒、睡眠不安、双目凝视等，同时有低热、呕吐、便秘为早期表现。脑膜刺激征（颈强直，凯尔尼格征、布鲁津斯基征）阳性为中期表现。

二、A2型题

74.

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是心室纤颤的治疗。心室纤颤属于最严重的心律失常，治疗应立即做非同步直流电除颤。

75.

【正确答案】C

【答案解析】该患者有发热、乏力、食欲下降，同时有黄疸、肝大，辅助检查提示转氨酶及总胆红素增高，应首先考虑病毒性肝炎的可能性，为进一步明确诊断，应做肝炎病毒标志物的检查。

76.

【正确答案】D

【答案解析】左心衰以肺循环淤血和心排量降低表现为主，加快输液速度可加重心脏负荷，诱发急性肺水肿。

77.

【正确答案】A

【答案解析】患者有气胸的潜在病因：有慢性支气管炎、肺气肿病史多年。COPD 晚期的一个典型病理改变就是肺大疱形成。咳嗽时胸膜腔压力增大，易造成肺大疱破裂。患者有气胸的典型临床表现：出现呼吸困难、胸痛。

78.

【正确答案】C

【答案解析】腹部被撞击后出现了休克征象，同时伴有腹膜刺激征提示有肝脾破裂。

79.

【正确答案】A

【答案解析】早期发现，早期诊断和早期治疗是提高胃癌疗效的关键。手术是首选的方法，辅以化疗、放疗及免疫治疗等以提高疗效。

80.

【正确答案】B

【答案解析】子宫内膜癌好发于老年妇女，病变位于子宫内膜，绝经后出血是其典型表现。

81.

【正确答案】D

【答案解析】子宫内膜癌具有生长慢，转移晚的特点。晚期癌肿浸润周围组织，压迫神经引起下腹部和腰骶部疼痛，并向下肢及足部放射。癌肿堵塞宫颈管引起宫腔积脓时，可出现下腹部胀痛和痉挛性疼痛。

82.

【正确答案】D

【答案解析】该女士短时间停经后，阴道流血持续 20 天，时多时少，是功能失调性子宫出血的病人。根据妇科检查，颈管内有透明分泌物，作涂片见羊齿植物叶状结晶的结果是雌激素作用的特点，提示病人属于无排卵性功血。

83.

【正确答案】D

【答案解析】刮宫可以止血，同时可以进行疾病诊断。

84.

【正确答案】A

【答案解析】白色稠厚豆渣样白带是外阴阴道假丝酵母菌病的典型症状，另外此病人有“糖尿病”病史，也是外阴阴道假丝酵母菌病的好发人群，因此正确选项为 A。

85.

【正确答案】E

【答案解析】阴道毛滴虫全身治疗：口服甲硝唑 400mg，每日两次，连服 7 天或初次治疗选用甲硝唑 2g，单次口服。

86.

【正确答案】B

【答案解析】急性坏死性小肠结肠炎患儿有休克者应按感染性休克进行治疗。

87.

【正确答案】A

【答案解析】轮状病毒感染引起的肠炎多发生在秋冬季节，常见于6个月至2岁。表现为起病急，常伴发热和上呼吸道症状，病程多为3~8天。

88.

【正确答案】D

【答案解析】休克患儿尿少，故选项D不符合。

三、A3/A4型题

89. 诊断首先考虑

- A. 脑出血
- B. 结核性脑膜炎
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑梗死
- E. 偏头痛发作

【正确答案】C

【答案解析】因患者有颈抵抗及Kernig征(+)，此为蛛网膜下腔出血所特有的表现，因此患者可考虑为蛛网膜下腔出血。

90. 该患者最可靠的诊断依据是

- A. 剧烈头痛、呕吐
- B. 偏瘫
- C. Kernig征
- D. 腰椎穿刺为均匀一致血性脑脊液

E. 头颅 MRI

【正确答案】 D

【答案解析】 蛛网膜下腔出血可靠的诊断依据为：腰椎穿刺为均匀一致血性脑脊液。

91. 确定护理诊断时应除外

- A. 疼痛：头痛
- B. 焦虑、恐惧
- C. 潜在并发症：再出血
- D. 体液过多
- E. 知识缺乏

【正确答案】 D

【答案解析】 蛛网膜下腔出血的护理诊断有：①疼痛：头痛；②焦虑：恐惧；③潜在并发症：再出血；④知识缺乏。

92. 患者致命的并发症为

- A. 脑积水
- B. 脑血管痉挛
- C. 再出血
- D. 神经源性心脏
- E. 脑疝

【正确答案】 C

【答案解析】 再次出血是蛛网膜下腔出血致死并发症，原因主要是动脉瘤破裂，多发生在 1 个月内，第 2 周最多见。多在病情稳定时，突然再次出现剧烈头痛、呕吐、抽搐发作、昏迷，甚至去大脑僵直及神经定位体征，颈强直及 Kernig 征阳性。脑脊液复查再次呈鲜红色。

93. 首先考虑的诊断是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肥厚型梗阻性心肌病

【正确答案】C

【答案解析】心界向左下扩大，主动脉瓣区可闻叹息样早、中期或全舒张期杂音，是主动脉瓣关闭不全的体征。

94. 对诊断最有价值的检查方法是

- A. 胸部 X 线摄片
- B. 超声心动图
- C. 冠状动脉造影
- D. 心电图
- E. 心脏核素检查

【正确答案】B

【答案解析】主动脉瓣关闭不全确诊首选超声心动图。

95. 根据患者的临床表现，有可能诊断为

- A. 异位妊娠
- B. 先兆流产
- C. 子宫肌瘤
- D. 葡萄胎
- E. 输卵管炎症

【正确答案】A

【答案解析】患者有停经后出现阴道出血且腹痛，右侧附件增厚，考虑异位妊娠可能性大。

96. 首选简易的辅助方法是

- A. 诊断性刮宫
- B. 阴道镜检查
- C. 盆腔 B 超检查
- D. 宫腔镜检查
- E. 腹腔镜检查

【正确答案】 C

【答案解析】 B 超有助于诊断异位妊娠。

97. 该患儿最可能的诊断是

- A. 高热惊厥
- B. 低钙惊厥
- C. 中毒性脑病
- D. 癫痫
- E. 化脓性脑膜炎

【正确答案】 A

【答案解析】 热性惊厥多由上感引起，典型热性惊厥的特点。主要发生在 6 个月至 5 岁小儿，男孩多于女孩；大多发生于急骤高热开始后 12 小时之内。

98. 对该患儿首要的处理措施是

- A. 针刺人中、百会等穴位以控制惊厥
- B. 寻找病因
- C. 应用抗惊厥药物
- D. 按医嘱给予抗生素治疗
- E. 向家长讲解惊厥的预防及急救

【正确答案】 C

【答案解析】控制惊厥：①应用抗惊厥药物，首选地西洋（安定）静脉注射，1~2分钟内生效，但作用短暂，必要时30分钟后重复一次；静脉注射有困难时可保留灌肠，比肌肉注射见效快，5~10分钟内可见效。另外其他止惊药还有苯妥英钠、苯巴比妥、10%水合氯醛等。②针刺法，上述药物暂时缺如时可针刺人中、百会、涌泉、十宣、合谷、内关等穴，应在2~3分钟内见效。

99. 惊厥的护理措施中正确的是

- A. 立即送抢救室
- B. 首先给予脱水处理
- C. 大声喊叫唤醒患儿
- D. 勿牵拉、按压肢体
- E. 吸入纯氧

【正确答案】D

【答案解析】惊厥发生时勿强行牵拉或按压肢体防止发生骨折、关节脱位。

100. 患儿出院时进行健康指导的重点是

- A. 体格锻炼的方法
- B. 完成计划免疫
- C. 讲解惊厥的预防及急救措施
- D. 半年后做脑电图检查
- E. 做健康体检

【正确答案】C

【答案解析】高热惊厥的患儿日后发热仍有可能出现惊厥，应告知家长物理降温的重要性及方法，讲解惊厥发作时的急救方法。