

口腔主治医师 —— 基础测评 50 题

医学教育网 著



扫码回复“基础测评”领取答案及解析

《基础测评 50 题》

1.有关天疱疮细胞的描述，不正确的是

- A.为松解的棘细胞
- B.可单个或数个排列成团
- C.细胞水肿变性呈圆形，胞核圆大而肿胀，核周有窄晕
- D.细胞胞浆透明，细胞膜深染有折叠
- E.用姬姆萨或苏木精伊红染色，可观察到天疱疮细胞

2.下颌第一恒磨牙的解剖特点是

- A.（牙合）面呈斜方形
- B.颊尖比舌尖长
- C.颊侧缘短于舌缘
- D.有五条发育沟
- E.近中颊尖最小

3.以下属于被覆黏膜结构特点的是

- A.上皮有角化

- B.棘层细胞间桥明显
- C.固有层乳头多而长
- D.与深部组织附着牢固
- E.有较疏松的黏膜下层

4.面突联合异常发生于胚胎

- A.第 1 周和第 2 周
- B.第 3 周和第 4 周
- C.第 6 周和第 7 周
- D.第 8 周和第 9 周
- E.第 10 周和第 11 周

5.内衬上皮类似于缩余釉上皮、由 2~5 层扁平细胞或立方细胞构成的囊肿为

- A.牙源性角化囊肿
- B.鼻唇囊肿
- C.含牙囊肿
- D.黏液囊肿
- E.牙源性钙化囊肿

6.临床在行颞下颌关节手术时,需注意保护邻近下颌髁状突颈部后内方的动脉是

- A.舌动脉
- B.颈内动脉
- C.颌内动脉
- D.颌外动脉
- E.甲状腺上动脉

7.恒牙萌出顺序为

- A.中切牙→侧切牙→尖牙→第一前磨牙→第二前磨牙→第一磨牙→第二磨牙→第三磨牙
- B.第一磨牙→侧切牙→中切牙→尖牙→第一前磨牙→第二前磨牙→第二磨牙→第三磨牙
- C.第一磨牙→中切牙→侧切牙→第一前磨牙→第二前磨牙→尖牙→第二磨牙→第三磨牙
- D.第一磨牙→中切牙→侧切牙→第二前磨牙→尖牙→第一磨牙→第二前磨牙→第三磨牙

E.第一磨牙→中切牙→侧切牙→第一前磨牙→第二前磨牙→尖牙→第三磨牙→
第二磨牙

8.上颌第一磨牙的斜嵴是由

A.近中颊尖三角嵴和远中舌尖三角嵴相连形成

B.近中舌尖三角嵴和远中颊尖三角嵴相连形成

C.近、远中舌尖三角嵴相连形成

D.近、远中颊尖三角嵴相连形成

E.近中舌尖和近中颊尖三角嵴相连形成

9.下列细菌中不引起特异性感染的是

A.破伤风杆菌

B.结核菌

C.梅毒螺旋体

D.放线菌

E.大肠埃希菌

10.在金瓷匹配的影响因素中占主要地位的是



- A.金属烤瓷烧结温度
- B.两者的热膨胀系数
- C.金属熔点
- D.两者结合界面的润湿状态
- E.金属表面的粗化程度

11.下面的印模材料不属于弹性印模材料的是

- A.琼脂
- B.藻酸盐
- C.印模膏
- D.硅橡胶
- E.聚醚橡胶

12.治疗牙周病的常用含漱剂是

- A.0.12%~0.2%氯己定溶液
- B.3%双氧水溶液
- C.2%~3%碳酸氢钠溶液
- D.25%次氯酸钠溶液



E.2%氯胺 T 溶液

13.被认为是重要的致龋菌的为

A.变形链球菌

B.血链球菌

C.消化链球菌

D.乳杆菌属

E.放线菌属

14.前牙的工作长度具体指

A.牙齿长度

B.根管长度

C.开髓口到根尖端的长度

D.切端到根尖狭窄部的长度

E.X 线片上牙齿长度

15.牙齿发育异常不包括

A.结构异常



- B.牙列异常
- C.形态异常
- D.数目异常
- E.萌出异常

16.多见于儿童或青年人，病变进展较快，病变组织颜色较浅，呈浅棕色，质地较软且湿润，很容易用挖匙挖除的龋坏称为

- A.平滑面龋
- B.窝沟龋
- C.邻面龋
- D.慢性龋
- E.急性龋

17.牙髓钙化与三叉神经痛鉴别要点是

- A.疼痛的部位
- B.有无扳机点
- C.疼痛的性质
- D.发病的原因



E.病程的长短

18.白血病的牙龈病损的原因

A.末梢血中的幼稚血细胞在牙龈组织内大量浸润积聚

B.牙龈结缔组织本身的增生

C.牙龈结缔组织部分的红细胞大量浸润积聚

D.牙菌斑大量堆积

E.口内自洁作用差

19.下列不属于截根术适应证的说法的是

A.多根牙的某一个或两个根（上颌磨牙）有Ⅲ度或Ⅳ度根分叉病变，其余牙根较轻，牙齿松动不明显

B.磨牙的一个根发生纵裂或横折，而其他根完好

C.下颌磨牙根分叉区Ⅲ度或Ⅳ度病变，局部的深牙周袋不能消除者

D.磨牙的一个根有严重的根尖病变，器械折断不能取出，影响根尖病变的治愈

E.牙周-牙髓联合病变，有一根明显受累，患牙可以进行彻底的根管治疗

20.通过牙周夹板将松动的患牙连接，并固定在健康稳固的邻牙上，从而利于松

动牙的牙周修复和功能行使的方法称为

- A.联合夹板固定术
- B.松牙结合术
- C.松牙联合术
- D.牙周固定术
- E.松牙固定术

21.根尖诱导成形术成功标准，除外的是

- A.根尖继续发育，管腔缩窄，根尖封闭
- B.根管腔无变化，根尖封闭
- C.根管内有微量有颜色液体排出
- D.未见发育，根管内探测有硬组织屏障形成
- E.根端 1/3 处形成钙化屏障

22.下列不需要做间隙保持器的情况是

- A.第一恒磨牙早失
- B.恒前牙早失
- C.乳尖牙早失

D.乳磨牙早失

E.乳牙接近脱落拔除时

23.乳牙迟萌的时间限度为

A.婴儿出生后 1 年，萌出全部乳牙

B.超过 6 个月后仍未见第一颗乳牙萌出

C.超过 1 周岁后所有乳牙尚未全部萌出

D.超过 2 周岁后所有乳牙尚未全部萌出

E.超过 1 周岁后仍未见第一颗乳牙

24.多形渗出性红斑属于

A.感染性疾病

B.传染性疾病

C.变态反应性疾病

D.遗传性疾病

E.自身免疫性疾病

25.慢性盘状红斑狼疮在口腔黏膜的好发部位是

A.颊部黏膜

B.舌背黏膜

C.下唇唇红

D.上唇唇红

E.上腭黏膜

26.在随机抽样时，样本人群由于主观或客观原因未能接受检查出现的偏倚称为

A.无应答偏倚

B.标准误差

C.选择性偏倚

D.决定性偏倚

E.测量误差

27.下列不是口腔癌警告标志的是

A.2周以上尚未愈合的口腔溃疡

B.口腔黏膜有白色、红色和发暗的斑

C.口腔与颈部有不正常的肿胀和淋巴结肿大

D.口腔反复出血，出血原因不明

E.第三磨牙周围反反复复的炎症

28.口腔不良习惯不包括

A.吮指习惯

B.舌习惯

C.唇习惯

D.咬物习惯

E.异常吞咽习惯

29.矫治过程中,轻度力是指

A.强度在 350 ~ 500g 之间

B.强度在 60 ~ 350g 之间

C.强度小于 60g

D.强度在 500 ~ 1000g 之间

E.强度大于 1000g,但小于 1500g

30.临床判断休克重要的指征是

A.血压

B.脉搏

C.皮肤色泽与温度

D.休克早期心率

E.尿量

31.属于颌骨骨折时最重要诊断标准的是

A.外伤史

B.牙脱位或牙折

C.牙龈及颌面部的伤口

D.功能障碍

E.咬合关系错乱

32.昏迷的外伤病员运送时最佳体位为

A.侧卧位

B.仰卧位

C.随时变动

D.俯卧位

E.头高仰卧位



33.原位癌是指

- A.癌初起局限于黏膜内或表层中
- B.癌变局限于原发灶，无颈淋巴转移
- C.癌变局限于原发灶，无血行播散致远处转移
- D.原发灶仅累及一个解剖区域，未累及邻近其它解剖区域
- E.癌变局于粘膜及粘膜下层，未侵及深部的肌肉或骨组织

34.全口义齿固位主要是靠

- A.附着力
- B.黏着力
- C.凝聚力
- D.舌及颊肌压力
- E.吸附力

35.舌隆突支托凹位于尖牙舌隆突上，位于

- A.颊面颈 1/3 和中 1/3 交界处
- B.舌面颈 1/3 和中 1/3 交界处

- C.颊面颈 2/3 和中 1/3 交界处
- D.舌面颈 2/3 和中 1/3 交界处
- E.舌面颈 1/3 和颊面 1/3 交界处

36.氟牙症与釉质发育不全的区别主要为

- A.病因不同
- B.表现不同
- C.牙位不同
- D.牙面不同
- E.部位不同

37.畸形中央尖折断引起牙髓或根尖周病变时，为保存患牙并促使牙根发育，可采用

- A.牙髓塑化治疗
- B.干髓术
- C.牙髓切断术
- D.根尖诱导成形术
- E.盖髓术

38.下列哪项不是酸蚀症的致病因素

- A.饮食酸性饮料
- B.酸性药物
- C.胃酸
- D.树脂修复前的酸蚀凝胶
- E.职业相关酸性物质

39.临床牙冠变短，咬合面或者切缘低于正常牙的牙脱位类型为

- A.脱出性脱位
- B.嵌入性脱位
- C.侧向性脱位
- D.牙齿完全脱位
- E.牙根外吸收

40.发生在经牙髓治疗后的患牙，由于残留了少量炎症根髓，进而又出现慢性牙髓炎的症状，故称为

- A.逆行性牙髓炎

- B.牙髓坏死
- C.急性牙髓炎
- D.慢性牙髓炎
- E.残髓炎

41.下列哪项不是急性根尖周炎浆液期的临床症状

- A.患牙浮出感
- B.咬紧牙时疼痛缓解
- C.可有自发痛
- D.叩诊痛
- E.温度测验敏感

42.急性龈乳头炎的疼痛性质表现不包括

- A.自发胀痛
- B.明显的自发痛
- C.中度的冷、热刺激痛
- D.探触痛
- E.重度叩痛

43. 青春期龈炎的常见病因不包括

- A. 口呼吸
- B. 戴矫治器
- C. 乳恒牙的更替
- D. 牙齿排列不齐
- E. 大量牙石堆积

44. 关于 Bednar 溃疡发病位置描述正确的是

- A. 上颌软硬腭交汇处
- B. 双侧上腭翼钩处
- C. 膜舌腹、舌尖、舌侧缘
- D. 舌侧缘、舌系带、舌根
- E. 上下颌牙槽嵴顶及对应口腔前庭区

45. 咬肌间隙感染肿胀区域主要是

- A. 眶下区弥漫性水肿
- B. 下颌支及下颌角为中心红肿

C.张口受限

D.颌下三角区的红肿

E.颌下、口底广泛水肿

46.下列有关牙源性角化囊性瘤易复发的原因，不正确的是

A.囊壁薄

B.可能存在多发病灶

C.同一病灶内有多个囊腔

D.可能存子囊

E.囊肿内有角化物

47.眶下神经阻滞麻醉口内注射法进针点是

A.上颌中切牙根尖相应部位的口腔前庭沟顶刺入

B.上颌侧切牙根尖相应部位的口腔前庭沟顶刺入

C.上颌尖牙根尖相应部位的口腔前庭沟顶刺入

D.上颌第一前磨牙根尖相应部位的口腔前庭沟顶刺入

E.上颌第二前磨牙根尖相应部位的口腔前庭沟顶刺入

48.与全口义齿后缘有关的解剖标志不包括

A.腭小凹

B.颤动线

C.腭乳头

D.磨牙后垫

E.翼上颌切迹

49.固定桥基牙冠根比的最低限度是

A.1: 1

B.1: 2

C.2: 1

D.2: 3

E.3: 2

50.下列说法中哪项描述符合嵌体的禁忌证

A.邻接不良

B.食物嵌塞严重

C.已涉及边缘嵴以及面

D.较大体积的健康牙体组织



E.前牙邻、唇面缺损未涉及切角者

扫码回复“基础测评”领取答案及解析

