

仿真
密卷

✓ 学霸同款

✓ 精华提炼

✓ 实战练习

卫生专业技术资格考试

全科医学（中医类）（中级）

医学教育网命题组 编

绝密·内部

依据考纲
精心研发

考前爆料
命题规律

精选考题
仿真练习



《基础知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1.六淫中属阳的是的

- A.风邪、暑邪、火邪
- B.风邪、暑邪、寒邪
- C.湿邪、暑邪、火邪
- D.湿邪、暑邪、寒邪
- E.湿邪、寒邪、火邪

2.对阴阳偏胜采用的治疗原则是

- A.泻其有余
- B.补其不足
- C.寒者热之
- D.热者寒之
- E.调整阴阳

3.肺吸入自然界的清气，主要依靠的是

- A.肺气宣发
- B.肺气肃降
- C.肺主行水
- D.肺主治节
- E.肺朝百脉



4.下列各项，具有“泌别清浊”功能的是

- A.三焦
- B.大肠
- C.小肠
- D.膀胱
- E.心包

5.下列各项，具有“慳疾滑利”特点的气是

- A.卫气
- B.营气
- C.元气
- D.宗气
- E.清气

6.疾病发生的内在因素

- A.邪气亢盛
- B.正气旺盛
- C.正气不足
- D.邪气损正
- E.正气抗邪

7.气的升发太过或下降不及，称之为

- A.气闭
- B.气滞
- C.气逆



D.气陷

E.气脱

8.久病患者，纳少乏力，自觉腹痛腹胀，但时有减缓，喜揉喜按，舌质淡嫩而苔润，脉细弱。

分析其病机可能是

A.真实假虚

B.实中夹虚

C.真虚假实

D.虚实错杂

E.虚中夹实

9.下列关于实证的表现，错误的一项是

A.脉实有力

B.腹痛拒按

C.壮热狂躁

D.二便失禁

E.声高气粗

10.在临床上，寒病见到寒象，应选用的治则治法是

A.急则治标

B.缓则治本

C.寒因寒用

D.逆治

E.从治

11.五行之中，木是水之



- A.母
- B.子
- C.所胜
- D.所不胜
- E.相克

12.关于三焦的生理特点叙述不正确的是

- A.上焦如雾
- B.中焦如沕
- C.下焦如渌
- D.中焦即脾胃
- E.下焦可化生气血

13.具有司呼吸、行气血作用的气是

- A.元气
- B.宗气
- C.营气
- D.卫气
- E.脏腑之气

14.脏腑经脉表里关系对应错误的是

- A.足太阴经与足阳明经
- B.手少阴经与手太阳经
- C.足厥阴经与足少阳经
- D.足少阴经与足太阳经



E.手太阴经与手太阳经

15.暑邪、火邪、燥邪的共同的致病特点是

A.纳少

B.发热

C.伤津

D.生风

E.动血

16.疠气和六淫最主要的鉴别要点是

A.多与季节气候有关

B.多与地理环境有关

C.体外入侵

D.具有强烈传染性

E.多从皮毛口鼻而入

17.下列哪项不是全科医疗的特征

A.综合性服务

B.可及性服务

C.以疾病为中心

D.连续性服务

E.以家庭为单位

18.全科医学是一门

A.保健学科

B.预防医学学科



C.综合性学科

D.综合性医学专业学科

E.综合性预防医学学科

19.下列哪项不是常用的评估类型

A.客观评估

B.工具评估

C.分析评估

D.综合评估

E.主观评估

20.二级预防的内容不包括

A.早期发现

B.早期诊断

C.早期治疗

D.康复治疗

E.筛检和自我检查

21.下列不属于医患沟通途径的是

A.情感沟通

B.随访沟通

C.操作沟通

D.效果沟通

E.诊疗沟通

22.在疾病三级预防中，第一级预防的重点是



- A.避免接触致病因素, 提高机体抗病能力
- B.寻找病因, 及早诊断
- C.早期发现和诊断敏感个体
- D.对患者及早诊疗, 促进康复
- E.针对病因不明难以觉察预料的疾病

23.社区卫生提供的全方位服务不包括

- A.可及性服务
- B.协调性服务
- C.综合性服务
- D.间断性服务
- E.人格化服务

24.曾引起公害病的环境因子主要是

- A.氟化物
- B.甲基汞
- C.甲醛
- D.砷化物
- E.非电离辐射

25.以下健康教育评价形式说法错误的是

- A.形成评价
- B.过程评价
- C.效果评价
- D.结局评价



E.综合评价

26.旨在限制或逆转由损伤造成的伤残属于

A.一级预防

B.二级预防

C.三级预防

D.四级预防

E.综合预防

27.结合我国社区卫生服务的特点和需要,社区健康管理具体模式不包括

A.一般人群管理

B.高危人群管理

C.目标人群的管理

D.现患人群的管理

E.残疾人和精神疾病患者的管理

28.衡量某病和暴露因素间联系强度的最佳指标是

A.暴露者的发病率

B.暴露者的死亡率

C.暴露者的致残率

D.相对危险度

E.特异危险度

29.某一固定人群在一定时期内某病新发生例数与时期开始总人数之比为

A.比值比

B.归因危险度



C.相对危险度

D.发病密度

E.累积发病率

30.产于山东的道地药材是

A.党参

B.地黄

C.阿胶

D.乌头

E.陈皮

31.下列关于“十八反”的配伍不正确的是

A.乌头配贝母

B.甘草配甘遂

C.藜芦配人参

D.丹参配乌头

E.甘草配芫花

32.外感风寒挟湿之头痛、头重、身重应首选哪味药物治疗

A.香薷

B.桂枝

C.麻黄

D.羌活

E.生姜

33.梔子具有的功效是



- A.清热除烦，泻火解毒，利尿
- B.泻火除烦，清热利湿，凉血解毒
- C.泻火解毒，利尿
- D.清热燥湿，泻火解毒，止血
- E.清热解毒，除烦止渴，消肿止痛

34.既能泻下攻积，又能清热消肿的药物是

- A.大黄
- B.芒硝
- C.番泻叶
- D.芫花
- E.知母

35.关于蕲蛇的主治病证，下列叙述错误的是

- A.风湿顽痹疼痛
- B.中风半身不遂
- C.破伤风
- D.跌打损伤瘀痛
- E.皮肤顽癣

36.既能化湿，又能解暑的药物是

- A.藿香、佩兰
- B.苍术、厚朴
- C.砂仁、豆蔻
- D.橘皮、青皮



E.茯苓、玉竹

37.既能利水消肿，渗湿健脾，除痹，又能清热排脓的药物是

A.薏苡仁

B.车前子

C.木通

D.茯苓

E.滑石

38.既能温中散寒，又能回阳通脉的药物是

A.生姜

B.干姜

C.高良姜

D.炮姜

E.煨姜

39.枳实的理气作用是

A.破气

B.降气

C.纳气

D.疏肝

E.行气

40.鸡内金入药最宜

A.先煎

B.研末服



正保医学教育网

www.med66.com



C.后下

D.包煎

E.另煎

41.以下哪组药均可用于治疗水火烫伤

A.地榆、槐角、小蓟

B.地榆、大黄、虎杖

C.大黄、芒硝、丹参

D.黄芩、黄连、黄柏

E.紫草、地榆、郁金

42.功效燥湿化痰，祛风解痉，散结消肿的药物是

A.天南星

B.蝉衣

C.胆南星

D.防风

E.蕲蛇

43.重镇降逆的要药是

A.牡蛎

B.代赭石

C.半夏

D.珍珠

E.钩藤

44.具有健脾补中，升阳举陷，益卫固表，利尿，托毒生肌功效的药物是



- A.人参
- B.西洋参
- C.党参
- D.太子参
- E.黄芪

45.主治肾虚阳痿及虚寒便秘的药物是

- A.巴戟天
- B.硫黄
- C.雄黄
- D.蛇床子
- E.马钱子

46.下列各项中属于“反佐”范畴的是

- A.寒药热服
- B.热因热用
- C.以泻代清
- D.火郁发之
- E.壮水制火

47.小青龙汤方药配伍意义的分析，其中不恰当的是

- A.干姜温肺化饮
- B.细辛散寒止痛
- C.五味子敛肺气
- D.半夏燥湿化痰



E.芍药和营养血

48.桂枝汤的功用是

A.发汗解表，透营达卫

B.发汗祛湿，调和营卫

C.发表散寒，调畅营卫

D.散寒解表，调和营卫

E.解肌发表，调和营卫

49.四逆散所主证候的病因病机是

A.实邪闭阻，抑遏阳气

B.气机不畅，阳气内郁

C.血虚受寒，寒客经脉

D.少阴阳虚，阴寒上逆

E.肾阳衰微，阴寒内盛

50.清营汤用的参类药物是

A.玄参、丹参

B.人参、元参

C.党参、丹参

D.人参、丹参

E.玄参、党参

51.青蒿鳖甲汤的功用是

A.凉血止痢

B.滋阴泻火



C.滋阴养血

D.养阴透热

E.泄热除烦

52.清暑益气汤中臣药为

A.荷梗、洋参、麦冬

B.荷梗、石斛、麦冬

C.洋参、石斛、麦冬

D.麦冬、石斛、知母

E.荷梗、竹叶、知母

53.当归补血汤重用黄芪为君，意在

A.补气生血

B.补气固表

C.补气托毒

D.补气行血

E.补气行水

54.下列关于固涩剂，说法错误的是

A.固涩剂适用于气、血、精、津液耗散滑脱之证

B.固涩剂可用于遗精滑泄、小便失禁，以及崩漏带下

C.元气大虚，亡阳欲脱所致的崩中不止者，宜兼顾重用回阳固脱之品

D.固涩剂多适宜于正虚无邪者

E.凡外邪未去，里实尚存者，均应慎用

55.天王补心丹中配伍茯苓意在



A.宁心

B.健脾

C.消痰

D.渗湿

E.利水

56.苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是

A.温阳散寒

B.温肾纳气

C.温通经脉

D.鼓舞气血

E.散寒止痛

57.补阳还五汤黄芪的配伍意义是

A.补气行血

B.补气生血

C.补气利水

D.补气固表

E.补气升阳

58.大秦艽汤的功用是

A.疏风养血，清热除湿

B.祛风胜湿，益气养血

C.祛风化痰，通络止痉

D.疏风清热，养血活血



E.祛风除湿，活血止痛

59.以清宣温燥，润肺止咳为主要功用的方剂是

A.杏苏散

B.增液汤

C.桑杏汤

D.养阴清肺汤

E.清燥救肺汤

60.二陈汤的功用是

A.燥湿化痰，理气和中

B.理气化痰，清胆和胃

C.清热化痰，理气止咳

D.清热化痰，宽胸散结

E.燥湿行气，软坚化痰

61.保和丸中配伍莱菔子的主要用意是

A.消食止泻

B.消食导滞

C.下气消食

D.化滞解酒

E.消积和胃

62.下列各项中，除哪项外均是健脾丸的组成药物

A.白术、木香

B.黄连、甘草



C.神曲、陈皮

D.半夏、黄芪

E.人参、茯苓

二、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.补母

B.泻子

C.抑强

D.扶弱

E.补子

(1) 根据相生关系来确立治疗原则，肝虚补肾属于

(2) 根据相克关系来确立治疗原则，肝木太过而乘脾土，针对肝木太过宜选用

2.A.宗气

B.谷气

C.卫气

D.清气

E.元气

(1) 脾肺共同化生之气是

(2) 先天之精所化生之气是

3.A.皮



B.毛

C.肉

D.筋

E.爪

(1) 肝在体合

(2) 肺在体合

4.A.风邪

B.寒邪

C.暑邪

D.湿邪

E.热邪

(1) 具有病位游移、行无定处的特性的外邪为

(2) 致病缠绵难愈的外邪为

5.A.血液不足，功能减退

B.气血失和，经脉失容

C.血随气逆，咳血呕血

D.血行迟缓，瘀阻停滞

E.血分有热，血行加速

(1) 血虚是指

(2) 血瘀是指

6.A.中医诊疗与治疗注重辨证论治和整体观

B.中医养生保健



C.中医康复

D.中医健康教育

E.中医预防和行为干预

(1) 宣传中医药养生保健、防病治病知识属于

(2) 中医学中独特的保健方法是

7.A.形成评价

B.过程评价

C.效果评价

D.中期效果评价

E.结局评价

(1) 信息覆盖率、居民培训率指标属于

(2) 居民和重点人群慢性病防治知识的知晓率指标属于

8.A.苦味

B.酸味

C.辛味

D.甘味

E.咸味

(1) 五味之中，具有泻火坚阴作用的味是

(2) 具有软坚散结作用的药物应具有何种药味

9.A.1/4

B.1/2

C.1/3



D.2/5

E.2/3

(1) 一般 5 岁以下的小儿用成人药量的

(2) 5 岁以上的儿童按成人剂量的

10.A.绦虫病、蛔虫病、便秘、水肿

B.蛲虫病、钩虫病、疥癣、湿疮

C.蛔虫病、小儿疳积

D.绦虫病、钩虫病、温热斑疹

E.绦虫病、蛲虫病、蛔虫病

(1) 使君子应用的病证是

(2) 苦楝皮应用的病证是

11.A.利尿消肿

B.止咳平喘

C.除烦安神

D.活血疗伤

E.凉血消痈

(1) 桃仁具有的功效是

(2) 益母草具有的功效是

12.A.石菖蒲

B.远志

C.龙骨

D.酸枣仁



E.合欢皮

(1) 具有养心益肝，敛汗生津功效的药物是

(2) 具有祛痰开窍安神功效的药物是

13.A.补肾宁心

B.收敛止血

C.敛疮生肌

D.温中行气

E.敛肺止咳

(1) 五味子具有的功效是

(2) 乌梅具有的功效是

14.A.麻黄、桂枝

B.桂枝、细辛

C.细辛、干姜

D.细辛、麻黄

E.干姜、半夏

(1) 小青龙汤中主要起发汗散寒解表作用的配伍药物是

(2) 小青龙汤中主要起温肺散寒化饮作用的配伍药物是

15.A.疏肝解郁，行气止痛

B.透邪解郁，疏肝理脾

C.补脾柔肝，祛湿止泻

D.疏肝解郁，养血健脾

E.和解少阳，内泻结热



(1) 逍遥散的功用是

(2) 四逆散的功用是

16.A.白术

B.黄芪

C.当归

D.柴胡

E.茯苓

(1) 补中益气汤的组成药物中不含

(2) 逍遥散的组成药物中不含

17.A.干姜、茯苓

B.当归、大黄

C.半夏、生姜

D.柴胡、苏叶

E.干姜、半夏

(1) 旋覆代赭汤的组成药物中含有

(2) 苏子降气汤的组成药物中含有

18.A.消风散

B.牵正散

C.玉真散

D.小活络丹

E.地黄饮子

(1) 用于治疗风疹的方剂是



(2) 治疗暗瘕证的代表方剂是

19.A.五淋散

B.六一散

C.八正散

D.导赤散

E.小蓟饮子

(1) 湿热下注，症见尿频尿急，热涩刺痛，苔黄腻，脉滑数者，宜首选

(2) 下焦瘀热，症见尿中带血，赤涩热痛，舌红，脉数者，宜首选

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

扫描二维码去做题



正保医学教育网

www.med66.com



《相关专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症表现的发热属于

- A. 气虚发热
- B. 血虚发热
- C. 阴虚发热
- D. 气郁发热
- E. 小儿夏季热

2. 清醒时经常汗出，活动后症状表现更加明显的异常汗出是

- A. 自汗
- B. 盗汗
- C. 战汗
- D. 绝汗
- E. 热汗

3. 导致目隐隐痛，时作时止的病因是

- A. 肝火上炎
- B. 阴虚火旺
- C. 风热
- D. 青光眼
- E. 瘀血阻络



4.神乱的临床表现不包括

- A.焦虑恐惧
- B.淡漠痴呆
- C.猝然昏倒
- D.狂躁不安
- E.言语不休

5.皮肤出现红色，粟粒状疹点，高出皮肤，抚之碍手，压之褪色多为

- A.水痘
- B.湿疹
- C.斑
- D.疹
- E.白痞

6.多主脾虚与水湿内停证的是

- A.老舌
- B.嫩舌
- C.瘦舌
- D.裂纹舌
- E.齿痕舌

7.剥脱处不光滑，似有新生颗粒的舌苔表现为

- A.花剥苔
- B.类剥舌
- C.地图舌



D.鸡心苔

E.根剥苔

8.寒痰湿浊停聚于肺所致的咳嗽特点是

A.咳声轻清低微

B.咳声重浊沉闷

C.咳声不扬痰黄稠

D.阵发性痉挛性咳嗽

E.干咳无痰或少痰

9.脉象特征表现为往来流利圆滑，如珠走盘的是

A.数脉

B.滑脉

C.动脉

D.涩脉

E.弦脉

10.以咳喘或呕吐、呃逆等主要表现的证候属于

A.气逆证

B.气闭证

C.气滞证

D.血瘀证

E.血虚证

11.下列证型中，以神志抑郁、错乱、痴呆、昏迷与痰浊症状共见为主要辨证依据的是

A.心脉痹阻证



B.瘀阻脑络证

C.痰蒙心神证

D.痰火扰神证

E.心火亢盛证

12.下列不属于脾不统血证临床表现的是

A.便血尿血

B.月经过多

C.崩漏下血

D.鼻衄紫斑

E.舌质紫暗

13.肝风内动四证中，肝阳化风证的性质属

A.虚证

B.实证

C.实热证

D.上实下虚证

E.上虚下实证

14.不属于肾虚水泛证临床表现的是

A.腰膝酸软

B.小便短少

C.畏冷肢凉

D.腹部胀满

E.五心烦热



正保医学教育网

www.med66.com



15.以少腹急结、小便自利、大便色黑为辨证依据的是

- A.太阳中风证
- B.太阳伤寒证
- C.太阳蓄水证
- D.太阳蓄血证
- E.阳明经证

16.伤寒病不经过传变，两经或三经同时出现的病证称为

- A.直中
- B.并病
- C.合病
- D.同病
- E.兼病

17.往来寒热、胸胁苦满、神情默默、不欲饮食、心烦喜呕、脉弦所属的证是

- A.表证
- B.里证
- C.半表半里证
- D.热证
- E.寒证

18.不属于心肝血虚证临床表现的是

- A.头晕目眩
- B.失眠多梦
- C.肢体麻木



D.面白无华

E.声低懒言

19.引起发热的病因中,属非感染性发热的是

A.立克次体

B.抗原-抗体反应

C.肺炎支原体

D.螺旋体

E.病毒

20.非化脓性肋软骨炎多侵犯

A.第 1、2 肋软骨

B.第 2、3 肋软骨

C.第 3、4 肋软骨

D.第 1、3 肋软骨

E.第 1、4 肋软骨

21.下列不属于个人史的是

A.出生地区

B.习惯与嗜好

C.冶游史

D.职业和工作条件

E.生育史

22.语颤增强见于

A.肺气肿





B.气胸

C.胸腔积液

D.肺实变

E.胸膜肥厚

23.坐位时心脏浊音界呈三角烧瓶形，卧位时心底部浊音界增宽，提示

A.心包积液

B.二尖瓣狭窄

C.扩张型心肌病

D.肺源性心脏病

E.主动脉瓣关闭不全

24.下列可见到中性粒细胞减少的疾病是

A.脾功能亢进

B.急性心肌梗死后 1~2 天

C.急性溶血

D.肺吸虫病

E.急性细菌性肺炎

25.血肌酐明显升高时，肾小球滤过率下降到正常人的

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

E.1/6



26.急性心肌梗死肌红蛋白开始升高是在

- A.发病后 0.2~1 小时
- B.发病后 0.5~2 小时
- C.发病后 1~2 小时
- D.发病后 2~3 小时
- E.发病后 3~5 小时

27.下列各项，不符合房性早搏心电图特征的是

- A.提早出现房性 P'波
- B.房性 P'波形态与窦性 P 波不同
- C.代偿间歇不完全
- D.P'-R 间期 $\geq 0.12s$
- E.P'波后的 QRS 波群时间 $> 0.12s$

28.典型心绞痛发作时，面对缺血区的导联心电图改变的特点是

- A.U 波增高
- B.T 波高耸
- C.ST 段弓背向上抬高
- D.ST 段水平型下移
- E.出现病理性 Q 波

29.原发性肺结核原发综合症的典型表现为

- A.肺门和（或）纵隔淋巴结肿大而突向肺野
- B.肺内原发灶、淋巴管炎及淋巴结炎三者组成的哑铃状双极现象
- C.X 线可见渗出、增殖、播散、纤维和空洞等多种性质的病灶同时存在



D.X 线可见以两上、中肺野为主的大小不一、密度不同、分布不均的多种性质的病灶

E.X 线可见两肺大小、密度、分布都均匀一致的粟粒状阴影, 正常肺纹理显示不清

30.食管静脉曲张 X 线钡剂造影可见

A.管腔狭窄

B.管壁边缘呈锯齿状

C.皱襞消失

D.皱襞中断

E.皱襞破坏

31.肝脏进行性肿大, 质地坚硬如前额, 多见于

A.肝炎

B.肝脓疡

C.肝癌

D.脂肪肝

E.血吸虫病

32.检查发现患者胸廓前后径与左右径相等, 肋间隙增宽, 应考虑为

A.鸡胸

B.漏斗胸

C.桶状胸

D.扁平胸

E.正常胸廓

33.血小板量与质异常导致毛细血管脆性增加的是

A.尿毒症



B.砷中毒

C.败血症

D.血小板无力症

E.血管性血友病

34.二尖瓣狭窄心尖搏动的移位是

A.略向左移

B.略向右移

C.向左下移位

D.向左上移位

E.向右下移位

35.养生的康复观念包括

A.天人相应、审因施养、动静互涵、协调平衡、正气为本

B.天人相应、形神合一、杂合以养、协调平衡、正气为本

C.天人相应、形神合一、动静互涵、预防为主、正气为本

D.天人相应、形神合一、动静互涵、协调平衡、知行并重

E.天人相应、形神合一、动静互涵、协调平衡、正气为本

36.不属于饮食保健的是

A.粗细搭配，营养充足

B.合理搭配，切忌偏食

C.顾护脾胃，寒温适度

D.饮食宜忌，趋利避害

E.饮食有节，适量定时



37.失语症语言治疗中最常用的方法是

- A.阻断去除法
- B.功能重组法
- C.补偿技术法
- D.Schuell 刺激法
- E.图片回忆法

38.不属于老年性痴呆辨证分型的是

- A.肾虚髓减型
- B.心阳虚衰型
- C.痰浊阻窍型
- D.心脾两虚型
- E.气滞血瘀型

39.冠心病药物治疗的基础是

- A.防治冠脉痉挛
- B.防治心律失常
- C.抗心肌缺血
- D.降压
- E.降脂

40.下列不属于截瘫康复适应证的是

- A.脊髓急性损伤后的特异性治疗已经结束
- B.无严重的并发症
- C.下肢功能部分丧失



D. 下半身感觉障碍

E. 二便排泄功能正常

41. 中医对亚健康状态的调节中应遵循四大原则，不包括

A. 心理调适

B. 饮食调养

C. 运动锻炼

D. 药物干预

E. 定期体检

42. 传染病常见的症状和体征不包括

A. 发热

B. 贫血

C. 发疹

D. 毒血症

E. 单核-巨噬细胞系统反应

43. 严重急性呼吸综合征 (SARS) 归属的中医学范畴是

A. 瘟疫

B. 感冒

C. 伤风

D. 戾气

E. 疫毒

44. 疑为伤寒曾使用过氯霉素的患者，细菌培养应用

A. 大便培养



B.血培养

C.骨髓培养

D.尿培养

E.胆汁培养

45.肾综合征出血热原发性休克发生于病程的

A.1~3天

B.2~5天

C.3~7天

D.4~8天

E.5~7天

46.甲型肝炎有早期诊断价值的是

A.HBsAg 阳性

B.抗-HCV 阳性

C.抗-HBs 阳性

D.抗-HAVIgM 阳性

E.抗-HEVIgM 阳性

47.对颅内压明显增高的患者，腰穿时要注意防止发生

A.脑出血

B.脑水肿

C.偏瘫

D.全瘫

E.脑疝





48.偏执性精神障碍的主要症状是

- A.系统妄想
- B.强迫观念
- C.情感高涨
- D.发作性惊恐
- E.情感喜怒无常

49.思维形式障碍的表现不包括

- A.思维破裂
- B.思维散漫
- C.思维贫乏
- D.关系妄想
- E.刻板言语

50.精神病患者服用抗精神病药物，出现恶性综合征，下列处理不正确的是

- A.给予支持性治疗
- B.立即停用抗精神病药
- C.使用多巴胺激动剂溴隐亭
- D.使用肌肉松弛剂硝苯呋海因
- E.使用抗胆碱能药物盐酸苯海索

51.下列不属于心身疾病特征的是

- A.主要是由心理-社会因素刺激
- B.区别于神经症和精神病
- C.具有躯体症状和与症状相关的体征



D.损害往往涉及的是植物神经所支配的组织或器官

E.没有明确的器质性损害

52.下列关于医务人员权利内容的叙述正确的是

A.有权对患者的疾病作出判断

B.有权根据病情需要开具诊断证明

C.有权要求患者或家属配合诊治

D.有权干涉对自主选择意向违背社会利益、他人利益、自身根本利益患者的行为

E.以上都是

53.下列不属于会诊的道德要求的是

A.一切从维护患者利益出发

B.经治医师应客观陈述患者的状况

C.尊重科学

D.学术面前人人平等

E.密切联系，加强协作

54.不属于卫生防疫道德要求的是

A.坚持预防为主

B.文明礼貌，团结协作

C.关心体贴，减少痛苦

D.严谨求实，秉公执法

E.坚持群众受益，维护公益

55.下列关于人体试验的道德准则叙述不正确的是

A.维护受试者利益



- B.严谨的科学态度
- C.受试者知情同意
- D.有利于医学和社会发展
- E.妥善处理对受试者的意外伤害

56.激发人们进行自我反省的动力是

- A.医德认识
- B.医德情感
- C.医德意志
- D.医德行为
- E.医德习惯

57.发生医疗事故争议时，应在医患双方在场的情况下封存和启封的内容不包括

- A.会诊意见
- B.病程记录
- C.手术及麻醉记录单
- D.疑难病例讨论记录
- E.上级医师查房记录

58.执业医师在执业活动中应履行的义务不包括

- A.遵守法律、法规，遵守技术规范
- B.关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私
- C.宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育
- D.努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平
- E.从事医学研究、学术交流，参加专业学术团体



59.《中华人民共和国药品管理法》规定：执业医师收受药品生产经营企业给予财物或其他利益的违法行为情节严重的，由卫生行政部门给予的行政处罚是

- A.警告、降职
- B.处分、没收违法所得
- C.吊销执业医师证书
- D.吊销执业许可证
- E.记过、没收违法所得

60.下列关于突发事件的报告情形和报告时限叙述正确的是

- A.发生或者可能发生传染病暴发、流行的应当在 1 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- B.发生或者发现不明原因的群体性疾病的应当在 3 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- C.发生传染病菌种、毒种丢失的应当在 1 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- D.发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件的应当在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- E.以上均不是

61.下列关于传染病防治管理原则的叙述正确的是

- A.防治结合、科学管理、统筹规划、突出重点
- B.防控结合、综合治理、依靠科学、依靠群众
- C.预防为主、科学管理、统筹规划、突出重点
- D.防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众



E.预防为主、分类管理、依靠科学、突出重点

62.下列关于卫生民事责任的构成叙述错误的是

A.违法行为

B.行为人有过错

C.主要是财产责任

D.损害的事实存在

E.损害事实与过错或违法行为有因果关系

二、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.发热轻而恶风

B.发热重恶寒轻

C.发热重恶寒重

D.恶寒重发热轻

E.恶寒轻发热轻

(1) 属于伤风表证特征的是

(2) 属于风热表证特征的是

2.A.疽

B.痈

C.疔

D.疖



E. 疡

(1) 患部漫肿无头, 肤色不变, 疼痛不已的疾病属于

(2) 患部形小而圆, 红肿热痛不甚, 根浅、脓出即愈的疾病属于

3.A. 心火亢盛

B. 肝胆火盛

C. 胃肠热盛

D. 血热内盛

E. 阴虚火旺

(1) 舌尖生点刺者多属于

(2) 舌中生点刺者多属于

4.A. 动脉

B. 涩脉

C. 结脉

D. 促脉

E. 芤脉

(1) 脉来缓慢, 时有中止, 止无定数的是

(2) 脉来数而时有一止, 止无定数的是

5.A. 面色淡白

B. 面色晄白

C. 面色萎黄

D. 面色苍白

E. 面赤如妆



(1) 心阳虚脱证的面色是

(2) 心阳虚证的面色是

6.A.胃脘

B.胸胁

C.胸膈

D.四肢

E.肝胆

(1) 支饮的饮停部位是

(2) 溢饮的饮停部位是

7.A.伤寒

B.克罗恩病

C.直肠癌

D.肠结核

E.血吸虫病

(1) 腹泻伴发热可见

(2) 腹泻伴皮疹或皮下出血可见

8.A.肛裂

B.外痔

C.内痔

D.肛周脓肿

E.直肠息肉

(1) 触及柔软光滑而有弹性物见于



(2) 触痛并有波动感见于

9.A. 甲亢

B. 急性炎症

C. 组织损伤

D. 系统性红斑狼疮

E. 某些恶性肿瘤

(1) 总补体溶血活性减低见于

(2) 补体 C_3 减低见于

10.A. 胸骨右缘第 4 肋间

B. 胸骨左缘第 4 肋间

C. 左腋前线 V_4 水平处

D. 左腋中线 V_4 水平处

E. 左锁骨中线与第 5 肋间相交处

(1) V_5 导联对应的体表位置是

(2) V_6 导联对应的体表位置是

11.A. 血友病

B. 蚕豆病

C. 肝细胞性黄疸

D. 甲状腺功能亢进症

E. 甲状腺功能减退症

(1) TSH 增高主要见于

(2) TSH 降低主要见于



12.A.肝脓肿

B.急性溶血

C.尿路结石

D.胃肠梗阻

E.中毒性菌痢

(1) 腹痛伴寒战、高热提示

(2) 腹痛伴呕吐、腹胀、停止排便排气提示

13.A.桃红四物汤

B.虎潜丸

C.八珍汤

D.接骨丹

E.跌打丸

(1) 气血瘀滞型骨折的选方为

(2) 痰瘀阻络型骨折的选方为

14.A.清热透表，芳香化湿

B.清热化湿，理气和中

C.清热解毒，佐以化湿

D.清热化湿，芳香开窍

E.清热解毒，凉血止血

(1) 伤寒热重湿轻型，治疗原则为

(2) 伤寒湿热蒙蔽心包，治疗原则为

15.A.新生儿



B.婴儿

C.幼儿

D.儿童

E.成人

(1) 暴发型流脑的多发人群是

(2) 慢性败血症型流脑的多发人群是

16.A.抗生素治疗

B.抗病毒治疗

C.抗病毒与补液

D.补液治疗

E.对症治疗

(1) 流行性脑脊髓膜炎的治疗是

(2) 流行性感冒的治疗是

17.A.短暂的偏执、幻觉等症状

B.惊恐、易激惹、攻击破坏行为

C.精神性发作、自动症和朦胧状态

D.精神萎靡，表情呆滞，定向力障碍

E.癫痫性精神病、智力障碍及人格改变

(1) 癫痫发作时精神障碍表现为

(2) 癫痫发作间精神障碍表现为

18.A.有意伤害

B.无意伤害



C.可知伤害

D.可控伤害

E.意外伤害

(1) 必然属于非责任伤害的是

(2) 必然属于责任伤害的是

19.A.警告

B.管制

C.拘役

D.罚金

E.没收财产

(1) 行政处分的种类有

(2) 行政处罚的种类有



每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题





《专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 治疗阴阳两虚型消渴，最佳的选方是

- A. 玉女煎
- B. 消渴方
- C. 金匱肾气丸
- D. 六味地黄丸
- E. 七味白术散

2. 下列哪项不是眩晕肝阳上亢证的主症

- A. 头痛
- B. 面赤
- C. 烦躁
- D. 口苦
- E. 呕吐

3. 与水腫关系最为密切的脏腑是

- A. 肺、脾、肾
- B. 肺、胃、肾
- C. 心、脾、肾
- D. 肝、脾、肾
- E. 心、肝、肾





4.便秘的基本病机是

- A.肠胃不和
- B.肝气郁结
- C.湿热下注
- D.肺失开合
- E.大肠传导失常

5.下列各项，不属胸痹病因的是

- A.寒邪内侵
- B.痰浊阻滞
- C.饮食失调
- D.情志失节
- E.年迈体虚

6.热哮的治疗原则是

- A.宣肺散寒，化痰平喘
- B.解表散寒，清化痰热
- C.祛风涤痰，降气平喘
- D.清热宣肺，化痰定喘
- E.清热宣肺，平喘止咳

7.“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”出自

- A.《医学三字经》
- B.《河间六书》
- C.《素问·咳论》



D.《诸病源候论》

E.《景岳全书》

8.下列各项，不属慢性肾炎基本表现的是

A.水肿

B.管型尿

C.蛋白尿

D.血尿

E.高血压

9.糖尿病最基础的治疗措施是

A.胰岛素治疗

B.支持治疗

C.一般治疗

D.饮食治疗

E.口服降糖药物

10.下列有关蛛网膜下腔出血的治疗原则，错误的是

A.防治再出血

B.不能应用镇静药

C.防治迟发性血管痉挛

D.降颅内压治疗

E.绝对卧床 4~6 周

11.蛛网膜下腔出血的主要症状描述错误的是

A.突然发生剧烈头痛



- B.多伴有恶心呕吐
- C.可有短暂的意识障碍
- D.少数出现部分性或全面性癫痫发作
- E.头痛为短暂性

12.下列关于脑出血急性期的临床表现不正确的是

- A.头痛、呕吐
- B.无意识障碍
- C.肢体瘫痪
- D.脑膜刺激征
- E.痫性发作

13.以“三偏征”为特征的闭塞是

- A.大脑中动脉主干闭塞
- B.大脑中动脉皮层支闭塞
- C.大脑中动脉深穿支闭塞
- D.大脑前动脉主干闭塞
- E.大脑前动脉皮层支闭塞

14.脑栓塞的常见病因为

- A.高血压
- B.脑动脉硬化
- C.脑动脉炎
- D.心脏病
- E.长骨骨折





15. 高血压伴肾脏病患者蛋白尿 2+，首选药物为

- A. 卡托普利
- B. 硝苯地平
- C. 氢氯噻嗪
- D. 美托洛尔
- E. 特拉唑嗪

16. 长期高血压伴顽固性低血钾首先应考虑

- A. 皮质醇增多症
- B. 继发于慢性肾炎的高血压
- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 肾动脉狭窄
- E. 嗜铬细胞瘤

17. 膀胱癌肾虚证的选方为

- A. 大补元煎合二至丸
- B. 八正散
- C. 桃花四物汤
- D. 知柏地黄丸
- E. 八珍汤

18. 食管癌之痰气交阻证首选方剂为

- A. 启膈散
- B. 通幽汤
- C. 沙参麦冬汤



D.补气运脾汤

E.玉枢丹

19.食管癌初期中医治疗原则不包括

A.理气

B.化痰

C.温阳

D.消瘀

E.滋阴养血润燥

20.胃癌胃热阴伤证证候表现不包括

A.胃脘嘈杂隐痛

B.口干咽燥

C.形体消瘦

D.五心烦热

E.苔厚腻

21.治疗原发性肝癌肝阴亏虚证，应首选方剂是

A.茵陈蒿汤合鳖甲煎丸

B.保和丸

C.逍遥散合桃红四物汤

D.一贯煎

E.大柴胡汤

22.原发性肝癌的特异性免疫性检查为

A.CEA



B.AFP

C.CA125

D.CA199

E.γ-GT

23.中晚期肝癌的多发生的首发症状为

A.食欲下降

B.肋痛

C.消瘦乏力

D.发热

E.恶心、腹泻

24.治疗肺癌中医证型之气阴两虚证选用的治法为

A.活血散瘀

B.祛湿化痰

C.养阴清热

D.益气养阴

E.补气血，益肝肾

25.类癌综合征表现不包括

A.皮肤潮红

B.Horner 征

C.腹泻

D.水肿

E.喘息



正保医学教育网

www.med66.com



26.肺癌最常见的首发症状为

- A.咳嗽
- B.胸痛
- C.气短
- D.发热
- E.声音嘶哑

27.不属于膀胱癌中医病因的是

- A.湿热邪毒
- B.风邪入于少阴
- C.肾虚不固
- D.气血亏虚
- E.湿热下注

28.不宜使用鼻饲法的是

- A.昏迷
- B.食管狭窄
- C.早产儿
- D.上消化道出血
- E.肿瘤患者

29.急喉风针刺主穴治疗的方法为

- A.用泻法不留针
- B.用泻法留针
- C.用补法留针



D.用补法不留针

E.用平补平泻法

30.吸氧术的副作用不包括

A.氧中毒

B.肺不张

C.晶状体后纤维组织增生

D.呼吸道分泌物湿润

E.呼吸抑制

31.硫化氢类中毒呼出气味为

A.蒜臭味

B.酒味

C.蛋臭味

D.烂苹果味

E.苦杏仁味

32.流火在中医外科中属于

A.痈

B.丹毒

C.发

D.疔

E.疗

33.乳痛最常见的病因是

A.饮食不节





B.肝气郁结

C.乳汁郁积

D.汗出受风

E.热毒炽盛

34.湿热下注型精癯的用方为

A.八正散

B.知柏地黄汤

C.金锁固精丸

D.沉香散

E.龙胆泻肝汤

35.药性偏寒凉，能清热消肿，散瘀化痰的药物是

A.咬头膏

B.金黄膏

C.干捶膏

D.冲和膏

E.回阳玉龙膏

36.生理性带下的特点是

A.赤白相兼、质稠、有特殊气味

B.无色无臭、黏而不稠

C.清稀如水、淋漓不断

D.色白质稀、无臭、绵绵不断

E.量少、色黄或赤白相兼、质稠



37.治疗气血虚弱型痛经的最佳选方是

- A.圣愈汤
- B.举元煎
- C.补中益气汤
- D.大补元煎
- E.归脾汤

38.治疗带下病湿毒蕴结证，应首选的方剂是

- A.内补丸
- B.完带汤
- C.知柏地黄汤
- D.止带方
- E.五味消毒饮

39.可测出原始胎心搏动的孕周是

- A.1~2周
- B.3~5周
- C.6~8周
- D.8~10周
- E.10~12周

40.小儿患病后易趋康复的主要原因是

- A.心常有余
- B.肝常有余
- C.稚阴稚阳



D.脏腑已成

E.脏气清灵

41.不属于小儿肾病综合征肝肾阴虚证证候表现的是

A.头晕头痛

B.舌红苔少

C.五心烦热

D.全身明显浮肿

E.目睛干涩

42.导致鹅口疮的病原体是

A.链球菌

B.流感杆菌

C.葡萄球菌

D.柯萨奇病毒

E.白色念珠菌

43.小儿厌食脾失健运证的治法是

A.调和脾胃，运脾开胃

B.健脾益气，佐以温中

C.滋脾养胃，佐以助运

D.运脾化湿，消积开胃

E.补脾开胃，消食助运

44.肩胛骨内侧缘至后正中线的骨度分寸是

A.1.5 寸



B.3 寸

C.4 寸

D.6 寸

E.8 寸

45.既可治疗鼻衄，又可治疗昏迷的是

A.太渊

B.孔最

C.少商

D.鱼际

E.尺泽

46.下列各穴中，常用于治疗痰多、咳嗽的穴位是

A.内庭

B.丰隆

C.解溪

D.上巨虚

E.厉兑

47.申脉穴位于

A.外踝下缘与跟骨之间凹陷中

B.外踝尖与跟腱之间的凹陷处

C.内踝尖与跟腱之间的凹陷处

D.外踝高点上 3 寸，腓骨前缘

E.腓骨小头前下方凹陷中





48.雀啄灸属于

A.艾条灸

B.温灸器灸

C.天灸

D.温针灸

E.艾炷灸

49.胃阴不足型胃痛，除主穴外，还应加用

A.胃俞、肺俞

B.下脘、梁门

C.三阴交、内庭

D.膈俞、胃俞

E.气海、命门

50.起止、交接或循行于眼内眦的经脉是

A.足阳明胃经

B.足太阴脾经

C.手少阳三焦经

D.手阳明大肠经

E.足厥阴肝经

51.气血亏虚型视物昏渺的中医治疗选方是

A.消风散

B.二陈汤

C.四物汤



D.四君子汤

E.人参养荣汤

52.天行赤眼初感疔气治宜

A.泻火解毒

B.益气补血

C.疏风清热

D.滋阴降火

E.明目退翳

53.鼻衄的临床治疗原则是

A.清热凉血，益气摄血

B.急则治标，缓则治本

C.紧急止血，以防血脱

D.正本清源，求因治本

E.塞流、澄源、复旧

54.下列不是鼻衄临床表现的是

A.鼻塞

B.鼻痒

C.喷嚏

D.鼻黏膜肿胀

E.鼻黏膜萎缩

55.骨折初期治疗宜采用攻法，所谓初期是指伤后几周

A.1 周



B.1~2 周

C.2 周

D.2~3 周

E.3 周

56.下列哪一项是骨折的特有体征

A.疼痛

B.肿胀

C.活动功能障碍

D.异常活动

E.水泡

57.牵拉肘的好发人群是

A.幼儿

B.男性

C.体力劳动者

D.年老体弱者

E.女性

58.肩关节周围炎关节活动受限最明显的方式是

A.前屈

B.内收

C.前伸

D.外展

E.内旋



正保医学教育网

www.med66.com



二、B 型题

答题说明: 以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次, 也可以选用数次, 但也可以一次不选用。

1.A.石韦散

B.沉香散

C.代抵挡丸

D.八正散

E.小蓟饮子

(1) 小便艰涩, 尿中夹有砂石, 尿道窘迫疼痛, 舌红苔黄, 脉弦者, 治疗首选的方剂是

(2) 小便涩滞, 淋漓不畅, 小腹胀满疼痛, 舌苔薄白, 脉沉弦者, 治疗首选的方剂是

2.A.呼吸急促, 喉间痰鸣

B.气短息促, 胸胁胀痛, 咳唾转侧, 呼吸时加剧

C.咳吐浊唾涎沫, 咳声不扬, 气急喘促

D.咳嗽气急, 咳吐脓痰, 其味腥臭, 壮热汗出

E.呼吸困难, 甚则张口抬肩, 鼻翼扇动不能平卧

(1) 喘证的特征

(2) 哮病的特征

3.A.呼吸道感染史, 水肿, 血尿, 蛋白尿, 高血压

B.发热、皮疹、血尿、水肿、蛋白尿, 高血压

C.尿频、尿急、尿痛, 向阴部下传的腹痛

D.寒战、发热, 尿频、尿急、尿痛, 肾区叩击痛



E.仅尿频、尿急、尿痛

(1) 急性肾小球肾炎临床表现为

(2) 狼疮性肾炎临床表现为

4.A.脑血栓形成

B.脑栓塞

C.短暂性脑缺血发作

D.脑出血

E.蛛网膜下腔出血

(1) 可有明显脑膜刺激征的脑血管疾病为

(2) 伴有剧烈头痛的脑血管疾病为

5.A.桃红四物汤

B.八正散

C.八珍汤

D.归脾汤

E.通幽汤

(1) 膀胱癌湿热证选方为

(2) 膀胱癌瘀毒证选方为

6.A.通幽汤

B.启膈散

C.失笑散合膈下逐瘀汤

D.沙参麦冬汤

E.补气运脾汤



(1) 食管癌瘀血内结证的选方为

(2) 胃癌瘀毒内阻证的选方为

7.A.养阴清热

B.益气养阴润燥

C.解毒散结

D.补气血、益肝肾

E.健脾补气

(1) 肺癌放疗期间，中医治疗原则为

(2) 肺癌化疗期间，血细胞下降明显者，中医治疗原则为

8.A.上肢烧灼样疼痛

B.声音嘶哑

C.吞咽困难，呼吸不畅

D.胸闷气急，气促心悸

E.头颈肿胀、睛赤唇紫、头晕目眩、胸闷

(1) 肺癌上腔静脉综合征表现为

(2) 肺癌颈交神经丛和臂丛神经受侵表现为

9.A 三圣散

B.催吐解毒汤

C.兴国解毒汤

D.生黄豆、生绿豆，煎汁服

E.绿豆甘草解毒汤

(1) 用于各种食物中毒的是



(2) 用于治疗有机磷农药中毒的是

10.A.痰水凌心证

B.痰瘀内阻证

C.营卫受邪证

D.心肾阳虚证

E.气阴两虚证

(1) 血府逐瘀汤合苓桂术甘汤治疗心衰之

(2) 葶苈大枣泻汤合五苓散治疗心衰之

11.A.流火

B.赤游丹毒

C.内发丹毒

D.抱头火丹

E.类丹毒

(1) 新生儿臀部皮肤突然发红成片，色如丹涂者，为

(2) 小腿足部皮肤突然发红成片，色如丹涂者，为

12.A.逍遥萸贝散

B.柴胡疏肝散

C.瓜蒌牛蒡汤

D.托里消毒散

E.桃红四物汤

(1) 治疗乳痈气滞热壅证首选

(2) 治疗乳痈正虚毒恋证首选



13.A.疏肝解郁, 清热调经

B.清热凉血, 止血调经

C.滋阴清热, 养血调经

D.补肾疏肝, 养血调经

E.补肾填精, 养血调经

(1) 月经先期阳盛血热证的治法是

(2) 月经先期阴虚内热证的治法是

14.A.氟康唑

B.甲硝唑

C.阿奇霉素

D.头孢唑林

E.戊酸雌二醇

(1) 治疗滴虫性阴道炎, 宜选

(2) 治疗外阴阴道假丝酵母菌病, 宜选

15.A.青黛适量, 布包, 扑撒疱疹局部

B.如意金黄散适量, 以蜂蜜调匀涂敷患处

C.新鲜仙人掌去刺, 洗净后捣泥涂敷患处

D.苦参 15g、芒硝 10g、浮萍 10g, 煎水外洗

E.西瓜霜、冰硼散、珠黄散任选 1 种, 涂搽患处

(1) 水痘瘙痒, 疱疹破溃者, 宜用的外治法为

(2) 水痘皮疹较密, 瘙痒明显者, 宜用的外治法为

16.A.大便稀薄, 夹有食物, 泻后痛减



B.便下急迫，便色黄褐，气味秽臭

C.大便稀溏，色淡不臭，食后易泻

D.大便清稀，完谷不化，澄澈清冷

E.便稀多沫，臭气不重，肠鸣腹痛

(1) 伤食泻症见

(2) 脾肾阳虚泻症见

17.A.肝、脾、肾病

B.中风脱证、虚寒、下焦病

C.后头、肩胛、神志病

D.中风、昏迷、热病、头面病

E.前头、口齿、咽喉病，胃肠病

(1) 手太阳经的主治特点是

(2) 督脉的主治特点是

18.A.患者呼气时进针，吸气时出针

B.进针时疾速刺入，多捻转，徐徐出针

C.进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针

D.出针时摇大针孔而不按

E.患者吸气时进针，呼气时出针

(1) 属于疾徐补泻法中补法操作的是

(2) 属于呼吸补泻法中泻法操作的是

19.A.杞菊地黄丸

B.加减驻景丸



C.四君子汤

D.左归丸

E.二至丸

(1) 治疗圆翳内障证属脾气虚弱者的主方是

(2) 治疗圆翳内障证属肝肾不足者的主方是

20.A.银翘散

B.蔓荆子散

C.金匱肾气丸

D.参苓白术散

E.玉屏风散合苍耳子散

(1) 鼻鼽肺气虚寒、卫表不固证，治疗方剂宜选

(2) 鼻鼽脾气虚弱、清阳不升证，治疗方剂宜选

21.A.左归丸

B.鹿角胶丸

C.右归丸

D.十全大补汤

E.龟鹿二仙胶汤

(1) 骨质疏松症正虚邪侵证治疗宜选用

(2) 骨质疏松症肾虚精亏证治疗宜选用



《专业实践能力》仿真密卷

一、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1.患者，男，39 岁，晨起进食后出现右肋隐痛不适、饱胀，伴暖气、呃逆，疼痛呈绞痛，向肩胛部和背部放射，最可能的诊断的是

- A.病毒性肝炎
- B.胰腺炎
- C.胆囊结石
- D.胆道蛔虫病
- E.肝癌

2.患者，男，45 岁，确诊为痹证 1 年余，未作系统治疗，现肌肉瘦削，腰膝酸软。舌质淡红，舌苔薄白，脉沉细弱，治疗首选方剂为

- A.防风汤
- B.双合汤
- C.薏苡仁汤
- D.独活寄生汤
- E.宣痹汤

3.患者，女，25 岁。近日饱食后，出现胃脘胀满疼痛，嗳腐吞酸，呕吐不消化食物，吐后痛减，舌苔厚腻，脉滑。治法宜用

- A.疏肝理气，清热泻火
- B.疏肝理气，理气活血



C.消食导滞，和胃止痛

D.疏散风寒，消食导滞

E.以上都不是

4.患者女，34岁。平素精神抑郁，前日与人口角后，即出现呼吸喘促，咽中如室，胸腹胀满，伴心悸，失眠，苔薄，脉弦。其诊断为

A.气滞痰郁型郁证

B.肝火犯肺型喘证

C.肝气郁结型喘证

D.肝气乘肺型喘证

E.肝气犯肺型喘证

5.患者，男，56岁，水肿日久，肿势不甚，伴腰膝酸软，手足心热，口咽干燥，头晕耳鸣。舌红少苔，脉象沉细，可以服用的中成药是

A.肾炎片

B.五苓散

C.金匱肾气丸

D.六味地黄丸

E.肾炎消肿片

6.患者，女，68岁，平素头晕头痛，耳鸣目眩，现突然发生口眼歪斜，舌强语謇，手足重滞，舌质红苔黄，脉弦。诊断为中风之中经络，选方为

A.真方白丸子

B.天麻钩藤饮

C.镇肝息风汤



D.羚角钩藤汤

E.补阳还五汤

7.患者男，36岁。平日性情急躁易怒，近日因工作不顺导致失眠，不思饮食，口渴喜饮，口苦目赤，小便黄，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。其首选治疗方剂是

A.丹栀逍遥散

B.龙胆泻肝汤

C.滋水清肝饮

D.黄连温胆汤

E.柴胡疏肝散

8.男，23岁。血尿、蛋白尿2年。查体：BP160/90mmHg。尿蛋白1.3~1.8g/L，血肌酐100 μ mol/L。初步诊断为慢性肾小球肾炎，出现下列哪种情况需要转诊

A.对症治疗后复查疗效

B.医院饭菜不合患者口味

C.对症治疗后病情稳定

D.治疗后病情无变化，需要进一步明确诊断

E.需要做肾活检明确诊断

9.男，50岁。水肿1月，少尿伴血压升高1周。1月余前曾有皮肤感染史。尿常规：尿蛋白(+)，沉渣镜检RBC20~30/HP，血C₃降低，诊断为急性肾小球肾炎。通常该患者C₃恢复正常的时间约为

A.1~2周

B.6~8周

C.3~6个月



D.6~8 个月

E.1 年

10.女性, 30 岁, 尿痛、尿频、尿急 2 天, 伴发热、腰痛、恶心、呕吐, 血压 120/80mmHg, 尿常规检查有红、白细胞及白细胞管型, 其诊断可能是

A.急性膀胱炎

B.急性肾盂肾炎

C.慢性肾盂肾炎

D.急性肾炎

E.慢性肾炎

11.男, 65 岁, 有高血压、糖尿病多年。一天前发现左侧上、下肢活动受限, 吐字不清, 神志清楚。无明显头痛、呕吐, 检查发现左侧上、下肢肌力 3 级, 左半身痛觉减退, 头颅 CT 未见异常, 临床上考虑可能性最大的疾病是

A.脑出血

B.脑栓塞

C.短暂性脑缺血发作

D.蛛网膜下腔出血

E.脑血栓形成

12.60 岁男性, 近 2 年反复发作, 突发不能说话, 右上下肢无力, 约 20 分钟恢复, 发作后检查, 神经系统正常。首先要考虑的诊断是

A.局限性癫痫

B.脑栓塞

C.癔病发作



D.颈内动脉系统 TIA

E.椎基底动脉系统 TIA

13.男性，55 岁，晨起用力大便后突然出现胸骨后疼痛，有压迫感、胸闷，家属给予硝酸甘油含服后不能缓解，发作半个小时后急诊入院。其胸痛最可能的诊断是

A.肋间神经痛

B.急性心肌梗死

C.胆绞痛

D.胃食管反流

E.心绞痛

14.患者，男，35 岁，一周前淋雨后出现流鼻涕、咳嗽等症状，自服感冒药效果欠佳。今日出现发热，咳嗽、咳痰加重，查体：T39°C，双肺可闻及支气管呼吸音。血常规：WBC $13.0 \times 10^9/L$ 。首先考虑的诊断是

A.上呼吸道感染

B.支气管哮喘

C.慢性支气管炎

D.肺炎

E.急性支气管炎

15.患者，男，78 岁。既往高血压、冠心病、糖尿病史。半个月前确诊膀胱癌，现无痛性间歇性出现血尿，伴腰酸腿软，神疲乏力，头昏眼花。舌淡红，脉沉细，尺弱。因患者为高龄老人，基础疾病多，家属拒绝手术治疗和放化疗。中医治法为

A.益气滋肾，收敛摄血

B.滋阴养血，补气健脾



C.清热利湿，解毒通淋

D.活血化瘀，理气散结

E.祛湿化浊，滋阴补气

16.患者，女，67岁，2年前行食管癌手术，术后恢复可。3个月前出现饮食梗阻感，症状逐渐加重。1周前复查发现吻合口复发，因患者年老体弱，家人寻求中医治疗。现症见水饮不下，泛吐多量黏液白沫，面浮足肿，面色晄白，形寒气短，精神疲惫，腹胀，形寒气短。舌质淡，苔白，脉细弱，首选方剂为

A.沙参麦冬汤

B.补气运脾汤

C.启膈散

D.补阳还五汤

E.通幽汤

17.患者，男，69岁，出现便血，伴贫血、腹痛、右下腹肿块1个月，无发热，伴明显消瘦，腹胀，应首先考虑诊断

A.慢性阑尾炎

B.阑尾类癌

C.结肠癌

D.溃疡性结肠炎

E.肠结核

18.患者女，41岁，右上腹隐痛2个月。肝右肋下1.5cm、剑突下3.5cm触及，脾未触及；谷丙转氨酶正常，胆红素正常，AFP阴性。B超可探及肝右叶2.3cm×1.9cm实质性暗区。

为明确诊断，首选的检查是



A.B 超引导下穿刺活检

B.酶学检查

C.腹部 CT

D.肝功能测定

E.铁蛋白测定

19.男性患者，42 岁。不规则低热 3 个月，厌食，体重下降 5kg，右季肋下胀痛，巩膜轻度黄染，面部有三个蜘蛛痣，肝肋下 3.5cm，质硬表面不平，脾肋下 1cm，肝区可闻及血管杂音，白细胞 $5.8 \times 10^9/L$ ，中性 0.64，谷丙转氨酶 130U/L。碱性磷酸酶 30U/L。经中西医治疗无效。应诊断为

A.慢性活动性肝炎

B.原发性肝癌

C.肝硬化

D.肝脓肿

E.肝血管瘤

20.患者男，53 岁。右上腹疼痛 2 个月，现右肋疼痛较剧，如锥如刺，入夜更甚，甚至痛引肩背，右肋下结块较大，质硬拒按，面色萎黄而暗，倦怠乏力，食欲不振，大便溏结不调。舌质紫暗，有瘀点瘀斑，脉弦涩。实验室检查：甲胎蛋白 540ng/ml，腹部 B 超示右肝占位性病变，直径 5cm。治疗首选的方剂是

A.复元活血汤

B.茵陈蒿汤

C.鳖甲煎丸

D.滋水清肝饮和血府逐瘀汤



E.血府逐瘀汤

21.患者女性，74岁。确诊支气管肺癌1个月，拒绝西医治疗，请中医诊治。症见：咳嗽无痰，痰中带血，甚则咯血不止，心烦，少寐，盗汗，口渴，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉细数。治疗宜首选

A.生脉饮

B.血府逐瘀汤

C.导痰汤

D.沙参麦冬汤合五味消毒饮

E.沙参麦冬汤

22.患者，男，72岁，独居老人，被家人发现时晕倒在地，急诊入院，确诊为急性脑出血。

现患者昏愦不语，面目唇紫，气息微弱，冷汗淋漓，四肢厥逆，二便失禁。舌淡润暗，脉微细欲绝，中医治疗首选方剂为

A.生脉散

B.参附汤

C.回阳救逆汤

D.菖蒲郁金汤

E.开窍醒脑汤

23.患者男性，56岁，心室颤动，电击后使用肾上腺素仍没有好转，应首选的药物是

A.利多卡因

B.异丙肾上腺素

C.阿托品

D.洋地黄



E.安定

24.患者，女，38岁。因昏迷而送来急诊。查体：深昏迷状态，呼吸有轻度大蒜味，疑为有机磷中毒。下列哪项对诊断最有帮助

A.全血胆碱酯酶活力降低

B.瞳孔缩小

C.呕吐物有大蒜臭味

D.大小便失禁

E.肌肉抽动

25.患者，女，60岁，慢性心衰病史3年，现发热，身微恶寒，肢节不舒，头眩胀，心下逆满，心悸喘促难安，肢厥，尿少，舌红，苔薄白，脉浮。治疗应首选

A.真武汤

B.安神定志丸

C.人参养荣汤合桃红四物汤

D.麻杏石甘汤

E.桂枝去芍药加附子汤

26.患者，男，58岁，现神昏，身热不扬，烦躁，谵语，二便秘结，舌红绛，苔厚腻，脉沉实有力。最佳治疗方药为

A.陶氏回阳急救汤

B.回阳救逆汤

C.通脉四逆汤

D.冯氏全真一气汤

E.菖蒲郁金汤



27.患者，男，29岁，工地工人，腿外伤后5小时，在工作做了简单的消毒包扎后未做进一步治疗，继续工作。半小时前突然昏倒。急诊来院，现神昏，壮热，烦渴，便闭不通，汗出淋漓，身烦热而肢冷，烦躁不宁，肌肤紫斑。舌质红绛，苔黄厚燥，脉沉细而数，中医辨证为

- A.瘀血内阻证
- B.热毒内陷证
- C.气脱阳伤证
- D.气脱阴损证
- E.气滞血脱证

28.患者，女，35岁。突然恶寒发热，小腿皮肤红赤，灼热肿胀，迅速扩大，鲜红成片，界限清楚。其诊断是

- A.发
- B.疔
- C.丹毒
- D.有头疽
- E.疖

29.某患者，一侧乳房广泛紧韧肿硬，皮色紫红，皮肤呈橘皮样变，全身炎症反应不明显，应首先考虑为

- A.乳岩
- B.乳癆
- C.乳痈
- D.乳核



E.乳痈

30.患者，男，45岁。小便不畅，尿线变细，小腹胀满隐痛，舌质暗，有瘀点，苔白，脉弦。

治疗应首选的方剂是

A.少腹逐瘀汤

B.石韦散

C.八正散

D.沉香散

E.血府逐瘀汤

31.患者，男，29岁。肛门右侧红肿热痛，痛如鸡啄，伴恶寒发热，口干便秘，检查见肛旁红肿高突，明显压痛，有波动感，舌红，苔黄，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

A.托里消毒饮

B.萹藤渗湿汤

C.透脓散

D.三妙丸

E.止痛如神汤

32.某男，皮疹为红斑、丘疹、风团、水疱，甚则糜烂渗液，表皮剥脱；伴灼热剧痒，口干，大便燥结，小便黄赤，发热；舌红，苔薄黄，脉滑数。其治则为

A.清热化瘀，解毒通络

B.清利湿热，解毒通络

C.清营解毒凉血

D.疏风清热解毒

E.清热泻火，凉血解毒



33.患者,男,38岁。外生殖器出现疣状赘生物,色灰,质软,表面秽浊潮湿,触之易出血,恶臭,小便黄,苔黄腻,脉滑数。其证候是

- A.血脉瘀阻证
- B.湿热壅盛证
- C.营血两伤证
- D.邪毒内陷证
- E.湿毒下注证

34.患者,女,48岁,月经周期紊乱,或先期或后期,量时少时多,伴烘热出汗,五心烦热,头晕耳鸣,腰酸乏力,舌红苔薄,脉细数。治疗应首选

- A.两地汤
- B.二仙汤
- C.左归丸
- D.内补丸
- E.肾气丸

35.患者,女,45岁。月经不规律9个月,现阴道出血20天,时而暴下不止,时而淋漓不尽,色淡而质稀,面色无华,神疲乏力,面浮肢肿,手足不温,舌质淡,苔白,脉沉细。患者要求用中成药治疗,应首选

- A.右归丸
- B.归脾丸
- C.益母草膏
- D.济生肾气丸
- E.桂枝茯苓丸



36.某女士，经来无期，经血淋漓难止，或突然暴崩如注，血色深红，质稠；口渴烦热，便秘溺黄；舌红，苔黄，脉滑数。最佳选方是

- A.清热固经汤
- B.清经散
- C.保阴煎
- D.两地汤
- E.上下相资汤

37.患者，女，33岁。带下量多3月余，色白、如涕、无臭味，近2日出现带下色黄，黏稠，有臭味，伴面色萎黄，神疲倦怠，纳少便溏，舌淡胖，苔黄腻，脉缓弱。其治法是

- A.益肾滋阴，清热祛湿
- B.温肾培元，固涩止带
- C.健脾清肝，利湿止带
- D.健脾祛湿，清热止带
- E.健脾益气，升阳除湿

38.患者，女，30岁，自诉三天来带下量多，色黄，质黏腻，呈脓性，外阴瘙痒，胸闷口苦，小便短赤，舌红，苔黄腻，脉濡数。其治疗的首选方是

- A.五味消毒饮
- B.完带汤
- C.苓桂术甘汤
- D.知柏地黄丸
- E.止带方

39.患者，女，30岁。停经7周，今日午间突感左侧下腹部撕裂样剧痛，伴有恶心呕吐，阴



道少量出血，面色苍白，四肢厥冷，冷汗淋漓，烦躁不安。急诊入院查妊娠试验阳性，B超提示宫腔内无孕囊，并见盆腔积液，行阴道后穹窿穿刺见暗红色不凝血。根据患者情况，应初步诊断为

- A. 早期妊娠
- B. 先兆流产
- C. 异位妊娠
- D. 急性输卵管炎
- E. 卵巢囊肿蒂扭转

40. 患者，女，26岁。妊娠2个月，呕吐痰涎，胸闷泛恶，头晕目眩，神疲，纳呆，舌淡苔厚腻，脉缓滑。其治疗宜选

- A. 加味温胆汤加石斛、玉竹、胡麻仁
- B. 香砂六君子汤橘红易陈皮，加瓜蒌、苏叶
- C. 苏叶黄连汤加姜半夏、枇杷叶、竹茹、乌梅
- D. 香砂六君子汤去半夏，加杜仲、菟丝子、桑寄生
- E. 香砂六君子汤去砂仁、茯苓、木香，加玉竹、麦冬、石斛、胡麻仁

41. 一产妇分娩数日后，肢体关节疼痛，屈伸不利，冷痛剧烈，宛如针刺，得热则舒，恶风怕冷，舌淡，苔白，脉濡细。最佳选方是

- A. 黄芪桂枝五物汤
- B. 独活寄生汤
- C. 生化汤
- D. 身痛逐瘀汤
- E. 养荣壮肾汤



42.患者，女，36岁。产后1周，遍身关节酸痛，麻木，伴头晕心悸，气短乏力，舌淡，苔薄白，脉细弱。其证候是

- A.气虚证
- B.肾虚证
- C.血虚证
- D.血寒证
- E.脾虚证

43.患者，女，41岁。1月前曾患急性盆腔炎，经治疗后好转，现仍感少腹疼痛，绵绵不休，白带量多，淋漓不断，伴腰膝酸软，头晕目眩，神疲乏力，舌暗，有瘀点，苔薄，脉沉细。

治疗方剂宜选

- A.牡丹散
- B.左归丸
- C.慢益汤
- D.参苓白术散
- E.金匱肾气丸

44.患儿，3岁。体重14千克，身长86厘米。该患儿的生长发育状况为

- A.体重偏高，身长偏低
- B.体重偏低，身长正常
- C.体重正常，身长偏高
- D.体重正常，身长偏低
- E.体重偏高，身长正常

45.患儿，出生1天。面目红赤，多啼声响，无胎粪排出。最可能的原因是



A.胎毒

B.胎怯

C.胎惊

D.五硬

E.胎寒

46.患儿，5岁，突发脐周剧痛，频繁呕吐，呕吐物中可见一条蛔虫，腹部可扪及柔软可移动团块，大便干结，舌质红，苔白，脉弦数，治疗应首选的方剂是

A.乌梅汤

B.使君子散

C.驱蛔承气汤

D.附子理中汤

E.宣白承气汤

47.患者1周前哮喘发作，现哮喘声高气粗，呼吸深长，呼出为快，兼身热口渴，纳呆，便秘，苔黄腻，脉滑数。治疗除取主穴外，还应选用

A.阴陵泉

B.足临泣

C.风门

D.曲池

E.丰隆

48.患者，女，26岁。每至经期出现小腹胀痛拒按，经血量少，血色紫暗有块，块下痛缓，伴有乳房胀痛，舌有瘀点，脉弦。治疗除中极、次髎、地机、三阴交，还应选取

A.太冲、阳陵泉



B.关元、归来

C.太冲、气海

D.太溪、肾俞

E.气海、脾俞

49.患者，女性，47岁。肘关节内下方疼痛2周，肘关节活动时痛甚，压痛明显。本病属于

A.手太阴经筋病

B.手少阴经筋病

C.手阳明经筋病

D.手太阳经筋病

E.手少阳经筋病

50.患者，男，33岁。左眼眵涩疼痛，灼热畏光，热泪频流，胁痛，口苦咽干，小便黄，舌红苔黄，脉弦数。眼部检查：白睛混赤，黑睛生翳，呈树枝状。

A.肝阳上亢

B.肝胆火炽

C.风热客目

D.湿热犯目

E.阴虚夹风

51.患者，眼灼热痒痛，沙涩难睁，眼眵较多，睑内脉络模糊，红赤明显，并见粟样颗粒，赤脉下垂，舌红苔黄，脉数，治疗方用

A.除风清脾饮

B.银翘散

C.归芍红花散



D.普济消毒饮

E.知柏地黄丸

52.患者,男,22岁。活动后突发咽喉肿痛,呼吸困难,痰涎壅盛,咽喉堵塞,言语不清,经休息后不能缓解,故急来就诊。检查见咽喉黏膜呈紫红色,声门区红肿显著,痰涎多,并可见鼻翼煽动,天突、缺盆、肋间及上腹部在吸气时出现凹陷。根据患者表现,其分度为

A. I 度

B. II 度

C. III 度

D. IV 度

E. V 度

53.患者耳痛剧烈,痛引腮脑,耳鸣耳聋,流脓多黄稠,伴发热,口苦咽干,小便黄赤,大便干结,舌质红,苔黄,脉弦数有力。治疗应首选

A.肾气丸

B.蔓荆子散

C.托里消毒散

D.龙胆泻肝汤

E.银翘散

54.患者,男,23岁。跌倒后手掌撑地,肩外展外旋,出现肩痛,肿胀,活动受限。查体:

Dugas 征阳性。其肩部的畸形是

A.屈曲外展、外旋

B.屈曲内收、内旋

C.方肩



D.肩过度后伸

E.肩过度膨隆

55.患者，女，53岁。肩部疼痛反复发作7月，3天前因受寒导致肩痛加重，尤以肩前外部疼痛为甚，诊断为肩关节周围炎，其中医内服选方为

A.三痹汤

B.当归鸡血藤汤

C.羌活胜湿汤

D.羚角钩藤汤

E.大秦艽汤

二、A3/A4 型题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

1.患者，沈某，男，48岁。既往有糖尿病病史5年。经积极治疗这几年来血糖一直保持良好，近几个月来，工作繁忙。服药不规律，导致血糖的控制不稳定，现症见小便频数，混浊如膏，面容憔悴，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒肢冷，舌苔淡白而干，脉沉细无力。

(1) 其辨证分型是

A.肺热伤津证

B.胃热炽盛证

C.气阴亏虚证

D.肾阴亏虚证

E.阴阳两虚证

(2) 其治法是



- A. 滋阴固肾
- B. 温补脾阳止渴
- C. 滋阴补肾益气
- D. 滋阴温阳补肾
- E. 健脾益肾止渴

(3) 其首选方剂是

- A. 消渴方
- B. 七味白术散
- C. 金匱肾气丸
- D. 六味地黄丸
- E. 知柏地黄丸

2. 患者男，42 岁。平素性格急躁，近因工作繁忙，常加班加点，夜深方归。今晨进餐之后，于 7 时突然感到头晕，倒地，挣扎欲起，眼见周围天旋地转，似若房倒地陷，闭目卧地。

耳鸣，头目胀痛，口苦，舌红，苔黄腻，脉弦。

(1) 其辨证分型是

- A. 肝阳上亢证
- B. 气血亏虚证
- C. 肾精不足证
- D. 痰浊中阻证
- E. 瘀血阻窍证

(2) 其治法是

- A. 益气养血，清化痰热



- B.平肝潜阳，清火息风
- C.补肾养阴。益精填髓
- D.化痰祛湿，健脾和胃
- E.瘀血阻络，清化痰热

(3) 其首选方剂为

- A.柴胡疏肝散
- B.天麻钩藤饮
- C.羚角钩藤汤
- D.半夏白术天麻汤
- E.通窍活血汤

3.患者女，41岁。腹胀痛、便秘1个月，患者发病的1个月来，因工作不顺，出现胸肋疼痛，纳呆，暖气频作。用单方小茴香、藿香等煎汤内服后，上症稍减，但时作便秘，每于排便时，腹中胀痛而欲便不得，大便秘结，舌苔薄腻，脉弦。

(1) 其诊断是

- A.便秘
- B.腹痛
- C.腹胀
- D.泄泻
- E.胁痛

(2) 其辨证分型是

- A.热秘
- B.虚秘



C.冷秘

D.气秘

E.阴虚秘

(3) 其治法是

A.顺气导滞

B.泻热通腑

C.温通开秘

D.益气养血润燥

E.滋阴通便

4.患者女，35岁。遍体浮肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，口苦口黏，小便短赤，大便干结，舌红，苔黄腻，脉濡数。

(1) 其辨证分型是

A.湿毒浸淫证

B.风水相搏证

C.水湿浸渍证

D.湿热壅盛证

E.脾阳虚衰证

(2) 其治法是

A.疏风解表，宣肺利水

B.化湿健脾，通阳利水

C.清热利湿，疏理气剂

D.益气健脾利水



E.温补脾肾

(3) 其首选方剂是

A.越婢加术汤

B.疏凿饮子

C.实脾饮

D.五皮饮

E.麻黄连翘赤小豆汤

5.患者朱某，女，28岁。症见入寐困难，胸闷肋胀，急躁易怒，伴头晕头胀，口干口苦，纳差，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。

(1) 该患者辨证为不寐

A.痰热内扰证

B.心胆气虚证

C.阴虚火旺证

D.肝火扰心证

E.心脾两虚证

(2) 其治法是

A.补益心脾，养血安神

B.益气镇惊，安神定志

C.疏肝泻火，镇心安神

D.清心泻火，安神宁心

E.滋阴降火，养心安神

(3) 其治疗应首选的方剂是



A.当归龙荟丸

B.龙胆泻肝汤

C.泻心汤

D.滋水清肝饮

E.礞石滚痰丸

6.患者王某，男，62岁，一周前突然出现心前区剧烈疼痛，状若刀绞，痛时面色苍白，四肢发凉出冷汗，数分钟后缓解。以后反复发作，日约2~3次，受寒易发，但疼痛较轻，含化硝酸甘油后很快缓解。现病人四肢欠温，胸闷，苔薄白，脉沉紧。

(1) 其辨证为胸痹之

A.寒凝心脉

B.心肾阳虚

C.心血瘀阻

D.气滞心胸

E.痰浊闭阻

(2) 治法为

A.益气养阴，活血通脉

B.辛温散寒，宣通心阳

C.活血化瘀，通脉止痛

D.疏肝理气，活血通络

E.温补阳气，振奋心阳

(3) 宜选方剂

A.生脉散合人参养荣汤加减



B.参附汤合右归饮

C.柴胡疏肝散加减

D.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减

E.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤加减

7.患者，男，59岁，近3个月出现进行性吞咽困难加重，体重减轻，伴有胸骨后胀满疼痛，情绪抑郁时加重，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌红，苔薄腻，脉弦滑。

(1) 确诊首选检查为

A.胸部 CT

B.食管造影

C.内镜检查

D.钡剂检查

E.脱落细胞学检查

(2) 中医辨证为

A.痰气交阻证

B.气滞血瘀证

C.津亏热结证

D.痰火瘀毒证

E.胃热阴伤证

(3) 首选方剂为

A.柴胡疏肝散

B.益胃汤

C.启膈散



D.沙参麦冬汤

E.膈下逐瘀汤

8.患者，女，55岁。肝炎病史8余年，近3个月来出现右侧季肋部持续胀痛，伴食欲减退、乏力、腹胀。查体：右侧肋缘下可触及肿大的肝脏，质地坚硬，边缘不规则。AFP > 1000μg/L。

(1) 首先考虑的疾病是

A.肝硬化

B.慢性肝炎活动期

C.原发性肝癌

D.细菌性肝脓肿

E.肝脏阿米巴

(2) 有确诊意义的检查是

A.肝功能检查

B.CT

C.MRI

D.肝穿刺活检

E.触诊

(3) 治疗应首选

A.肝切除术

B.放射治疗

C.介入性治疗

D.生物治疗



正保医学教育网

www.med66.com



E.抗病毒治疗

9.患者半年前大面积烧伤，现肩胛部褥疮溃烂，腐肉及脓水较多，四周漫肿，伴有发热，口苦且干，形神萎靡，不思饮食。舌质红，舌苔少，脉细数。

(1) 其辨证为

A.风热毒蕴证

B.气滞血瘀证

C.湿热毒蕴证

D.蕴毒腐溃证

E.气血两虚证

(2) 其治法为

A.清热解毒，消肿止痛

B.和营清热，透脓托毒

C.大补气血，托毒生肌

D.理气活血，疏通经络

E.益气养阴，利湿托毒

(3) 治疗应首选的方剂是

A.血府逐瘀汤

B.透脓散合萆薢渗湿汤

C.普济消毒饮

D.托里消毒散

E.黄连解毒汤

10.患者，女，50岁。近半年月经紊乱，无规律，经量时多时少，并伴有头晕耳鸣，五心烦



热，腰酸乏力，时而畏寒恶风，时而潮热汗出，舌淡，苔薄，脉沉细。

(1) 该患者应诊断为

- A.崩漏
- B.经行头痛
- C.经行身痛
- D.绝经前后诸证
- E.月经先后无定期

(2) 患者应辨证为

- A.肾阴虚证
- B.肾阳虚证
- C.心肾不交证
- D.肝肾阴虚证
- E.肾阴阳两虚证

(3) 治疗应首选的方剂是

- A.左归丸合二至丸
- B.右归丸合二至丸
- C.二仙汤合二至丸
- D.天王补心丹
- E.杞菊地黄丸

11.患者，女，31岁，已婚。平素月经规律，既往孕2产0，现停经45天，妊娠试验阳性。

1天前患者出现少量阴道出血，色淡暗，伴腹痛下坠，腰酸，头晕耳鸣，舌淡苔白，脉沉细滑。



(1) 最可能的诊断是

- A.胎漏
- B.滑胎
- C.堕胎
- D.妊娠腹痛
- E.胎动不安

(2) 该患者的治法是

- A.补肾固冲，益气安胎
- B.清热凉血，养血安胎
- C.活血化瘀，补肾安胎
- D.益气固脱，活血祛瘀
- E.补气养血，固肾安胎

(3) 治疗应首选的方剂是

- A.胎元饮
- B.当归散
- C.安奠二天汤
- D.桂枝茯苓丸
- E.加减一阴煎

12.患儿，7岁。阵发性腹部绞痛，发时疼痛较剧，弯腰曲背，辗转不宁，肢冷汗出，伴恶心，呕吐胆汁，既往曾有呕吐蛔虫史。舌苔黄腻，脉滑数。

(1) 其辨证为

- A.蛔厥证



B.虫瘕证

C.肠虫证

D.虫扰魄门证

E.脾虚虫扰证

(2) 其治法为

A.安蛔定痛，继之驱虫

B.通腑散结，驱蛔下虫

C.驱蛔杀虫，调理脾胃

D.杀虫止痒，结合外治

E.温补中阳，杀虫止痛

(3) 治疗应首选的方剂是

A.使君子散

B.加味温胆汤

C.丁萸理中汤

D.乌梅丸

E.定吐丸

13.患者，男性，36岁，双下肢痿软无力5年余，反反复复，逐渐加重痿软不用，肌肉萎缩，腰膝酸软，头晕耳鸣，舌红绛，少苔，脉细数。

(1) 其辨证是

A.脾胃虚弱证

B.肝肾亏虚证

C.脉络瘀阻证



D.肺热津伤证

E.湿热浸淫证

(2) 治疗应选取的主穴是

A.肩髃、曲池、外关、合谷

B.肩髃、风池、外关、合谷

C.髀关、伏兔、足三里、阳陵泉、三阴交

D.阳陵泉、三阴交、外关、合谷

E.髀关、伏兔、足三里、脾俞、胃俞

(3) 治疗除取主穴外，应加用的腧穴是

A.太白、中脘、关元

B.阴陵泉、大椎、内庭

C.尺泽、肺俞、二间

D.太溪、肝俞、肾俞

E.脾俞、血海、气海

14.患者，男，29岁。左眼灼热疼痛，热泪如汤，胞睑红肿，白睛红赤肿痛，弥漫溢血，黑睛星翳，口渴心烦，便秘溲赤，舌红，苔黄，脉数。

(1) 治宜

A.疏风散邪，兼以清热

B.泻火解毒

C.清肝泻火，退翳明目

D.清热凉血，解毒散邪

E.滋阴清热，散邪明目



(2) 治疗宜选用

- A. 驱风散热饮子
- B. 泻肺饮
- C. 凉膈连翘散
- D. 普济消毒饮
- E. 养阴清肺汤

15. 患者男，12 岁。外出旅游回家后出现咽喉肿痛，呼吸困难，喉间痰涎壅盛，咽喉堵塞，言语不清，伴见恶风发热，头痛，舌质红，苔黄厚，脉数。检查见咽喉黏膜呈鲜红色，声门区红肿显著。

(1) 该患者应诊断为

- A. 喉痹
- B. 喉暗
- C. 白喉
- D. 喉疔
- E. 急喉风

(2) 应辨证为

- A. 痰凝血瘀，结聚咽喉
- B. 肺肾阴虚，虚火上炎
- C. 风热外袭，热毒内困
- D. 热毒熏蒸，痰热壅结
- E. 肺胃热盛，上攻咽喉

16. 患者，男，28 岁。摔倒后致左肩关节脱位，X 线片未见合并骨折征象。



(1) 首先应采取的治疗措施是


- A. 局麻后手法复位
- B. 局麻后切开复位
- C. 全麻后手法复位
- D. 切开复位后同时修复关节囊
- E. 骨牵引后行外展架固定

(2) 属于复位成功标志的是

- A. 方肩消失
- B. 疼痛减轻，可做轻微活动
- C. 肩胛孟处有空虚感
- D. 弹性固定消失
- E. X 线片显示肱骨头与关节孟轻度错位

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题





《基础知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 A

【答案解析】 六淫之中，风邪、暑邪、火（热）邪属阳；寒邪、湿邪属阴。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 阴阳偏胜的治疗原则：阴阳偏胜为邪气盛的实证，故治疗应“泻其有余”（实者泻之）。

3. 【正确答案】 B

【答案解析】 肺主肃降主要体现在以下三个方面：一是吸入自然界之清气，并将吸入之清气与谷气相融合而成的宗气向下布散至脐下，以资元气；二是将脾转输至肺的津液及部分水谷精微向下向内布散于其他脏腑以濡润之；三是将脏腑代谢后产生的浊液下输于肾或膀胱，成为尿液生成之源。

4. 【正确答案】 C

【答案解析】 泌别清浊，是指小肠中的食糜在作进一步消化的过程中，随之分为清浊两部分。

5. 【正确答案】 A

【答案解析】 卫气来源于脾胃运化的水谷精微。由水谷精气中的剽悍滑利部分所化生。

6. 【正确答案】 C

【答案解析】 正气不足是疾病发生的内在因素：正气在发病中的主导作用主要体现在：正虚感邪而发病；正虚生邪而发病；正气的强弱可决定发病的证候性质。人体正气旺盛，气血充盈，卫外固密，病邪难于侵入，疾病无从发生，《素问·刺法论》说：“正气存内，邪不可干。”

7. 【正确答案】 C



【答案解析】气逆，指气机升降失常，或气升之太过，或降之不及，脏腑之气逆上的病理状态。

8. 【正确答案】 C

【答案解析】真虚假实，指病机的本质为“虚”，但表现出“实”的临床假象。一般是由于正气虚弱，脏腑经络之气不足，推动、激发功能减退所致。临床常见脾气虚弱，运化无力，可见纳食减少、疲乏无力、舌胖嫩而苔润、脉虚而细弱等正气不足的症状；同时又可见腹胀满（但时有和缓轻减）、腹痛（但喜按）等假实之症。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】实证临床常见有精神亢奋，或壮热狂躁，或烦躁不宁，或疼痛拒按，或声高气粗，二便不通，脉实有力等症；或表现为痰涎壅盛、食积不化、水湿泛滥、气滞血瘀等病变。

10. 【正确答案】 D

【答案解析】正治，是逆其证候性质而治的一种常用治疗法则，又称逆治。逆，是指采用方药的性质与疾病的性质相反。如辨明疾病的寒热虚实，分别采用“寒者热之”“热者寒之”“虚则补之”“实则泻之”等不同方法去治疗，即为正治。正治，适用于疾病的征象与本质相一致的病证。

11. 【正确答案】 B

【答案解析】五行相生关系：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。水可生木，水为木之母，木为水之子。所以选 B。

12. 【正确答案】 E

【答案解析】上、中、下三焦各自的生理特点：

(1) 上焦如雾：上焦主气的宣发和升散。因此，将上焦的生理特点概括为“如雾”，是指宣发卫气、敷布精微的作用，若雾露之溉。



(2) 中焦如沤：中焦具有消化、吸收并输布水谷精微和化生血液的功能。将中焦的生理特点概括为“如沤”，是指中焦运化水谷、消化饮食、化生气血的作用。

(3) 下焦如渎：下焦的功能主要是排泄糟粕和尿液。将下焦的生理特点概括为“如渎”，是指下焦具有与二便生成和排泄相关的功能。

13. 【正确答案】 B

【答案解析】宗气的生理功能：宗气的生理功能主要有行呼吸、行血气和资先天三个方面。

14. 【正确答案】 E

【答案解析】手太阴肺经与手阳明大肠经相表里，手厥阴心包经与手少阳三焦经相表里，手少阴心经与手太阳小肠经相表里；足太阴脾经与足阳明胃经相表里，足厥阴肝经与足少阳胆经相表里，足少阴肾经与足太阳膀胱经相表里。

15. 【正确答案】 C

【答案解析】燥性干涩，易伤津液；火热易伤津耗气；暑性升散，伤津耗气。

16. 【正确答案】 D

【答案解析】疠气的致病特点有发病急骤，病情危笃；传染性强，易于流行；一气一病，症状相似这三个特点。六淫邪气共同的致病特点是：1.外感性；2.地域性；3.季节性；4.相兼性。二者主要区别在于疠气具有强烈的传染性。

17. 【正确答案】 C

【答案解析】全科医疗应以健康为中心，因此 C 选项的说法是错误的。

18. 【正确答案】 D

【答案解析】全科医学，又称家庭医学，是一个面向社区与家庭，整合临床医学、预防医学、康复医学以及人文社会学科相关内容于一体的综合性医学专业学科，是一个临床二级学科。

19. 【正确答案】 D



【答案解析】常用的评估类型主要有：①客观评估；②主观评估；③分析评估；④工具评估。

20.【正确答案】D

【答案解析】二级预防目的是做到早期发现，早期诊断，早期治疗，从而使疾病能够及早治愈而不致加重和发展。常用的服务措施包括：①筛检；②周期性健康检查；③高危人群重点健康项目检查；④自我检查等。

21.【正确答案】C

【答案解析】医患沟通的途径：①情感沟通；②诊疗沟通；③效果沟通；④随访沟通。

22.【正确答案】A

【答案解析】第一级预防即病因预防或根本性预防，是在疾病尚未发生时针对病因采取的预防措施，是预防控制和消灭疾病的根本措施。

23.【正确答案】D

【答案解析】社区卫生提供的全方位服务包括：人格化服务，综合性服务，连续性服务，协调性服务和可及性服务。

24.【正确答案】B

【答案解析】水俣病：20 世纪 50 年代发生于日本熊本县水俣湾水域的公害病。其发病原因是：随工厂废水进入水体的汞被水或底泥中的微生物转化成甲基汞，由于长期摄入富含甲基汞的鱼、贝类，甲基汞通过水生食物链进入动物和人类体内，在胃酸作用下形成氯化甲基汞，随血流到达靶器官——脑，透过血脑屏障，侵害大、小脑，损害感觉和运动区，尤其是视、听觉。

25.【正确答案】E

【答案解析】健康教育规划的评价包括：形成评价；过程评价；效果评价和结局评价。

26.【正确答案】B



【答案解析】二级预防：二级预防旨在限制或逆转由损伤造成的伤残。即在损伤及疾病发生后，早期发现、早期治疗，以减少残疾的发生。

27. 【正确答案】 C

【答案解析】结合我国社区卫生服务的特点和需要，社区健康管理可按以下四种具体模式进行：一般人群管理；高危人群管理；现患人群的管理；残疾人和精神疾病患者的管理。

28. 【正确答案】 D

【答案解析】相对危险度：又称率比，是暴露组发病率（或死亡率）与对照组发病率（或死亡率）的比值。RR 表示暴露组发病或死亡是非暴露组的倍数，说明暴露因素存在时发病或死亡风险是暴露因素不存在时的倍数关系。

29. 【正确答案】 E

【答案解析】累积发病率：某一固定人群在一定时期内某病新发生例数与时期开始总人数之比。

30. 【正确答案】 C

【答案解析】道地药材包括：甘肃的当归，宁夏的枸杞，青海的大黄，内蒙的黄芪，东北的人参、细辛、五味子，山西的党参，河南的地黄、牛膝、山药、菊花，云南的三七、茯苓，四川的黄连、川芎、贝母、乌头，山东的阿胶，浙江的贝母，江苏的薄荷，广东的陈皮、砂仁等。

31. 【正确答案】 D

【答案解析】乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白及、白蔹；甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；藜芦反人参、丹参、玄参、沙参、细辛、芍药。

32. 【正确答案】 D

【答案解析】羌活功效：解表散寒，祛风胜湿，止痛。



应用：（1）风寒感冒。（2）风寒湿痹。治上半身风寒湿痹、肩背肢节疼痛者尤为多用。

33.【正确答案】B

【答案解析】栀子功效：泻火除烦，清热利湿，凉血解毒。焦栀子：凉血止血。

34.【正确答案】B

【答案解析】大黄功效：泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经，清利湿热。

芒硝功效：泻下攻积，润燥软坚，清热消肿。

番泻叶功效：泻下通便，行水消胀。

芫花功效：泻水逐饮，祛痰止咳，杀虫疗疮。

知母功效：清热泻火，生津润燥。

35.【正确答案】D

【答案解析】蕲蛇主治：（1）风湿顽痹，中风半身不遂。（2）小儿惊风，破伤风。（3）

麻风、疥癣。（4）瘰疬，梅毒，恶疮。

36.【正确答案】A

【答案解析】藿香功效：化湿，止呕，解暑。

佩兰功效：化湿，解暑。

所以此题最佳的选项是 A。

37.【正确答案】A

【答案解析】薏苡仁功效：利水渗湿，健脾，除痹，清热排脓。

38.【正确答案】B

【答案解析】干姜功效：温中散寒，回阳通脉，温肺化饮。

39.【正确答案】A

【答案解析】枳实功效：破气除痞，化痰消积。



40.【正确答案】B

【答案解析】鸡内金用法：煎服。研末服。研末服效果比煎服好。

41.【正确答案】B

【答案解析】地榆治疗烫伤、湿疹、疮疡痈肿。为治水火烫伤之要药。

大黄治烧烫伤，可单用粉，或配地榆粉，用麻油调敷患处。

虎杖治水火烫伤，痈肿疮毒，毒蛇咬伤。本品入血分，有凉血清热解毒作用。

42.【正确答案】A

【答案解析】天南星功效：燥湿化痰，祛风解痉；外用散结消肿。

43.【正确答案】B

【答案解析】代赭石

功效：平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。

应用：（1）肝阳上亢，头晕目眩。（2）呕吐、呃逆、噎气等证。为重镇降逆要药。（3）

气逆喘息。（4）血热吐衄、崩漏。

44.【正确答案】E

【答案解析】黄芪功效：健脾补中，升阳举陷，益卫固表，利尿，托毒生肌。

45.【正确答案】B

【答案解析】硫黄主治病证：外用治疥癣，湿疹，阴疽疮疡；内服治阳痿，虚喘冷哮，虚寒便秘。

46.【正确答案】A

【答案解析】反佐，即根据病情需要，用与君药性味相反而又能起相成作用的药物。佐药的药力小于臣药，一般用量较轻。“热药冷服，寒药热服”属于反佐的范畴，正常情况下是“热药热服，寒药冷服”。当患者拒药时，采用“热药冷服，寒药热服”。



47. 【正确答案】 B

【答案解析】小青龙汤中细辛与干姜同为臣药，起温肺化饮，兼助麻、桂解表祛邪之用。

48. 【正确答案】 E

【答案解析】桂枝汤的功用是解肌发表，调和营卫。

49. 【正确答案】 B

【答案解析】四逆散病证，因外邪传经入里，气机为之郁遏不疏，阳气内郁，不能达于四末。

50. 【正确答案】 A

【答案解析】清营汤组成：犀角（水牛角代）、生地黄、玄参、竹叶心、麦冬、丹参、黄连、银花、连翘。

方歌：清营汤治热传营，身热夜甚神不宁，角地银翘玄连竹，丹麦清热更护阴。

51. 【正确答案】 D

【答案解析】青蒿鳖甲汤养阴透热，主治热病后期，邪伏阴分证。

52. 【正确答案】 B

【答案解析】清暑益气汤中荷梗助西瓜翠衣清热解暑；石斛、麦冬助西洋参养阴生津。三药共为臣药。

53. 【正确答案】 A

【答案解析】当归补血汤主治血虚发热证。方中重用黄芪（五倍于当归），一为大补脾肺之气，使气旺血生，即“有形之血不能速生，无形之气所当急固”；二则固护肌表，摄纳浮阳。

54. 【正确答案】 C

【答案解析】固涩剂的适用范围：固涩剂适用于气、血、精、津液耗散滑脱之证，症见自汗、盗汗、久咳不止、久泻久痢、遗精滑泄、小便失禁，以及崩漏带下等。固涩剂的应用注意事项：固涩剂多适宜于正虚无邪者。凡外邪未去，里实尚存者，均应慎用，以免“闭门留寇”，



转生他变。

55.【正确答案】A

【答案解析】天王补心丹证由心肾两亏，阴虚血少，虚火内扰所致，治宜滋阴清热、养血安神。茯苓甘、淡、平，归心脾肾经，可利水渗湿、健脾、宁心，用于此处配伍主要是养心安神之用。

56.【正确答案】B

【答案解析】苏子降气汤中，肉桂辛甘大热，温肾，纳气平喘，以治下虚，同时配合当归增强温养下元之效。

57.【正确答案】A

【答案解析】补阳还五汤方中重用生黄芪四两，补益元气，意在气旺则血行，瘀去而络通，为君药。

58.【正确答案】D

【答案解析】大秦苻汤功用：疏风清热，养血活血。

59.【正确答案】C

【答案解析】桑杏汤功用：清宣温燥，润肺止咳。主治外感温燥证。

60.【正确答案】A

【答案解析】二陈汤的功用是燥湿化痰，理气和中。主治湿痰证。

61.【正确答案】C

【答案解析】保和丸方中莱菔子下气消食，长于消谷面之积，为臣药。

62.【正确答案】D

【答案解析】健脾丸组成：白术、木香、黄连、甘草、茯苓、人参、神曲、陈皮、砂仁、麦芽、山楂、山药、肉豆蔻。



二、B 型题

1. (1) 【正确答案】A

【答案解析】根据相生关系来确定治疗原则，可以概括为补母和泻子，即《难经》所谓的“虚者补其母，实者泻其子”。补母，即是针对具有母子关系的虚证而治，如肝虚补肾，因为肾为肝之母，所以补肾水可以生肝木。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】根据相克关系来确定治疗原则，可以概括为抑强和扶弱，即泻其克者之强，补其被克者之弱。如肝木太过而乘脾土，肝木太过为强，必须泻之，所以应该选用抑强。

2. (1) 【正确答案】A

【答案解析】宗气的生成：宗气的生成有两个来源，一是脾胃运化的水谷之精所化生的水谷之气，一是肺从自然界中吸入的清气，两者相结合生成宗气。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】元气主要由肾藏的先天之精而化生，又依赖脾胃化生的水谷之精的充养。

3. (1) 【正确答案】D

【答案解析】肝在体合筋，其华在爪。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】肺在体合皮，其华在毛。

4. (1) 【正确答案】A

【答案解析】风性善行而数变：“善行”，指风性善动不居，游移不定。其致病具有病位游移、行无定处的特征。“数变”，指风邪致病变幻无常，发病迅速。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】湿性黏滞，体现在两个方面：一是症状的粘滞性。二是病程的缠绵性。因湿性



黏滞，易阻气机，气不行则湿不化，胶着难解，故湿邪为病，起病隐缓，病程较长，反复发作，或缠绵难愈。

5. (1) 【正确答案】A

【答案解析】血虚，指血液不足，濡养功能减退，以致脏腑百脉、形体器官失养的病理状态。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】血瘀，指血液循行迟缓，或流行不畅，甚则血液瘀结停滞成积的病理状态。

6. (1) 【正确答案】D

【答案解析】中医健康教育：在社区居民中，开展多种形式的中医药预防、养生保健和心理咨询等活动、宣传中医药养生保健、防病治病知识，推广使用有中医药特色的健康处方，指导补益类中药的正确使用方法，引导健康投资。特别是指导老年人、妇女、亚健康等重点人群开展养生保健，充分发挥中医药在老年病、慢性病、康复等方面的优势。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】中医养生保健是中医学中独特的保健方法，受到历代医家的重视和推广。

7. (1) 【正确答案】B

【答案解析】过程评价：是规划实施过程中监测规划各项工作的进展，了解并保证规划的各项活动能否按规划的程序发展。过程评价的主要指标：信息覆盖率、居民培训率、居民对活动参与率等。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】效果评价：又称近中期效果评价。它评价影响行为的三类因素（倾向、促成、强化因素）的变化和目标人群健康相关行为的变化，政策、法规制定情况，领导及关键人物的思想观念是否得到转变，是否制定有利于健康的政策、法律，行政对健康教育的干预程度、效果。效果评价的主要指标：居民和重点人群慢性病防治知识的知晓率；重点人群对血糖、



血压的监测水平；增加慢性病人运动参与水平；增加慢性病人不合理饮食控制率；行为指标，如饮食习惯、居民锻炼情况、吸烟率、酗酒率及吸食违禁药品情况。

8. (1) 【正确答案】A

【答案解析】苦：“能泄、能燥、能坚”，即具有清泄火热、泄降气逆、通泻大便、燥湿、坚阴（泻火存阴）等作用。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】咸：“能下、能软”，即具有泻下通便、软坚散结的作用。

9. (1) 【正确答案】A

【答案解析】由于年龄、体质的不同，对药物耐受程度不同，则药物用量也就有了差别。一般 5 岁以下的小儿用成人药量的 1/4，5 岁以上的儿童按成人用量减半服用。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】由于年龄、体质的不同，对药物耐受程度不同，则药物用量也就有了差别。一般 5 岁以下的小儿用成人药量的 1/4，5 岁以上的儿童按成人用量减半服用。

10. (1) 【正确答案】C

【答案解析】使君子主治病证：蛔虫病，蛲虫病；小儿疳积。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】苦楝皮主治病证：蛔虫病，蛲虫病，钩虫病；疥癣，湿疮。

11. (1) 【正确答案】B

【答案解析】桃仁的功效：活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】益母草的功效：活血调经，利尿消肿，清热解毒。

12. (1) 【正确答案】D



【答案解析】酸枣仁功效：养心益肝，安神，敛汗，生津。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】远志功效：宁心安神，祛痰开窍，消散痈肿。

13. (1) 【正确答案】A

【答案解析】五味子功效：收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】乌梅功效：敛肺止咳，涩肠止泻，安蛔止痛，生津止渴，消疮毒，炒炭固冲止漏。

14. (1) 【正确答案】A

【答案解析】小青龙汤主治外寒内饮证，麻黄、桂枝二者相须为君，发汗散寒解表邪。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】小青龙汤中干姜、细辛共为臣药，温肺化饮，兼助麻、桂解表祛邪。

15. (1) 【正确答案】D

【答案解析】逍遥散的功用是疏肝解郁，养血健脾。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】四逆散的功用是透邪解郁，疏肝理脾。

16. (1) 【正确答案】E

【答案解析】补中益气汤的组成是黄芪、炙甘草、人参、当归、橘皮、升麻、柴胡、白术。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】逍遥散的组成是炙甘草、当归、茯苓、白芍、白术、柴胡、烧生姜、薄荷。

17. (1) 【正确答案】C

【答案解析】旋覆代赭汤组成：旋覆花、人参、生姜、代赭石、甘草、半夏、大枣。



(2) 【正确答案】C

【答案解析】苏子降气汤组成：紫苏子、半夏、川当归、甘草、前胡、厚朴、肉桂、生姜、枣子、苏叶。

18. (1) 【正确答案】A

【答案解析】消风散功用：疏风除湿，清热养血，主治风疹、湿疹。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】地黄饮子功用：滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。主治：下元虚衰，痰浊上泛之暗哑证。

19. (1) 【正确答案】C

【答案解析】本证考虑湿热淋证，宜选用八正散清热泻火，利水通淋。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】本证考虑热结下焦之血淋。宜选用小蓟饮子凉血止血，利水通淋。

正保医学教育网

www.med66.com



《相关专业知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 A

【答案解析】气虚发热：长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症。

气郁发热：每因情志不舒而时有微热，兼胸闷、急躁易怒等症。

血虚发热：时有低热，兼面白、头晕、舌淡脉细等症。

阴虚发热：长期低热，兼颧红、五心烦热等症。

小儿夏季热：小儿在夏季气候炎热时长期发热不已，兼见烦躁、口渴、无汗、多尿等症，至秋凉时不治自愈，是由于小儿气阴不足，不能适应夏令炎热气候所致。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】清醒时经常汗出不止，活动后尤甚，称为自汗。常伴有神疲乏力、气短懒言或畏寒肢冷等症状。

3. 【正确答案】 B

【答案解析】目痛的临床表现及意义：

(1) 目痛而赤，属肝火上炎。

(2) 目赤肿痛，羞明多眵，多属风热。

(3) 目痛较剧，伴头痛，恶心呕吐，瞳孔散大，多是青光眼。

(4) 目隐隐痛，时作时止，多为阴虚火旺。

4. 【正确答案】 E

【答案解析】神乱是指神志错乱失常。临床常表现为焦虑恐惧、狂躁不安、淡漠痴呆和猝然昏倒等，多见于癫、狂、痴、痫、脏躁等患者。选项 E 是假神患者的表现，故根据题干要求，此题的正确选项为 E。



5.【正确答案】D

【答案解析】疹：指皮肤出现红色或紫红色、粟粒状疹点，高出皮肤，抚之碍手，压之褪色的症状。常见于麻疹、风疹、隐疹等病，也可见于温热病中。多因外感风热时邪，或过敏，或热入营血所致。

6.【正确答案】E

【答案解析】齿痕舌多主脾虚、水湿内停证。齿痕舌多因舌体胖大而受齿缘压迫所致，故常与胖大舌同见。

7.【正确答案】B

【答案解析】类剥舌：剥脱处并不光滑，似有新生颗粒。

花剥苔：舌苔剥落不全，剥脱处光滑无苔，余处斑斑驳驳地残存舌苔，界限明显。

地图舌：舌苔不规则地大片脱落，边缘厚苔界限清楚，形似地图。

根剥苔：舌根部分苔剥脱。

鸡心苔：舌苔周围剥脱，仅留中心一小块。

8.【正确答案】B

【答案解析】咳声重浊沉闷，多属实证，是寒痰湿浊停聚于肺，肺失肃降所致。

9.【正确答案】B

【答案解析】滑脉：往来流利，应指圆滑，如盘走珠。

10.【正确答案】A

【答案解析】气逆证以咳喘或呕吐、呃逆等为突出表现。

11.【正确答案】C

【答案解析】痰蒙心神证的临床表现：神情痴呆，意识模糊，甚则昏不知人，或神情抑郁，表情淡漠，喃喃独语，举止失常；或突然昏仆，不省人事，口吐涎沫，喉有痰声；并见面色



晦暗，胸闷，呕恶，舌苔白腻，脉滑等症。本证以神志抑郁、错乱、痴呆、昏迷与痰浊症状
共见为辨证的主要依据。

12. 【正确答案】 E

【答案解析】脾不统血证临床表现：各种慢性出血，如便血、尿血、吐血、鼻衄、紫斑，妇
女月经过多、崩漏，食少便溏，神疲乏力，气短懒言，面色萎黄，舌淡，脉细无力。故根据
题干要求，最佳的选项是 E。

13. 【正确答案】 D

【答案解析】肝阳化风证性质属上实下虚证；热极生风证性质属实热证；阴虚动风证和血虚
生风证性质均属虚证。

14. 【正确答案】 E

【答案解析】肾虚水泛证的临床表现：腰膝酸软，耳鸣，身体浮肿，腰以下尤甚，按之没指，
小便短少，畏冷肢凉，腹部胀满，或见心悸，气短，咳喘痰鸣，舌质淡胖，苔白滑，脉沉迟
无力。本证以水肿下肢为甚、尿少、畏冷肢凉等为辨证的主要依据。选项 E 属于肾阴虚证的
临床表现，故根据题干所问，此题的正确选项为 E。

15. 【正确答案】 D

【答案解析】太阳蓄血证的辨证要点：本证以少腹急结、小便自利、大便色黑等为辨证依据。

16. 【正确答案】 C

【答案解析】伤寒病不经过传变，两经或三经同时出现的病证，称为“合病”。如太阳阳明
合病、太阳太阴合病等。

17. 【正确答案】 C

【答案解析】往来寒热、胸胁苦满、神情默默、不欲饮食、心烦喜呕、脉弦属半表半里证。

18. 【正确答案】 E



【答案解析】心肝血虚证的临床表现：心悸心慌，多梦健忘，头晕目眩，视物模糊，肢体麻木、震颤，女子月经量少、色淡，甚则经闭，面白无华，爪甲不荣，舌质淡白，脉细。本证以心悸、多梦、眩晕、肢麻等与血虚症状共见为辨证的主要依据。选项 E 可见于心肺气虚证、脾肺气虚证，故根据题干所问，正确的选项是 E。

19. 【正确答案】 B

【答案解析】非感染性发热的病因有：（1）无菌性坏死物质吸收；（2）抗原-抗体反应；（3）内分泌与代谢障碍；（4）皮肤散热减少；（5）体温调节中枢功能失常；（6）自主神经功能紊乱。

20. 【正确答案】 A

【答案解析】非化脓性肋软骨炎多侵犯第 1、2 肋软骨。

21. 【正确答案】 E

【答案解析】个人史包括出生地及居住地区，职业和工作条件，习惯与嗜好，冶游史等。

22. 【正确答案】 D

【答案解析】语颤增强见于以下几种情况：（1）肺实变：见于肺炎链球菌肺炎、肺梗死、肺结核、肺脓肿及肺癌等。（2）压迫性肺不张：见于胸腔积液上方受压而萎瘪的肺组织及受肿瘤压迫的肺组织。（3）较浅而大的肺空洞：见于肺结核、肺脓肿、肺肿瘤所致的空洞。

23. 【正确答案】 A

【答案解析】心包积液：坐位时心脏浊音界呈三角烧瓶形，卧位时心底部浊音界增宽。

24. 【正确答案】 A

【答案解析】中性粒细胞减少：中性粒细胞绝对值 $< 1.5 \times 10^9/L$ 称为粒细胞减少症， $< 0.5 \times 10^9/L$ 称为粒细胞缺乏症。病理性减少见于：（1）感染：病毒感染最为常见，如流行性感冒、病毒性肝炎、麻疹、风疹、水痘等；某些革兰阴性杆菌感染，如伤寒及副伤寒等；某



些原虫感染，如恙虫病、疟疾等。(2) 血液病：如再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症等。(3) 自身免疫性疾病：如系统性红斑狼疮等。(4) 脾功能亢进：如肝硬化等。(5) 药物及理化因素损伤：物理因素，如 X 线、 γ 射线、放射性核素等；化学物质，如苯、铅、汞等；化学药物，如氯霉素、磺胺类药、抗肿瘤药、降糖药及抗甲状腺药物等。

25. 【正确答案】 B

【答案解析】当肾小球滤过功能下降至正常人的 $1/3$ 时，血肌酐 (Cr) 才明显升高。

26. 【正确答案】 B

【答案解析】AMI 发病后 $0.5 \sim 2$ 小时 Mb 开始升高。

27. 【正确答案】 E

【答案解析】房性期前收缩的心电图表现：

(1) 提早出现的房性 P' ，形态与窦性 P 波不同。

(2) P' -R 间期 $\geq 0.12s$ 。

(3) 房性 P' 波后有正常形态的 QRS 波群。

(4) 代偿间歇不完全。

28. 【正确答案】 D

【答案解析】典型心绞痛的心电图表现：面对缺血区的导联上出现 S-T 段水平型或下垂型下移 $\geq 0.1mV$ ，T 波低平、双向或倒置，时间一般小于 15 分钟。

29. 【正确答案】 B

【答案解析】原发性肺结核：表现为原发综合征及胸内淋巴结结核。①原发综合征：是由肺内原发灶、淋巴管炎及淋巴结炎三者组成的哑铃状双极现象。②胸内淋巴结结核：表现为肺门和（或）纵隔淋巴结肿大突向肺野。

30. 【正确答案】 B



【答案解析】食管静脉曲张：X 线钡剂造影可见食管中、下段的黏膜皱襞明显增宽、迂曲，呈蚯蚓状或串珠状充盈缺损，管壁边缘呈锯齿状。

31. 【正确答案】 C

【答案解析】肝脏质地分级：分为质软、质韧（中等硬度）和质硬三级。正常肝脏质地柔软，如触口唇；急性肝炎及脂肪肝时质地稍韧；慢性肝炎质韧，如触鼻尖；肝硬化质硬，肝癌质地最硬，如触前额。

32. 【正确答案】 C

【答案解析】桶状胸：胸廓前后径增大，与横径几乎相等，外观呈圆桶形，见于肺气肿、支气管哮喘发作时，亦见于部分老年人及矮胖体型者。

33. 【正确答案】 D

【答案解析】毛细血管脆性增加见于：①毛细血管壁异常：如遗传性出血性毛细血管扩张症、过敏性紫癜、单纯性紫癜及维生素 C 缺乏症；中毒性损害，如败血症、感染性心内膜炎、尿毒症、砷中毒。②血小板量与质异常：如原发性或继发性血小板减少性紫癜、血小板无力症。③血管性血友病等。

34. 【正确答案】 A

【答案解析】二尖瓣狭窄心尖搏动略向左移。

35. 【正确答案】 E

【答案解析】养生的康复观念包括天人相应、形神合一、动静互涵、协调平衡、正气为本。

36. 【正确答案】 A

【答案解析】饮食保健：饮食有节，适量定时；合理搭配，切忌偏食；顾护脾胃，寒温适度；饮食宜忌，趋利避害。

37. 【正确答案】 D



【答案解析】Schuell 刺激法：是语言治疗中最常用的方法，通过反复的语言刺激促进脑内语言模式的组织、储存和提取。

38. 【正确答案】 B

【答案解析】老年性痴呆辨证分型包括肾虚髓减型、心肝阴虚型、痰浊阻窍型、心脾两虚型、气滞血瘀型。

39. 【正确答案】 C

【答案解析】抗心肌缺血药物是冠心病药物治疗的基础，主要包括硝酸酯类、 β 受体阻滞剂和钙通道阻滞药 3 大类。

40. 【正确答案】 E

【答案解析】截瘫康复适应证：当脊髓急性损伤后的特异性治疗如脊柱复位、固定、手术解除压迫等已经结束，无心力衰竭、呼吸衰竭、肾功能衰竭等严重的并发症，但见下肢功能部分或完全丧失，且伴有下半身感觉障碍，二便排泄功能失常等，应尽早介入康复治疗。重点在于恢复日常生活能力和预防继发性残损。

41. 【正确答案】 E

【答案解析】中医对亚健康状态的调节，应遵循四大原则：心理调适、饮食调养、运动锻炼、药物干预。

42. 【正确答案】 B

【答案解析】传染病常见的症状和体征：发热、发疹、毒血症、单核-巨噬细胞系统反应等。

43. 【正确答案】 A

【答案解析】严重急性呼吸综合征（SARS）属于中医学“瘟疫”、“热病”的范畴。

44. 【正确答案】 C

【答案解析】伤寒骨髓培养：阳性率比血培养高。对病程较长，已经应用抗菌素或血培养阴



性的疑似病例尤为适用。

45.【正确答案】C

【答案解析】肾综合征出血热于病程 3~7 天发生低血压休克，又称为原发性休克。

46.【正确答案】D

【答案解析】抗-HAVIgM 是甲型肝炎近期感染的标志，有早期诊断价值。

47.【正确答案】E

【答案解析】对颅内压明显增高的患者，腰穿时要注意防止发生脑疝。

48.【正确答案】A

【答案解析】偏执性精神障碍又称妄想型精神障碍，是一组以系统妄想为主要症状，而病因不明的精神障碍，可有或无幻觉，若有幻觉则历时短暂且不突出。

49.【正确答案】D

【答案解析】思维形式障碍：表现为思维不连贯、思维破裂、思维散漫、思维中断、思维云集、赘述、思维奔逸、思维迟缓、思维贫乏、象征性思维、持续言语、重复言语、刻板言语和模仿言语。

50.【正确答案】E

【答案解析】抗精神病药物急性不良反应的应急处置

恶性综合征：立即停用抗精神病药，给予支持性治疗。可以使用肌肉松弛剂硝苯咪海因和多巴胺激动剂溴隐亭等治疗。

51.【正确答案】E

【答案解析】心身疾病有以下主要特征：主要是由心理-社会因素刺激，通过情绪和人格特征等作用而发病；必须具有躯体症状和与症状相关的体征，有明确的器质性损害；损害往往涉及的是植物神经所支配的组织或器官；区别于神经症和精神病；大多数病人不了解心理-



社会因素在自身发病中的作用。

52.【正确答案】E

【答案解析】医务人员权利的内容：

第一，有权对患者的疾病作出判断，并根据自己的临床经验采取必要的治疗措施。

第二，有权根据病情需要开具诊断证明，证明患者是否需要休息，甚至是否承担某些社会或法律责任。

第三，有权要求患者或家属配合诊治。

第四，有权干涉对自主选择意向违背社会利益、他人利益、自身根本利益患者的行为。

53.【正确答案】E

【答案解析】会诊的道德要求：一切从维护患者利益出发；经治医生应客观陈述患者的状况；尊重科学，学术面前人人平等。

54.【正确答案】C

【答案解析】卫生防疫的道德要求：

(1) 坚持群众受益，维护公益；

(2) 坚持“预防为主”；

(3) 严谨求实，秉公执法；

(4) 文明礼貌，团结协作。

55.【正确答案】E

【答案解析】选项 E 是属于医学研究伦理审查中人体试验利益冲突的预防的内容。

56.【正确答案】B

【答案解析】医德情感是激发人们进行自我反省的动力。医德情感是在长期的医德实践中形成的。随着医德情感的不断深化，医务人员的事业心和责任感在日益增强，以高度的同情心



和责任感为患者解除痛苦，履行医德义务。

57.【正确答案】C

【答案解析】发生医疗事故争议时，死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应在医患双方在场的情况下封存和启封。

58.【正确答案】E

【答案解析】在执业活动中应履行的义务

- (1) 遵守法律、法规，遵守技术操作规范；
- (2) 树立敬业精神，遵守职业道德，履行医师职责，尽职尽责为患者服务；
- (3) 关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私；
- (4) 努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平；
- (5) 宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育。

59.【正确答案】C

【答案解析】医疗单位的有关人员在药品购销中，收受给予财物或者其他利益，由卫生行政部门或者本单位给予处分，没收违法所得；对违法行为情节严重的执业医师，由卫生行政部门吊销其执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

60.【正确答案】D

【答案解析】突发事件的报告情形和报告时限要求突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现有下列情形之一的，应当在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告；接到报告的卫生行政主管部门应当在 2 小时内向本级人民政府报告，并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告：

- (1) 发生或者可能发生传染病暴发、流行的；
- (2) 发生或者发现不明原因的群体性疾病的；



- (3) 发生传染病菌种、毒种丢失的；
- (4) 发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件的。

61. 【正确答案】 D

【答案解析】 传染病防治管理原则是“防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众”。

62. 【正确答案】 C

【答案解析】 民事责任的构成必须同时具备以下 4 个要件：①损害的事实存在；②违法行为；③行为人有过错；④损害事实与过错或违法行为有因果关系。选项 C 中的内容是卫生民事责任的特征内容。故此题的正确选项是 C。

二、B 型题

1. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 根据恶寒发热的轻重不同和有关兼症，又可分为以下三种类型。

- (1) 外感风寒：恶寒重，发热轻，兼有头痛、身痛、无汗、脉浮紧，是外感风寒的表实证。
- (2) 外感风热：发热重，恶寒轻，兼有头痛、身痛、有汗、脉浮数，多属外感风热的表热证。
- (3) 伤风表证：恶寒、发热，并有恶风、自汗、脉浮缓，多属外感表虚证的太阳中风证。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 根据恶寒发热的轻重不同和有关兼症，又可分为以下三种类型。

- (1) 外感风寒：恶寒重，发热轻，兼有头痛、身痛、无汗、脉浮紧，是外感风寒的表实证。
- (2) 外感风热：发热重，恶寒轻，兼有头痛、身痛、有汗、脉浮数，多属外感风热的表热证。
- (3) 伤风表证：恶寒、发热，并有恶风、自汗、脉浮缓，多属外感表虚证的太阳中风证。

2. (1) 【正确答案】 A



【答案解析】疽：指患部漫肿无头，肤色不变，疼痛不已的疾病。具有难消、难溃、难敛，溃后易伤筋骨的特点，属阴证。多由气血亏虚，阴寒凝滞所致。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】疔：指患部形小而圆，红肿热痛不甚，根浅、脓出即愈的疾病。因外感火热毒邪或湿热蕴结所致。

3. (1) 【正确答案】A

【答案解析】根据点刺出现的部位，可区分热在何脏：

舌边有点刺：多属肝胆火盛。

舌尖生点刺：多为心火亢盛。

舌中生点刺：多为胃肠热盛。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】根据点刺出现的部位，可区分热在何脏：

舌边有点刺：多属肝胆火盛。

舌尖生点刺：多为心火亢盛。

舌中生点刺：多为胃肠热盛。

4. (1) 【正确答案】C

【答案解析】结脉：脉来缓慢，时有中止，止无定数。其脉象特征是脉来迟缓，脉律不齐，有不规则的歇止。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】促脉：脉来数而时有一止，止无定数。其脉象特征是脉率较快且有不规则的歇止。

5. (1) 【正确答案】D



【答案解析】心阳虚脱证的临床表现：在心阳虚证的基础上，突然冷汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，呼吸微弱，或心悸，心胸剧痛，神志模糊或昏迷，唇舌青紫，脉微欲绝。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】心阳虚证的临床表现：心悸怔忡，心胸憋闷或痛，气短，自汗，畏冷肢凉，神疲乏力，面色（白光）白，或面唇青紫，舌质淡胖或紫暗，苔白滑，脉弱或结或代。

6. (1) 【正确答案】C

【答案解析】痰饮：饮停胃肠；悬饮：饮停胸胁；支饮：饮停胸膈；溢饮：饮溢四肢。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】痰饮：饮停胃肠；悬饮：饮停胸胁；支饮：饮停胸膈；溢饮：饮溢四肢。

7. (1) 【正确答案】A

【答案解析】腹泻伴发热，见于急性肠炎、细菌性痢疾、伤寒或副伤寒、溃疡性结肠炎急性发作、败血症、细菌性食物中毒等。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】腹泻伴皮疹或皮下出血：见于伤寒、败血症、过敏性紫癜。

8. (1) 【正确答案】E

【答案解析】肛门指诊或直肠指诊对肛门、直肠疾病的诊断有重要价值。指诊有剧烈触痛见于肛裂与感染；触痛并有波动感见于肛门、直肠周围脓肿；触及柔软光滑而有弹性物见于直肠息肉；触及质地坚硬、表面凹凸不平的包块应考虑直肠癌。指诊后指套带有黏液、脓液或血液，说明存在炎症并有组织破坏。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】肛门指诊或直肠指诊对肛门、直肠疾病的诊断有重要价值。指诊有剧烈触痛见于肛裂与感染；触痛并有波动感见于肛门、直肠周围脓肿；触及柔软光滑而有弹性物见于直



肠息肉；触及质地坚硬、表面凹凸不平的包块应考虑直肠癌。指诊后指套带有黏液、脓液或血液，说明存在炎症并有组织破坏。

9. (1) 【正确答案】D

【答案解析】总补体溶血活性减低：见于各种免疫复合物性疾病，如肾小球肾炎；自身免疫性疾病，如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎以及同种异体移植排斥反应、血清病等；补体大量丢失，如外伤、手术、大失血；补体合成不足，如慢性肝炎、肝硬化等。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】补体 C_3 减低：见于大部分急性肾小球肾炎、狼疮性肾炎及系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等。

10. (1) 【正确答案】C

【答案解析】 V_5 导联对应的体表位置是左腋前线 V_4 水平处。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】 V_6 导联对应的体表位置是左腋中线 V_4 水平处。

11. (1) 【正确答案】E

【答案解析】TSH 增高见于甲状腺功能减退症。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】TSH 降低主要见于甲状腺功能亢进症。

12. (1) 【正确答案】A

【答案解析】腹痛伴寒战、高热，应考虑急性胆囊炎、化脓性胆管炎、肝脓肿、腹腔脓肿以及肺炎等。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】腹痛伴呕吐、腹胀、停止排便排气提示胃肠梗阻。



13. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 骨折之气血瘀滞型：宜活血化瘀止痛。桃红四物汤加减。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 骨折之痰瘀阻络型：宜活血通络。跌打丸加减。

14. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 伤寒热重湿轻型：治疗原则为清热解毒，佐以化湿。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 伤寒湿热蒙蔽心包：治疗原则为清热化湿，芳香开窍。

15. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】 暴发型流脑起病急骤，24 小时内出现意识障碍，病势凶险，死亡率高，儿童多见。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 慢性败血症型不多见，主要见于成人，病程迁延数周或数月。

16. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 流行性脑脊髓膜炎的治疗：就地隔离，保证足够液体入量；病原治疗首选有效抗菌药物，如青霉素 G；对症治疗，积极处理并发症等。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 流行性感冒的治疗：抗流感病毒药物可选用金刚烷胺、甲基金刚烷胺等。对症治疗时儿童患者应避免应用阿司匹林，以免诱发 Reye 综合征。

17. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 癫痫发作时精神障碍：表现有精神性发作、自动症和朦胧状态。

(2) 【正确答案】 E



【答案解析】癫痫发作间精神障碍：表现有癫痫性精神病、智力障碍及人格改变。

18. (1) 【正确答案】E

【答案解析】责任伤害是指故意伤害以及虽然无意但属可知、可控而未加认真预防与控制的伤害。不伤害原则就是针对责任伤害提出的。非责任伤害是指意外伤害或虽可知但不可控的伤害。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】责任伤害是指故意伤害以及虽然无意但属可知、可控而未加认真预防与控制的伤害。不伤害原则就是针对责任伤害提出的。非责任伤害是指意外伤害或虽可知但不可控的伤害。

19. (1) 【正确答案】A

【答案解析】行政处分是指由行政机关或企事业单位依照行政隶属关系给予有违法失职行为的工作人员的一种惩罚措施，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等形式。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】行政处罚是指卫生行政机关或者法律法规授权组织在职权范围内对违反卫生行政管理秩序而尚未构成犯罪的公民、法人和其他组织实施的一和卫生行政制裁。行政处罚的种类主要有警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、行政拘留等。



《专业知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1.【正确答案】C

【答案解析】

消渴之阴阳两虚证

证候：小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，手足心热，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，面色黧黑，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒怕冷，甚至阳痿。舌淡苔白而干，脉沉细无力。

治法：温阳滋阴补肾。

方药：金匱肾气丸或右归丸加减。

2.【正确答案】E

【答案解析】眩晕之肝阳上亢证

证候主症：眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦或数。

3.【正确答案】A

【答案解析】水肿其病位在肺、脾、肾，而关键在肾。

4.【正确答案】E

【答案解析】便秘的基本病变属大肠传导失常，同时与肺、脾、胃、肝、肾等脏腑的功能失调有关。

5.【正确答案】B

【答案解析】胸痹的病因：年老体虚、饮食不当、情志失调、寒邪内侵。B 痰浊阻滞为病机并非病因。

6.【正确答案】D



【答案解析】热哮证的治法：清热宣肺，化痰定喘。代表方：定喘汤。

7.【正确答案】C

【答案解析】《素问·咳论》篇说：“五脏六腑，皆令人咳，非独肺也。”说明外邪犯肺可以致咳，其他脏腑受邪，功能失调而影响于肺者亦可致咳，咳嗽不只限于肺，也不离乎肺。

8.【正确答案】B

【答案解析】慢性肾小球肾炎起病缓慢，病情迁延，时轻时重。表现为不同程度的蛋白尿、血尿、水肿、高血压。

9.【正确答案】D

【答案解析】饮食治疗是各型糖尿病的基础治疗。

10.【正确答案】B

【答案解析】蛛网膜下腔出血对于有头痛、烦躁者可以给予镇痛和镇静药物治疗。所以 B 选项错误。

11.【正确答案】E

【答案解析】蛛网膜下腔出血主要症状：突然发生剧烈头痛，呈胀痛或爆裂样疼痛，难以忍受。可为局限性或全头痛，有时上颈段也可出现疼痛。持续不能缓解或进行性加重的剧烈头痛；多伴有恶心呕吐；可有短暂的意识障碍及烦躁、谵妄等精神症状，少数出现部分性或全面性癫痫发作；也可以头昏、眩晕等症状起病。

12.【正确答案】B

【答案解析】脑出血急性期常有头痛、呕吐、肢体瘫痪、意识障碍、脑膜刺激征和痫性发作等全脑症状，发病后血压明显增高。

13.【正确答案】A

【答案解析】大脑中动脉：主干闭塞出现典型的“三偏征”，即病变对侧偏瘫、偏身感觉障



碍和同向盲，优势半球病变伴失语。

14.【正确答案】D

【答案解析】脑栓塞常见的病因为各种心脏病。

15.【正确答案】A

【答案解析】ACEI 或 ARB 既有降压，又有降低蛋白尿的作用，因此，对于高血压伴肾脏病患者，尤其有蛋白尿患者，应作为首选。

16.【正确答案】C

【答案解析】原发性醛固酮增多症：是肾上腺皮质增生或肿瘤分泌过多醛固酮所致，以长期高血压伴顽固性低血钾为特征。

17.【正确答案】A

【答案解析】膀胱癌肾虚证选方——大补元煎合二至丸。

18.【正确答案】A

【答案解析】食管癌-痰气交阻证

证候：吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩。舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

治法：开郁化痰，润燥降气。

方药：启膈散加减。

19.【正确答案】C

【答案解析】食管癌初起以标实为主，重在治标，以理气、化痰、消瘀为法，并可少佐滋阴养血润燥之品。后期以正虚为主，重在扶正，以滋阴养血、益气温阳为法，也可少佐理气、化痰、消瘀之药。

20.【正确答案】E



【答案解析】胃热阴伤证证候：胃脘灼热，嘈杂隐痛，食欲减退，口干咽燥，形体消瘦，五心烦热，大便干燥。舌质红少津，苔薄，脉细数。

21. 【正确答案】D

【答案解析】原发性肝癌-肝阴亏虚

肋肋疼痛，肋下结块，质硬拒按，五心烦热，潮热盗汗，头晕目眩，纳差食少，腹胀大，甚则呕血、便血、皮下出血。舌红少苔，脉细而数。

治法：养血柔肝，凉血解毒。

方药：一贯煎加减。

22. 【正确答案】B

【答案解析】甲胎蛋白（AFP）增高对肝癌的诊断有特异性。

23. 【正确答案】B

【答案解析】大多数中晚期肝癌患者以胁痛为首发症状，发生率超过 50%。

24. 【正确答案】D

【答案解析】肺癌-气阴两虚证治法——益气养阴。

25. 【正确答案】B

【答案解析】“类癌综合征”（表现为皮肤潮红、腹泻、水肿、喘息、心悸阵作等）。

26. 【正确答案】A

【答案解析】咳嗽：多为肺癌首发症状，干咳少痰或剧咳。继发感染时可有脓痰。

27. 【正确答案】D

【答案解析】膀胱癌的病因不外内、外两个方面。外受湿热邪毒，或风邪入于少阴；内则肾虚不固，湿热下注膀胱。瘀毒内阻，湿热瘀毒，蕴结膀胱为其基本病机。

28. 【正确答案】D



【答案解析】上消化道出血、食管静脉曲张或梗阻，以及鼻腔手术后的患者不宜插管。

29.【正确答案】A

【答案解析】急喉风针刺主穴：合谷、少商、商阳、尺泽、曲池、丰隆、天鼎、扶突，用泻法不留针；可配合少商、商阳点刺放血。

30.【正确答案】D

【答案解析】呼吸道分泌物干燥：常见于气管插管或气管切开的患者，由于其上呼吸道失去了对吸入气体的加强湿化作用，如果持续吸入未经湿化的高浓度氧气超过 48 小时后，支气管可因干燥气体的直接刺激产生损害。

31.【正确答案】C

【答案解析】有机磷中毒有蒜臭味、酒精中毒有酒味、硫化氢类中毒有蛋臭味等。

32.【正确答案】B

【答案解析】丹毒发无定处，根据其发病部位的不同有不同病名，生于躯干部，称内发丹毒；发于头面者，称抱头火丹；发于小腿足部者，称流火；新生儿多生于臀部，称赤游丹毒。

33.【正确答案】C

【答案解析】乳汁郁积是最常见的原因。

34.【正确答案】A

【答案解析】精癯之湿热下注证方用八正散加减。

35.【正确答案】B

【答案解析】金黄散、玉露散药性寒凉，功能清热消肿，散瘀化痰，适用于红、肿、热、痛明显的一切阳证。

36.【正确答案】B

【答案解析】带下是润泽阴户和阴道内部的无色无臭、黏而不稠的液体，也称白带。在月经



初潮后开始有带下分泌，其量不多，无色透明，黏而不稠，无特殊气味。月经前、经间期和妊娠早期带下稍有增加，绝经后减少。

37.【正确答案】A

【答案解析】痛经之气血虚弱证的治法：益气补血止痛。方药：圣愈汤。

38.【正确答案】E

【答案解析】带下病之热毒蕴结证的治法：清热解毒除湿。方药：五味消毒饮加味。

39.【正确答案】C

【答案解析】早孕诊断方法：早孕诊断主要根据停经和妊娠试验。一般可在月经过期 3~7 日时用早孕试纸测定晨尿，或检查血清 HCG，如停经 6 周以上，B 超检查可在宫腔内测出孕囊和胚芽，妊娠 6~8 周可测出原始胎心搏动。

40.【正确答案】E

【答案解析】小儿脏气清灵，易趋康复：体禀纯阳，生机蓬勃，脏气清灵，活力充沛，对各种治疗反应灵敏；小儿宿疾较少，病因相对单纯，疾病过程中情志因素的干扰和影响相对较少。因此，只要辨证准确，治疗及时，护理适宜，病情好转的速度较成人快，疾病治愈的可能也较成人为大。例如：小儿感冒、咳嗽、泄泻等病证多数发病快好转也快，小儿哮喘、癫痫、阴水等病证虽病情缠绵，但其预后较成人相对为好。

41.【正确答案】D

【答案解析】肾病综合征之肝肾阴虚证

证候：浮肿较轻或无浮肿，头痛，头晕耳鸣，两目干涩，面色潮红，五心烦热，盗汗，失眠多梦，口干咽燥，咽部暗红，腰膝酸软，或伴痤疮，舌红，苔少，脉细数，指纹淡。

42.【正确答案】E

【答案解析】鹅口疮由白色念珠菌感染所致，如产时感染，或喂奶器具不洁、乳品污染，或



长期使用广谱抗生素菌群失调时易于发生。

43.【正确答案】A

【答案解析】小儿厌食之脾失健运证治法：调和脾胃，运脾开胃。

44.【正确答案】B

【答案解析】肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线的骨度分寸是：3寸。

45.【正确答案】C

【答案解析】少商

【主治】①咳嗽、气喘、咽喉肿痛、鼻衄等肺系实热病证；②中暑，发热；③昏迷，癫狂；④指肿、麻木。

46.【正确答案】B

【答案解析】丰隆【主治】①头痛、眩晕等头部病证；②癫狂；③咳嗽、哮喘、痰多等肺系病证；④下肢痿痹。

47.【正确答案】A

【答案解析】申脉定位：在踝区，外踝尖直下，外踝下缘与跟骨之间凹陷中。

48.【正确答案】A

【答案解析】雀啄灸属于艾条灸中的悬起灸。

49.【正确答案】C

【答案解析】胃痛配穴：寒邪犯胃加胃俞；饮食停滞加中脘、梁门；肝气犯胃加太冲；气滞血瘀加膈俞；脾胃虚寒加气海、关元、脾俞、胃俞；胃阴不足加三阴交、内庭。

50.【正确答案】A

【答案解析】起止、交接及循行于眼内眦的经脉

(1) 足太阳膀胱经：《灵枢·经脉》云：“膀胱足太阳之脉，起于目内眦，上额，交颠。”



(2) 足阳明胃经：起于鼻旁迎香穴，经过目内眦睛明穴，与足太阳膀胱经交会。

(3) 手太阳小肠经：一支脉从颊部别出，上走眼眶之下，抵于鼻旁，至目内眦睛明穴，与足太阳膀胱经相接。

(4) 手阳明大肠经：其支脉上行头面，左右相交与人中之后，上夹鼻孔，循禾髻，终于眼下鼻旁之迎香穴。

51. 【正确答案】 E

【答案解析】 视物昏渺之气血亏虚的治则：益气补血。方药：人参养荣汤加减。

52. 【正确答案】 C

【答案解析】 天行赤眼之初感疔气

主症：患眼眵涩灼热，羞明流泪，眼眵稀薄，胞睑微红，白睛红赤，点片状溢血；兼有发热头痛，鼻塞，流清涕，耳前颌下可扪及肿核，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热。

方药：驱风散热饮子加减。

53. 【正确答案】 B

【答案解析】 鼻衄属于急症，临床治疗时要遵照“急则治其标”“缓则治其本”之原则，积极采取止血措施。

54. 【正确答案】 E

【答案解析】 鼻渊发作时可见鼻黏膜淡红、苍白或暗灰色、肿胀湿润，以下鼻甲为甚。鼻腔内可见清稀鼻涕，间歇期以上症状不明显。

55. 【正确答案】 B

【答案解析】 骨折初期是指伤后 1~2 周内。

56. 【正确答案】 D



【答案解析】畸形、骨擦音和异常活动是骨折的特征，这三种特征只要有其中一种出现，即可在临床上初步诊断为骨折。

57. 【正确答案】 A

【答案解析】小儿桡骨头半脱位又称“牵拉肘”，多发生于5岁以下幼儿，1~3岁发病率最高。

58. 【正确答案】 D

【答案解析】肩关节各方向活动受限，但以外展、外旋、后伸障碍最显著。

二、B 型题

1. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】小便艰涩，尿中夹有砂石，尿道窘迫疼痛，舌红苔黄，脉弦，为石淋。代表方：石韦散加减。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】小便涩滞，淋漓不畅，小腹胀满疼痛，舌苔薄白，脉沉弦，为气淋，代表方：沉香散加减。

2. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】喘证是以呼吸困难，甚至张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧，口唇发绀为临床特征的病证。

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】哮病呈反复发作性。发时常多突然，可见鼻痒、喷嚏、咳嗽、胸闷等先兆。喉中有明显哮鸣声，呼吸困难，不能平卧，甚至面色苍白，唇甲青紫，约数分钟、数小时后缓解。

3. (1) 【正确答案】 A



【答案解析】急性肾小球肾炎诊断要点

1.病前 1~3 周常有呼吸道或皮肤的链球菌感染史，如猩红热、扁桃体炎、中耳炎、脓疱疮等。

2.起病急，出现水肿、少尿、血尿、蛋白尿、高血压症状。水肿表现为晨起眼睑浮肿，数日内发展至下肢及全身水肿，呈紧张性水肿。

(2) **【正确答案】B**

【答案解析】狼疮性肾炎临床亦可见水肿、血尿、蛋白尿，应与急性肾小球肾炎鉴别。但狼疮性肾炎多见于青年女性，持续进展，反复发作；临床可伴有发热、皮疹、关节炎等全身多系统受累；抗核抗体、抗双链 DNA (ds-DNA 抗体)、抗 SM 抗体阳性。必要时行肾活检可资鉴别。

4. (1) **【正确答案】E**

【答案解析】蛛网膜下腔出血脑膜刺激征明显。

(2) **【正确答案】E**

【答案解析】蛛网膜下腔出血可伴有剧烈头痛。

5. (1) **【正确答案】B**

【答案解析】膀胱癌-湿热证选方——八正散加减。

(2) **【正确答案】A**

【答案解析】膀胱癌-瘀毒证选方——桃红四物汤加减。

6. (1) **【正确答案】A**

【答案解析】食管癌瘀血内结证选方——通幽汤。

(2) **【正确答案】C**

【答案解析】胃癌瘀毒内阻证选方——失笑散合膈下逐瘀汤。



7. (1) 【正确答案】B

【答案解析】在放疗期间，以益气养阴润燥为治疗原则，方选沙参麦冬汤加减。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】肺癌在化疗期间，血细胞下降明显者，根据辨证论治，给予补气血、益肝肾治疗，方选八珍汤、四物汤加二至丸，或当归补血汤加二仙汤加减。

8. (1) 【正确答案】E

【答案解析】肺癌上腔静脉综合征表现：头颈肿胀、睛赤唇紫、头晕目眩、胸闷等。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】肺癌颈交神经丛和臂丛神经受侵表现：上肢烧灼样疼痛、Horner 征。

9. (1) 【正确答案】D

【答案解析】生黄豆、生绿豆，煎汁服。用于各种食物及药物中毒。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】兴国解毒药：鸡血藤、田七、青木香、茜草、香附、冰片、小叶凤尾草，水煎服。用于乌头、苍耳子、马钱子、野毒蕈、氰化物、亚硝酸盐及有机磷农药中毒。

10. (1) 【正确答案】B

【答案解析】心衰之痰瘀内阻证首选方剂为血府逐瘀汤合苓桂术甘汤。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】心衰之痰水凌心证首选方剂为葶苈大枣泻汤合五苓散。

11. (1) 【正确答案】B

【答案解析】丹毒发无定处，根据其发病部位的不同有不同病名，生于躯干部，称内发丹毒；发于头面者，称抱头火丹；发于小腿足部者，称流火；新生儿多生于臀部，称赤游丹毒。

(2) 【正确答案】A



【答案解析】丹毒发无定处，根据其发病部位的不同有不同病名，生于躯干部，称内发丹毒；发于头面者，称抱头火丹；发于小腿足部者，称流火；新生儿多生于臀部，称赤游丹毒。

12. (1) 【正确答案】C

【答案解析】乳痈之气滞热壅证方用瓜蒌牛蒡汤加减。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】乳痈之正虚毒恋证方用托里消毒散加减。

13. (1) 【正确答案】B

【答案解析】月经先期之阳盛血热证治法：清热凉血，止血调经。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】月经先期之阴虚内热证治法：滋阴清热，养血调经。

14. (1) 【正确答案】B

【答案解析】滴虫性阴道炎常用西药：

(1) 全身用药：甲硝唑 2g，单次口服；或甲硝唑 400mg，每日 2~3 次，连服 7 日。

(2) 局部用药：甲硝唑泡腾片，200mg，每晚 1 次，连用 7 日。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】外阴阴道假丝酵母菌病常用西药：

(1) 全身用药：氟康唑 150mg，顿服；或伊曲康唑每次 200mg，每日 1 次，连用 3~5 日。

(2) 局部用药：克霉唑栓剂，每晚 1 粒 (150mg)，塞入阴道深部，连用 7 日，或每日早、晚各用 1 粒 (150mg)，连用 3 日。

15. (1) 【正确答案】A

【答案解析】水痘的外治疗法：青黛适量，布包，扑撒疱疹局部，1 日 1~2 次。用于水痘



瘙痒，疱疹破溃者。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】水痘的外治疗法：苦参 15g、芒硝 10g、浮萍 10g，煎水外洗。每日 2 次。

用于水痘皮疹较密，瘙痒明显者。

16. (1) 【正确答案】A

【答案解析】泄泻之伤食泻

证候：大便稀溏，夹有乳凝块或食物残渣，气味酸臭，或如败卵，脘腹胀满，便前腹痛，泻后痛减，腹部胀痛拒按，暖气酸馊，或有呕吐，不思乳食，夜卧不安，舌苔厚腻，或微黄，脉滑实，指纹滞。

治法：运脾和胃，消食化滞。

主方：保和丸加减。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】泄泻之脾肾阳虚泻

证候：久泻不止，大便清稀，澄澈清冷，完谷不化，或见脱肛，形寒肢冷，面色苍白，精神萎靡，寐时露睛，小便色清，舌淡苔白，脉细弱，指纹色淡。

治法：温补脾肾，固涩止泻。

主方：附子理中汤合四神丸加减。

17. (1) 【正确答案】C

【答案解析】手太阳小肠经的主治特点是：主治后头、肩胛、神志病。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】督脉的主治特点是：中风、昏迷、热病、头面部病。

18. (1) 【正确答案】C



【答案解析】疾徐补泻法中，进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针者为补法。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】呼吸补泻法中，患者吸气时进针，呼气时出针为泻法。

19. (1) 【正确答案】C

【答案解析】圆翳内障之脾气虚弱

主症：视物模糊，视力缓降，晶珠混浊，或见晶珠混浊，视近尚明而视远模糊等，伴面色萎黄，少气懒言，肢体倦怠，舌淡苔白，脉缓弱。

治法：益气健脾，利水渗湿。

方药：四君子汤加减

(2) 【正确答案】A

【答案解析】圆翳内障之肝肾不足

主症：视物昏花，视力缓降，晶珠混浊，头昏耳鸣，少寐健忘，腰酸腿软，口干，舌红少苔，脉细。

治法：补益肝肾，清热明目。

方药：杞菊地黄丸加减。

20. (1) 【正确答案】E

【答案解析】鼻鼽之肺气虚寒，卫表不固

主证：鼻痒打喷嚏，鼻塞流清涕，嗅觉减退，恶风怕冷。全身见面色苍白，气短，自汗。舌质淡，苔薄白，脉虚弱。检查见鼻腔黏膜苍白水肿，双下鼻甲尤甚，鼻内清稀分泌物。

治则：温肺散寒，益气固表。

主方：温肺止流丹加减。

加减：若鼻痒甚，可酌加僵蚕、蝉蜕；若畏风怕冷，清涕如水者，可酌加桂枝、干姜、大枣



等。临床上亦可用玉屏风散合苍耳子散加减，以玉屏风散益气固表，苍耳子散辛散风邪以通窍。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】鼻渊之脾气虚弱，清阳不升

主证：打喷嚏、流清涕，鼻塞重，鼻痒，面色萎黄无华，消瘦，倦怠，神疲气短，怯寒，腹胀，纳呆便溏，舌胖淡边有齿印，苔白腻，脉弱无力。检查见鼻腔黏膜水肿淡白，或鼻甲息肉样变，有水样分泌物。

治则：健脾补气，升阳通窍。

主方：补中益气汤加减。亦可选用参苓白术散加减。若脾阳虚甚，可用理中汤加减。

21. (1) 【正确答案】B

【答案解析】骨质疏松症之正虚邪侵证治以扶正固本。方用鹿角胶丸，方中虎骨改用代用品。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】骨质疏松症之肾虚精亏证治以补肾填精。方用左归丸加淫羊藿、鹿衔草；或用中成药仙灵骨葆、骨松宝等。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题





《专业实践能力》仿真密卷答案与解析

一、A2 型题

1. 【正确答案】 C

【答案解析】右肋隐痛不适、饱胀，伴暖气、呃逆等，尤其是进食之后，疼痛呈绞痛，向肩胛部和背部放射，墨菲征阳性。多见于胆囊结石、胆囊炎。

2. 【正确答案】 D

【答案解析】痹证-正虚邪恋证

证候：痹证日久不愈，肌肉瘦削，腰膝酸软。舌质淡红，舌苔薄白或少津，脉沉细弱或细数。

治法：培补肝肾，舒筋止痛。

方药：独活寄生汤

3. 【正确答案】 C

【答案解析】胃痛-饮食伤胃证

证候：食后胃痛胀满拒按，暖腐吞酸，呕吐不消化食物，其味腐臭，吐后痛减，不饥不食。

苔厚腻，脉滑。

治法：消食导滞，和胃止痛。

方药：保和丸加减。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】喘证-肝气乘肺证

证候：每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促、息粗气憋、胸闷胸痛、咽中如窒。或失眠、心悸，平素常多忧思抑郁，不思饮食。苔薄，脉弦。

方药：五磨饮子。

5. 【正确答案】 D



【答案解析】水肿-肾阴亏虚证证候：水肿日久，肿势不甚，腰膝酸软，手足心热，口咽干燥，头晕耳鸣。舌红少苔，脉象沉细或弦细。治法：滋养肾阴。

六味地黄丸口服，每次 3~5 粒，1 日 2~3 次。用于肾阴亏虚证。

6.【正确答案】B

【答案解析】中风之风阳上扰证

平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼歪斜，舌强语謇，或手足重滞，甚则半身不遂等症，舌质红苔黄，脉弦。

治法：平肝潜阳，活血通络。

代表方：天麻钩藤饮加减。

7.【正确答案】B

【答案解析】不寐肝火扰心证

主症：不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦而数。

代表方：龙胆泻肝汤加减。

8.【正确答案】D

【答案解析】慢性肾小球肾炎转诊原则

- 1.持续存在大量蛋白尿和持续出现血尿者。
- 2.血压较高而且控制不理想者。
- 3.出现肾性贫血、夜尿增多、肾性失钠、血钙降低、酸中毒等征象者。
- 4.呼吸道或全身感染、劳累等因素影响，短期内出现类似急性肾小球肾炎的临床表现者。
- 5.病情无变化或恶化，需进一步明确诊断者。

9.【正确答案】B



【答案解析】急性肾小球肾炎血清总补体及 C_3 一过性下降，多于 6~8 周恢复正常。肾功能一过性下

10. 【正确答案】 B

【答案解析】急性肾盂肾炎

症状：除尿频、尿急、尿痛症状外，还可出现腰痛、寒战、发热、头痛、乏力、食欲缺乏、恶心等全身症状。

体征：上尿路感染时体温升高，可出现肋脊点（第 12 肋与腰大肌外缘交叉点）、季肋点及输尿管点压痛，肾区叩击痛阳性。

上尿路感染除尿常规可见白细胞外，还可出现白细胞管型、尿细菌培养（清洁中段尿培养）阳性。此外，血常规可见白细胞增多，尿 β_2 -微球蛋白（ β_2 -MG）升高。

11. 【正确答案】 E

【答案解析】患者肢体感觉运动障碍持续存在，除外 C。头颅 CT 未见异常，除外脑出血。无栓子来源，除外 B。而 D 无肢体活动障碍。故选 E。

12. 【正确答案】 D

【答案解析】颈内动脉系统 TIA：最常见症状为轻偏瘫，表现为对侧单肢无力、麻木和/或对侧面面部轻瘫。特征性体征有眼动脉交叉瘫（病侧一过性黑矇或失明、视物模糊、对侧偏瘫及感觉障碍）和 Horner 征交叉瘫（病侧 Horner 征、对侧偏瘫）；优势半球受累出现暂时性失语。

13. 【正确答案】 B

【答案解析】患者用力大便后出现胸骨后疼痛，持续时间长，含服硝酸甘油不能缓解，因此最有可能导致胸痛的原因为急性心肌梗死。

14. 【正确答案】 D



【答案解析】患者淋雨后出现上呼吸道感染症状，自服药物治疗效果欠佳，疾病进展。根据患者临床表现和白细胞升高的情况，首先考虑诊断为肺炎。

15. 【正确答案】 A

【答案解析】膀胱癌-肾虚证

证候：无痛性血尿，呈间歇性；伴腰酸腿软，神疲乏力，头昏眼花。舌淡红，脉沉细，尺弱。

治法：益气滋肾，收敛摄血。

方药：大补元煎合二至丸加减。

16. 【正确答案】 B

【答案解析】食管癌-气虚阳微证

证候：水饮不下，泛吐多量黏液白沫，面浮足肿，面色㿔白，形寒气短，精神疲惫，腹胀，

形寒气短。舌质淡，苔白，脉细弱。

治法：温补脾肾。

方药：补气运脾汤加减。

17. 【正确答案】 C

【答案解析】根据题干给出的贫血、腹部肿块、腹痛，结合该患者明显消瘦的身体状况考虑该患者为大肠癌之右半结肠癌。

18. 【正确答案】 A

【答案解析】B 超引导下肝穿刺活检，阳性者即可确诊肝癌。

19. 【正确答案】 B

【答案解析】患者有原发性肝癌的临床表现，如：全身表现为低热、厌食、消瘦；有肝癌的常见症状右季肋下胀痛，还有其他的表现，如：黄疸、蜘蛛痣、肝大，还有实验室检查的支持，查体触及肝肿大并质硬表面不平，故诊断为原发性肝癌。



20. 【正确答案】 A

【答案解析】原发性肝癌之气滞血瘀证

证候：右肋疼痛较剧，如锥如刺，入夜更甚，甚至痛引肩背，右肋下结块较大，质硬拒按，或同时见左肋下肿块，面色萎黄而暗，倦怠乏力，脘腹胀满，甚至腹胀大，皮色苍黄，脉络暴露，食欲不振，大便溏结不调，月经不调。舌质紫暗，有瘀点瘀斑，脉弦涩。

治法：行气活血，化瘀消积。

方药：复元活血汤加减。

21. 【正确答案】 D

【答案解析】肺癌-阴虚毒热证

证候：咳嗽无痰或少痰，或痰中带血，甚则咯血不止，胸痛，心烦寐差，低热盗汗，或热势壮盛，久稽不退，口渴，大便干结。舌质红，舌苔黄，脉细数或数大。

治法：养阴清热，解毒散结。

方药：沙参麦冬汤合五味消毒饮加减

22. 【正确答案】 B

【答案解析】昏迷-亡阳证

证候：昏愦不语，面目唇紫，气息微弱，冷汗淋漓，四肢厥逆，二便失禁。舌淡润暗，脉微细欲绝。

治法：回阳固脱。

方药：参附汤。

23. 【正确答案】 A

【答案解析】利多卡因：是治疗室性心律失常的药物，尤其对 AMI 患者可能更为有效。适用于电除颤和肾上腺素治疗后顽固性心室颤动、血流动力学稳定性室性心动过速及血流动力



学有改变的室性期前收缩。

24.【正确答案】A

【答案解析】对诊断有机磷杀虫药中毒最有帮助的是全血胆碱酯酶活力降低。

25.【正确答案】E

【答案解析】慢性心力衰竭之营卫受邪证

证候：发热，身微恶寒，肢节不舒，头眩胀，心下逆满，心悸喘促难安，肢厥，尿少，面红颧赤。舌红，苔薄白或薄黄，脉浮或结代。

治法：调和营卫，泻肺化痰。

方药：热者以麻杏石甘汤加减；寒者以桂枝去芍药加附子汤加减。

26.【正确答案】E

【答案解析】昏迷-邪毒内闭证

证候：神昏，高热或身热不扬，烦躁，或见谵语，二便秘结，舌红或绛，苔厚或腻或黄或白，脉沉实有力。

治法：清热化痰，开闭醒神。

代表方：菖蒲郁金汤加减。

27.【正确答案】B

【答案解析】患者为外伤后出的感染性休克。

热毒内陷证

证候：神昏，壮热，烦渴，便秘不通，汗出淋漓，身烦热而肢冷，烦躁不宁，肌肤紫斑。舌质红绛或舌上卷，苔黄厚燥或有芒刺，脉沉细而数。

治法：解毒清热，醒神固脱。

方药：清瘟败毒饮加减。



28. 【正确答案】 C

【答案解析】丹毒是患部皮肤突然发红成片、色如涂丹的急性感染性疾病。其特点是病起突然，恶寒发热，局部皮肤忽然变赤，色如丹涂脂染，焮热肿胀，迅速扩大，边界清楚，发无定处，数日内可逐渐痊愈，但容易复发。

29. 【正确答案】 A

【答案解析】乳岩为乳房内无痛肿块，边界不清，质地坚硬，表面不光滑，不易推动，常与皮肤黏连，出现病灶中心酒窝征，个别可伴乳头溢液。后期随着癌肿逐渐增大，产生不同程度疼痛，皮肤可呈橘皮样水肿、变色；病变周围可出现散在的小肿块，状如堆粟；乳头内缩或抬高，偶可见到皮肤溃疡。晚期，乳房肿块溃烂，疮口边缘不整齐，中央凹陷似岩穴，有时外翻似菜花，时渗紫红血水，恶臭难闻。

30. 【正确答案】 D

【答案解析】精癯之气滞血瘀证：小便不畅，尿线变细或点滴而下，或尿道涩痛，或小便闭塞不通，努责方出或点滴全无，小腹胀满隐痛，偶有血尿。舌质暗或有瘀点瘀斑，苔白或薄黄，脉弦或涩。治宜行气活血，通窍利尿。方用沉香散加减。

31. 【正确答案】 C

【答案解析】肛痈之热毒炽盛证 证候：肛门肿痛剧烈，持续数日，痛如鸡啄，难以入寐，伴恶寒发热，口干便秘，小便困难。肛周红肿，按之有波动感或穿刺有脓。舌红，苔黄，脉弦滑。治宜清热解毒透脓。方用透脓散加减。

32. 【正确答案】 D

【答案解析】药毒之风热侵袭证：皮损为红斑、丘疹、风团，来势快，多在上半身，分布稀疏或密集，局部焮热剧痒，伴恶寒发热、头痛鼻塞等。舌红，苔薄白或黄，脉浮数。治宜疏风清热解毒。方用消风散加减。



33. 【正确答案】 E

【答案解析】尖锐湿疣之湿毒下注证: 外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物, 色灰或褐或淡红, 质软, 表面秽浊潮湿, 触之易出血, 恶臭; 伴小便黄或不畅; 苔黄腻, 脉滑或弦数。

34. 【正确答案】 C

【答案解析】绝经前后诸证之肾阴虚证

证候: 经断前后, 头晕耳鸣, 头部面颊阵发性烘热汗出, 五心烦热, 腰膝酸软, 皮肤干燥瘙痒, 月经周期紊乱, 量少或多, 经色鲜红。舌红, 苔少, 脉细数。

治法: 滋养肾阴, 佐以潜阳。

方药: 左归丸合二至丸。

35. 【正确答案】 B

【答案解析】崩漏之脾虚证

证候: 经血非时而至, 崩中暴下继而淋漓, 血色淡而质薄, 气短神疲, 面色白, 或面浮肢肿, 手足不温。舌质淡, 苔薄白, 脉弱或沉细。

治法: 补气摄血, 止血调经。

常用中成药: 归脾丸、补中益气丸。

36. 【正确答案】 A

【答案解析】崩漏实热证

证候: 经血非时暴下, 或淋漓不净又时而增多, 血色深红, 口干喜饮, 唇红面赤, 烦躁不寐, 小便黄, 大便干结。舌红, 苔黄, 脉滑数。

治法: 清热养阴, 凉血止血。

方药: 清热固经汤。

37. 【正确答案】 D



【答案解析】带下病之脾虚证

证候：带下量多，色白或淡黄，质黏稠，无臭气，如涕如唾，绵绵不断，神疲倦怠，四肢不温，纳少便溏，两足浮肿，面色白。舌质淡，苔白腻，脉缓弱。

加减：若气虚重者加黄芪；兼肾虚腰酸者加杜仲、续断、菟丝子；寒凝腹痛者加香附、艾叶；纳呆加砂仁、厚朴；带多日久，滑脱不止者加固涩止带药，如金樱子、芡实、乌贼骨、白果之类。若脾虚湿蕴化热，症见带下量多，色黄，黏稠，有臭味者，治宜健脾祛湿，清热止带，方用易黄汤，山药、芡实、白果、车前子（包煎）、黄柏。

38.【正确答案】E

【答案解析】带下病之湿热下注证

证候：带下量多，色黄，黏稠，有臭气，或伴阴部瘙痒，胸闷心烦，口苦咽干，纳差，小腹或少腹作痛，小便短赤。舌红，苔黄腻，脉濡数。

治法：清热利湿止带。

方药：止带方。

39.【正确答案】C

【答案解析】根据患者停经史，结合下腹一侧撕裂样疼痛、阴道不规则流血、休克等临床表现，及入院后妊娠试验阳性，B超提示宫腔内无孕囊。阴道后穹窿穿刺见暗红色不凝血，诊断为异位妊娠。

40.【正确答案】B

【答案解析】妊娠恶阻之脾胃虚弱证

证候：妊娠早期，恶心，呕吐不食，恶闻食气，食入即吐，口淡，呕吐清涎或食糜，头晕，纳呆，神疲倦怠，嗜卧嗜睡。舌淡，苔白，脉缓滑无力。

治法：健脾和胃，降逆止呕。



方药：香砂六君子汤。若脾虚夹痰浊，症见胸闷泛恶，呕吐痰涎，舌淡苔厚腻，脉缓滑，原方加全瓜蒌及苏叶，橘红易陈皮，以宽胸理气，化痰止呕。

41.【正确答案】B

【答案解析】产后身痛之风寒证

证候：产后关节疼痛，屈伸不利，或痛无定处，或冷痛剧烈，或肢体关节肿胀、麻木、重着，恶风怕冷。舌淡，苔白或白腻，脉浮紧或濡细。

治法：养血祛风，散寒除湿。

方药：独活寄生汤或趁痛散、防风汤。

42.【正确答案】C

【答案解析】产后身痛之血虚证

证候：产褥期中，遍身关节酸痛，麻木，面色萎黄，头晕心悸，气短乏力。舌淡红，苔薄白，脉细弱。

治法：养血益气，温经通络。

方药：黄芪桂枝五物汤加当归、秦艽、丹参、鸡血藤。

43.【正确答案】B

【答案解析】慢性盆腔炎之肾虚瘀滞证

证候：少腹疼痛，绵绵不休，白带增多，腰脊酸楚，头晕目眩，神疲乏力。舌暗或有瘀点，苔薄，脉沉细。

治法：补益肝肾，和营祛瘀。

方药：左归丸加味。

44.【正确答案】D

【答案解析】1~12岁体重(kg)=8(kg)+2(kg)×年龄；2岁后至12岁儿童的身高



(cm)=70(cm)+7(cm)×年龄。故 3 岁小儿的体重约为 14kg，身高约为 91cm。

45.【正确答案】A

【答案解析】胎毒为胎中禀受之毒，主要指热毒。胎毒重者，初生时多有面红目赤眵多、烦闹多啼、大便秘结等表现，易发生丹毒、痈疔、湿疹、胎黄、胎热、口疮等病证。

46.【正确答案】C

【答案解析】蛔虫病之虫瘕证

证候：有肠蛔虫症状。突然阵发性脐腹剧烈疼痛，部位不定，频繁呕吐，可呕出蛔虫，大便不下或量少，腹胀，腹部可扪及质软、无痛的可移动团块。病情持续不缓解者，见腹硬、压痛明显，肠鸣，无矢气。舌苔白或黄腻，脉滑数或弦数。

治法：通腑散结，驱蛔下虫。

主方：驱蛔承气汤加减。

47.【正确答案】E

【答案解析】根据题干症状可以判断为哮喘，痰阻肺热证，痰阻肺热加丰隆。

48.【正确答案】A

【答案解析】根据题干症状辩证为痛经气滞血瘀证，气滞加太冲、阳陵泉。

49.【正确答案】D

【答案解析】肘劳，病位在肘部手三阳经筋。根据疼痛部位进行经络辨证：肘关节内下方（肱骨内上髁周围）有明显的压痛点，属于手太阳经筋病证。

50.【正确答案】B

【答案解析】聚星障之肝胆火炽 症状：患眼碜涩疼痛，灼热畏光，热泪频流，白睛混赤，黑睛生翳，扩大加深，呈树枝状或地图状，或兼见胁痛，口苦咽干，溺黄，舌红苔黄，脉弦数。



51. 【正确答案】 A

【答案解析】 椒疮之热毒壅盛

主症：眼灼热痒痛，羞明流泪，沙涩难睁，眼眵较多，睑内脉络模糊，红赤明显，颗粒丛生，并见粟样颗粒，赤脉下垂，舌红苔黄，脉数。

治法：清热解毒，除风散邪。

方药：除风清脾饮加减

52. 【正确答案】 B

【答案解析】 急喉风根据呼吸困难及病情轻重程度分为四度：

I 度：安静时无呼吸困难症状，活动或哭闹时出现喉鸣和鼻翼煽动，吸气时天突（胸骨上窝）、缺盆（锁骨上窝）及肋间等处轻度凹陷，称三凹征（甚则剑突下及上腹部软组织也可凹陷，故称四凹症）。

II 度：安静时出现上述呼吸困难表现，活动时加重，但不影响睡眠和进食。

III 度：呼吸困难明显，喉鸣较重，并见缺氧症状，如烦躁不安、自汗、脉数等，三（四）凹症显著。

IV 度：呼吸极度困难，患者烦躁不安，唇青面黑，额汗如珠，身汗如雨，甚则四肢厥冷，脉沉微欲绝，神昏，濒临窒息。

53. 【正确答案】 D

【答案解析】 脓耳之肝胆火盛证

主证：耳痛剧烈，痛引腮脑，耳鸣耳聋，流脓多黄稠或带红色。全身可见发热，口苦咽干，小便黄赤，大便干结，舌质红，苔黄，脉弦数有力。小儿症状较成人重，可有高热、烦躁不安、惊厥等症。检查见鼓膜红赤饱满，或鼓膜紧张部穿孔，耳道有较多黄稠脓液。听力检查为传导性聋。



治法：清肝泻火，解毒排脓。

方药：龙胆泻肝汤。

54. 【正确答案】 C

【答案解析】 肩关节脱位特点：患者侧向跌倒，上肢外展外旋，手掌向下撑地，地面的反作用力由下向上，暴力由掌面经肱骨纵轴上传达至肱骨头，肱骨头冲破较薄弱的肩关节囊前壁。伤后患肩疼痛、肿胀，肩关节活动受限，检查时可见患肩呈“方肩”畸形，弹性固定于外展约 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 位，触诊时可感觉肩峰下明显空虚，搭肩试验（Dugas 征）阳性。

55. 【正确答案】 A

【答案解析】 肩关节周围炎治宜补气血、益肝肾、温经络、祛风湿为主，内服独活寄生汤或三痹汤等。

二、A3/A4 型题

1. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 消渴之阴阳两虚证

证候：小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，手足心热，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，面色黧黑，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒怕冷，甚至阳痿。舌淡苔白而干，脉沉细无力。

治法：温阳滋阴补肾。

方药：金匱肾气丸或右归丸加减。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 消渴之阴阳两虚证

证候：小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，手足心热，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，面色黧黑，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒怕冷，甚至阳痿。舌淡苔白而干，脉沉细无力。

治法：温阳滋阴补肾。



方药：金匱肾气丸或右归丸加减。

(3) 【正确答案】C

【答案解析】消渴之阴阳两虚证

证候：小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，手足心热，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，面色黧黑，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒怕冷，甚至阳痿。舌淡苔白而干，脉沉细无力。

治法：温阳滋阴补肾。

方药：金匱肾气丸或右归丸加减。

2. (1) 【正确答案】B

【答案解析】眩晕之肝阳上亢证

证候：眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤。舌红苔黄，脉弦或数。

治法：平肝潜阳，清火息风。

方药：天麻钩藤饮加减。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】眩晕之肝阳上亢证

证候：眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤。舌红苔黄，脉弦或数。

治法：平肝潜阳，清火息风。

方药：天麻钩藤饮加减。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】眩晕之肝阳上亢证

证候：眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，



急躁易怒，肢麻震颤。舌红苔黄，脉弦或数。

治法：平肝潜阳，清火息风。

方药：天麻钩藤饮加减。

3. (1) 【正确答案】A

【答案解析】题中患者为气秘。气秘主症：大便秘结，欲便不得，暖气频作，胸胁痞满，腹胀，纳呆。苔薄腻，脉弦。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】气秘主症：大便秘结，欲便不得，暖气频作，胸胁痞满，腹胀，纳呆。苔薄腻，脉弦。

(3) 【正确答案】A

【答案解析】气秘

证候：大便秘结，欲便不得，暖气频作，胸胁痞满，腹胀，纳呆。苔薄腻，脉弦。

治法：顺气导滞。

方药：六磨汤加减。

4. (1) 【正确答案】D

【答案解析】水肿之湿热壅盛证证候：全身水肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，呼吸气粗，烦热口干，小便短赤，大便干结。舌质红，苔黄腻，脉沉数。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】水肿之湿热壅盛证

证候：全身水肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，呼吸气粗，烦热口干，小便短赤，大便干结。

舌质红，苔黄腻，脉沉数。

治法：清热利湿，疏理气机。



方药：疏凿饮子。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】水肿之湿热壅盛证

证候：全身水肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，呼吸气粗，烦热口干，小便短赤，大便干结。

舌质红，苔黄腻，脉沉数。

治法：清热利湿，疏理气机。

方药：疏凿饮子。

5. (1) 【正确答案】D

【答案解析】不寐-肝火扰心证

证候：不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，

便秘溲赤。舌红苔黄，脉弦而数。

治法：疏肝泻火，镇心安神。

方药：龙胆泻肝汤加减。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】不寐-肝火扰心证

证候：不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，

便秘溲赤。舌红苔黄，脉弦而数。

治法：疏肝泻火，镇心安神。

方药：龙胆泻肝汤加减。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】

不寐-肝火扰心证



证候：不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤。舌红苔黄，脉弦而数。

治法：疏肝泻火，镇心安神。

方药：龙胆泻肝汤加减。

6. (1) 【正确答案】A

【答案解析】胸痹之寒凝心脉证

猝然心痛如绞，形寒，甚至手足不温，冷汗自出，心悸气短，或心痛彻背，背痛彻心。多因气候骤冷或骤遇风寒而发病或症状加重。苔薄白，脉沉紧或沉迟。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】胸痹-寒凝心脉证

证候：猝然心痛如绞，形寒，甚至手足不温，冷汗自出，心悸气短，或心痛彻背，背痛彻心。多因气候骤冷或骤遇风寒而发病或症状加重。苔薄白，脉沉紧或沉迟。

治则：辛温散寒，宣通心阳。

方药：枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤加减。

(3) 【正确答案】E

【答案解析】胸痹之寒凝心脉证

证候：猝然心痛如绞，形寒，甚至手足不温，冷汗自出，心悸气短，或心痛彻背，背痛彻心。多因气候骤冷或骤遇风寒而发病或症状加重。苔薄白，脉沉紧或沉迟。

治则：辛温散寒，宣通心阳。

方药：枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤加减。

7. (1) 【正确答案】C

【答案解析】根据患者的临床表现，进行性吞咽困难加重，胸骨后疼痛，呕吐痰涎，怀疑食



管癌的可能性大，内镜检查是诊断食管癌的最可靠方法。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】食管癌-痰气交阻证

证候：吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩。舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

治法：开郁化痰，润燥降气。

方药：启膈散加减。

(3) 【正确答案】C

【答案解析】食管癌-痰气交阻证

证候：吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩。舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

治法：开郁化痰，润燥降气。

方药：启膈散加减

8. (1) 【正确答案】C

【答案解析】患者有肝炎病史，并出现不明原因的肝区胀痛，查体见肝肿大质硬，边缘不规则，最主要的是 AFP 升高，根据以上信息可以初步考虑为原发性肝癌的可能性大。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】肝组织学检查可确诊原发性肝癌。

(3) 【正确答案】A

【答案解析】手术切除仍是目前根治原发性肝癌的最好方法。

9. (1) 【正确答案】D

【答案解析】褥疮之蕴毒腐溃证：褥疮溃烂，腐肉及脓水较多，或有恶臭，重者溃烂可深及



筋骨，四周漫肿，伴有发热或低热，口苦且干，形神萎靡，不思饮食等。舌质红，舌苔少，脉细数。治宜益气养阴，利湿托毒。方用生脉散、透脓散合萆薢渗湿汤加减。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】褥疮之蕴毒腐溃证：褥疮溃烂，腐肉及脓水较多，或有恶臭，重者溃烂可深及筋骨，四周漫肿，伴有发热或低热，口苦且干，形神萎靡，不思饮食等。舌质红，舌苔少，脉细数。治宜益气养阴，利湿托毒。方用生脉散、透脓散合萆薢渗湿汤加减。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】褥疮之蕴毒腐溃证：褥疮溃烂，腐肉及脓水较多，或有恶臭，重者溃烂可深及筋骨，四周漫肿，伴有发热或低热，口苦且干，形神萎靡，不思饮食等。舌质红，舌苔少，脉细数。治宜益气养阴，利湿托毒。方用生脉散、透脓散合萆薢渗湿汤加减。

10. (1) 【正确答案】D

【答案解析】妇女在绝经期前后，出现烘热汗出，烦躁易怒，头晕耳鸣，心悸失眠，或浮肿，便溏，纳呆，倦怠乏力，或伴月经紊乱等与绝经有关的症状，称为绝经前后诸证。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】绝经前后诸证之肾阴阳两虚证

证候：经断前后，时而畏寒恶风，时而潮热汗出，腰酸乏力，头晕耳鸣，五心烦热，月经紊乱，量少或多。舌红，苔薄，脉沉细。

治法：补肾扶阳，滋肾养血。

方药：二仙汤合二至丸。

(3) 【正确答案】C

【答案解析】绝经前后诸证之肾阴阳两虚证

证候：经断前后，时而畏寒恶风，时而潮热汗出，腰酸乏力，头晕耳鸣，五心烦热，月经紊



乱，量少或多。舌红，苔薄，脉沉细。

治法：补肾扶阳，滋肾养血。

方药：二仙汤合二至丸。

11. (1) 【正确答案】E

【答案解析】妊娠期间出现腰酸、腹痛、小腹下坠，或伴有少量阴道出血者，称为“胎动不安”。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】胎漏、胎动不安之肾虚证

证候：妊娠期阴道少量出血，色淡暗，腰酸，腹痛，下坠，或曾屡孕屡堕，头晕耳鸣，夜尿多，眼眶暗黑或有面部暗斑。舌淡暗，苔白，脉沉细滑，尺脉弱。

治法：补肾固冲，益气安胎。

方药：寿胎丸加党参、白术或安奠二天汤或滋肾育胎丸。

(3) 【正确答案】C

【答案解析】胎漏、胎动不安之肾虚证

证候：妊娠期阴道少量出血，色淡暗，腰酸，腹痛，下坠，或曾屡孕屡堕，头晕耳鸣，夜尿多，眼眶暗黑或有面部暗斑。舌淡暗，苔白，脉沉细滑，尺脉弱。

治法：补肾固冲，益气安胎。

方药：寿胎丸加党参、白术或安奠二天汤或滋肾育胎丸。

12. (1) 【正确答案】A

【答案解析】蛔虫病之蛔厥证

证候：有肠蛔虫症状。突然腹部绞痛，弯腰曲背，辗转不宁，肢冷汗出，恶心呕吐，常吐出胆汁或蛔虫。腹部绞痛呈阵发性，疼痛部位在右上腹或剑突下，疼痛可暂时缓解，但又反复



发作。舌苔多黄腻，脉弦数或滑数。

治法：安蛔定痛，继之驱虫。

主方：乌梅丸加减。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】蛔虫病之蛔厥证

证候：有肠蛔虫症状。突然腹部绞痛，弯腰曲背，辗转不宁，肢冷汗出，恶心呕吐，常吐出胆汁或蛔虫。腹部绞痛呈阵发性，疼痛部位在右上腹或剑突下，疼痛可暂时缓解，但又反复发作。舌苔多黄腻，脉弦数或滑数。

治法：安蛔定痛，继之驱虫。

主方：乌梅丸加减。

(3) 【正确答案】D

【答案解析】蛔虫病之蛔厥证

证候：有肠蛔虫症状。突然腹部绞痛，弯腰曲背，辗转不宁，肢冷汗出，恶心呕吐，常吐出胆汁或蛔虫。腹部绞痛呈阵发性，疼痛部位在右上腹或剑突下，疼痛可暂时缓解，但又反复发作。舌苔多黄腻，脉弦数或滑数。

治法：安蛔定痛，继之驱虫。

主方：乌梅丸加减。

13. (1) 【正确答案】B

【答案解析】病久肢体痿软不用，肌肉萎缩，腰膝酸软，头晕耳鸣，舌红绛，少苔，脉细数，为痿证之肝肾亏虚证。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】痿证主穴：病在上肢取肩髃、曲池、外关、合谷、颈胸部夹脊穴；病在下肢取



髀关、伏兔、足三里、阳陵泉、三阴交、腰部夹脊穴。

(3) 【正确答案】D

【答案解析】痿证配穴：肝肾亏虚加太溪、肝俞、肾俞。

14. (1) 【正确答案】B

【答案解析】天行赤眼之热毒炽盛

症状：患眼灼热疼痛，热泪如汤，胞脸红肿，白睛红赤壅肿，弥漫溢血，黑睛星翳；伴口渴心烦，便秘溲赤，舌红，苔黄，脉数。

治则：泻火解毒。

方药：普济消毒饮加减。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】天行赤眼之热毒炽盛

症状：患眼灼热疼痛，热泪如汤，胞脸红肿，白睛红赤壅肿，弥漫溢血，黑睛星翳；伴口渴心烦，便秘溲赤，舌红，苔黄，脉数。

治则：泻火解毒。

方药：普济消毒饮加减。

15. (1) 【正确答案】E

【答案解析】急喉风以吸气性呼吸困难为主要特征。属急危重症，其发病急、变化快、病情重，患者常可出现咽喉红肿疼痛、痰涎壅盛、语言难出、声如拽锯、汤水难下等症状，严重者可窒息死亡。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】急喉风之风热外袭，热毒内困

主证：咽喉肿痛，吞咽困难，继之汤水难下，言语不清，痰涎壅盛，咽喉堵塞，呼吸困难。



全身可见乏力，恶风，发热，头痛，舌质红，苔黄或黄厚，脉数。检查见咽喉黏膜呈鲜红色或紫红色，声门区红肿显著。

治则：疏风泻热，解毒消肿。

主方：清咽利膈汤加减。

16. (1) 【正确答案】A

【答案解析】该患者为左肩关节脱位，故首选的治疗措施是手法复位。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】肩关节脱位复位成功的标志：“方肩”畸形消失，肩部丰满，腋窝下、锁骨下、喙突下等摸不到肱骨头，搭肩试验阴性，肩关节被动活动恢复正常功能。X线片显示肱骨头与关节盂的关系正常。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

扫描二维码去做题





医学教育网咨询热线：010-82311666 400 650 1888



正保医学教育网
www.med66.com

医学教育网（www.med66.com）是正保远程教育旗下医学业务领域的核心品牌网站，是一家集医学类考试培训服务和政策动态信息服务的大型综合性医学辅导平台。

正保医学教育网目前已覆盖40类医学辅导、1000余门考培课程、累计注册学员近500万人，凭借雄厚的师资力量、先进的视频课件技术、严谨细致的教学作风及灵活多样的教学方式，为全国数百万医学从业人员提供了考证、从业和晋升等专业帮助，培养了大量医学人才。



官方微信号



课程免费体验



医学教育网App