


## 2022年《药学综合知识与技能》考情分析

一、2020~2022年《药学综合知识与技能》考题分析，各章节分值对比如下：



## 二、重点提示

从2022年的考试题目可以看出，17个章节的分值相比以前更均匀了，没有出现20分以上的章节，也没有出现1分甚至0分的章节，我们可以分为三个档次“10分及以上章节”“5~10分章节”“5分及以下章节”。

分档	涉及章节	总计分值
10分及以上章节	第五章、第六章、第七章、第十章	4章共53分
5~10分章节	第二章、第三章、第八章、第九章、第十三章、第十四章、十五章、十六章	7章共53分
5分及以下章节	第一章、第四章、第十一章、第十二章、第十七章	5章共14分

从以上统计可以看出，前两档共计12个章节（考察分值106分）是学习的重点，在2023年的学习上大家注意合理分配时间。

## 三、2023年考题分析

今年试卷的难度比去年简单，考试以基础知识点为主。2022年《药学综合

知识与技能》基础班课程，考点覆盖率达98%以上。详细如下：

对药物在更广泛的人群，更复杂的用药条件，更长期的用药时间，更多样的用药方案，以及用药时与停药后的各项临床指标进行检查的过程作为

- A. 临床前试验
- B. I 期临床试验
- C. II 期临床试验
- D. III 期临床试验
- E 上市后再评价

【答案】E

课程截图：

执业药师与药学服务

评价方法：

I 期    II 期    III 期    IV 期

上市后再评价——是对药物在更广泛的人群、更复杂的用药条件、更长期的用药时间、更多样的用药方案以及用药时与停药后的各项临床指标进行监察。

临床试验

患儿，男，5岁，诊断为急性细菌性扁桃体炎，儿科医师处方阿莫西林颗粒处方用纸的颜色应为

- A. 白色
- B. 淡黄色
- C. 淡绿色
- D. 淡红色
- E. 淡蓝色

【答案】C

课程截图：




患者，男，65岁，因乏力就诊，查血清电解质：血钾 24mmol/L 外周静脉滴注氯化钾治疗，需要将其稀释成 0.3% 的浓度。请计算 0.9% 氯化钠注射液 500ml 需加入 10% 氯化钾注射液的体积约是

- A. 50ml
- B. 30ml
- C. 20ml
- D. 15ml
- E. 10ml

【答案】D

课程截图：



关于抗幽门螺杆菌的四联疗法中药物使用时间说法正确的是

- A. 克拉霉素分别于早餐和晚餐前 30 分钟服用
- B. 阿莫西林分别于早餐和晚餐前 30 分钟服用
- C. 奥美拉唑分别于早餐和晚餐前 30 分钟服用
- D. 枸橼酸铋钾分别于早餐和晚餐后 30 分钟服用
- E. 四种药物均要餐后服用

【答案】C

课程截图:

**第九章 消化系统常见疾病**

**(一) 根除H.pylori 治疗的注意事项**

1. 为了确保检测结果的准确性和较高的根除率，尿素呼气试验和四联方案实施前——必须停用PPI至少2周，停用抗菌药物、铋剂和某些具有抗菌作用的中药至少4周。
2. H<sub>2</sub>受体阻断剂对尿素呼气试验的检测结果有轻微影响，抗酸药则无影响。
3. 四联方案的服药时间：2种抗菌药物——饭后即刻服用  
PPI和铋剂——饭前半小时服用

药物	常用剂量	服药时间	肝、肾功能不全剂量调整
<b>黏膜保护剂</b>			
硫糖铝	1g, 3~4次/日	片剂应嚼碎服用，混悬剂服用前混匀，餐前1小时及睡前服用	肾功能不全或透析患者慎用或不用
枸橼酸铋钾	150mg qid	餐前1小时及睡前服用	严重肾功能不全者禁用
胶体果胶铋	150mg qid	前三次于三餐前半小时，第四次于晚餐后2小时服用	严重肾功能不全者减量
吉法酯	50~100mg tid	饭后半小时	严重肝、肾功能不全者减量
替普瑞酮	50mg tid	饭后半小时	
瑞巴派特	100mg tid	早、晚餐前半小时及睡前	
米索前列醇	200μg qid	三餐前和睡前服用	无需调整剂量


患者，男，46岁，在静脉滴注万古霉素过程中出现“红人综合征”，可能的原因是

- A. IgE介导的速发型过敏反应

- B. 滴注速度过快, 导致组胺释放而引起的反应
- C. T 细胞介导的迟发型过敏反应
- D. 5-羟色胺综合征的表现
- E. 药物诱导血小板减少所致的微血栓表现

【答案】B

课程截图:



下列缓解儿童感冒症状的方法中, 不推荐的是

- A 使用布洛芬或对乙酰氨基酚退热
- B. 2岁及以上儿童, 可睡前在胸部和颈部涂抹含薄荷脑的软膏, 缓解鼻塞症
- C. 使用生理盐水冲洗鼻腔, 缓解鼻分泌物增多和鼻塞症状
- D. 布洛芬与对乙酰氨基酚交替使用, 减轻发热引起的不适
- E. 1岁及以上儿童睡前服用蜂蜜, 减轻咳嗽症状

【答案】D

课程截图:

第02讲 发热(二)

正保医学教育网  
www.med66.com

**常见病症的健康管理**

(二) 药物治疗

常用退热药: 对乙酰氨基酚、布洛芬

用药原则:

- 单药治疗: 一种不起效可换用另一种, 不建议合用或交替使用。
- 阿司匹林: 避免用于儿童退热, 可能引起Reye's综合征。



患者男 23 岁, 因寒战, 高热入院, 诊断为感染性心内膜炎, 血培养结果为草绿色链球菌, 静脉滴注青霉素钠。根据《中华人民共和国药典临床用药须知》规定, 用药前应进行皮肤过敏试验, 青霉素皮试液的浓度是

- A. 2000 单位/毫升
- B. 1000 单位/毫升
- C. 500 单位/毫升
- D. 200 单位/毫升
- E. 100 单位/毫升

【答案】C

课程截图:

第02讲 处方审核(一)

正保医学教育网  
www.med66.com

**药品调剂和药品管理**

表2-3 《中华人民共和国药典临床用药须知》中规定  
必须做皮肤敏感试验的常用药物、药液浓度与给药方法

药物名称	皮试药液浓度 ( ml )	给药方法与剂量
青霉素钾注射剂	500U	皮内0.1
青霉素钠注射剂	500U	皮内0.1ml
青霉素V钾片	500U	皮内0.1ml
普鲁卡因青霉素注射剂-青霉素	500U	皮内0.1ml
普鲁卡因青霉素注射剂-普鲁卡因	2.5mg	皮内0.1ml



### 三、2023 年的复习建议

今年处方颜色、发热使用药物和患者教育、抗高血压药的不良反应这些每年强调的重点依然在考试中占据重要地位, 是主要得分内容, 在 2023 年的复习中,

这些内容依然是要求优先掌握的。

另外，不同致病菌肺炎患者的给药方案的调整近些年比重增加，考察我们对于所学内容的灵活应用能力，各位在学习过程中注意举一反三、前后联系，注重实践能力的培养，复习过程需要有一个持续的学习安排，一口吃成个胖子是不现实的，循序渐进、日益积累才是明智的选择！



正保医学教育网

www.med66.com