

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2020 年第 11 期

1. 【问题】除了白蛋白输液不需要交叉配血血型外，还有哪种血液制品也是不需要的？

【解答】不需要进行血型鉴定和交叉配血实验的是人血白蛋白；输入血浆必须做血型鉴定但是不需要做交叉配血实验。

2. 【问题】软产道裂伤和子宫收缩乏力出血特点是什么？

【解答】软产道裂伤出血特点是出血发生在胎儿娩出后。软产道裂伤流出的血液能自凝，若裂伤损及小动脉，则血液呈鲜红色。

子宫收缩乏力出血特点是出现在胎盘剥离后，而胎盘未剥离前阴道不流血或仅有少量流血，胎盘剥离后因子宫收缩乏力使子宫出血过多，但血液凝固。产妇可出现失血性休克表现。检查腹部可见子宫软、轮廓不清，触不清宫底。

3. 【问题】宫颈糜烂的分型有哪几种？

【解答】宫颈糜烂根据糜烂深浅程度分 3 型。

单纯型糜烂指炎症初期鳞状上皮脱落后由单层柱状上皮覆盖，表面平坦；

颗粒型糜烂指炎症继续发展，腺上皮过度增生并伴有间质增生，糜烂面凹凸不平呈颗粒状；

乳突型糜烂指间质继续增生，糜烂面高低不平更加明显，呈乳突状突起。

根据糜烂面的面积大小将宫颈糜烂分为 3 度。

糜烂面积小于子宫颈面积的 1/3 为轻度糜烂；

糜烂面积占子宫颈面积的 1/3~2/3 为中度糜烂；

糜烂面积大于子宫颈面积的 2/3 为重度糜烂。

4. 【问题】肝性脑病分五期还是四期？

【解答】根据意识障碍程度、神经系统表现和脑电图改变，将肝性脑病分为五期：

0 期（潜伏期） 又称轻微肝性脑病，无行为、性格异常，无神经系统病理征，脑电图正常，只在心理测试或智力测试时有轻微异常。

1 期（前驱期） 轻度性格改变和行为失常，如欣快激动或淡漠、随地便溺。病人应答尚准确，但有时吐字不清且较缓慢。可有扑翼样震颤，脑电图多数正常。此期持续数天及数周，因症状不明显易被忽视。

2 期（昏迷前期） 以意识错乱、睡眠障碍、行为失常为主。定向力和理解力均减退，不能完成简单计算。言语不清，举止反常，多有睡眠时间倒错。甚至有幻觉、恐惧、躁狂。此期病人有明显神经系统体征，如腱反射亢进、肌张力增高、巴宾斯基征阳性，扑翼样震颤存

在，脑电图表现异常。

3 期（昏睡期） 以昏睡和精神错乱为主，大部分时间呈昏睡状态，但可唤醒。各种神经体征持续存在或加重，扑翼样震颤仍存在，肌张力增加，脑电图有异常表现，锥体束征呈阳性。

4 期（昏迷期） 神志完全丧失，不能唤醒。浅昏迷时，对疼痛刺激有反应，腱反射肌张力亢进，扑翼样震颤无法引出。深昏迷时，各种反射消失，肌张力降低，瞳孔散大，可出现阵发性惊厥、踝阵挛等。脑电图明显异常。

以上各期的分界不很清楚，前后期临床可有重叠。肝功能损害严重的肝性脑病常有明显黄疸、出血倾向、肝臭，易并发各种感染。

