

医学教育网中医确有专长《答疑周刊》2019 年第 42 期

【中医基础理论】

 属阳的脉象是

A. 沉

B. 涩

C. 洪

 D. 细

E. 小

学员提问：为什么 C

答案及解析：本题答案为 C

脉象分阴阳：辨脉之部位、动态、至数、形状也可以分辨病证的阴阳属性。【医学教育网原创】如以部位分，寸为阳，尺为阴；以动态分，则至者为阳，去者为阴；以至数分，则数者为阳，迟者为阴；以形状分，则浮大洪滑为阳，沉涩细小为阴。

故本题答案选 C。

 **【中医诊断学】**

巅顶部位头痛属于

A. 太阳头痛

B. 阳明头痛

C. 少阳头痛

D. 厥阴头痛

E. 少阴头痛

 **学员提问：**为什么选 D

答案及解析：本题答案为 D

根据头痛部位不同，可辨识病在何经：（1）后头部连项痛：属太阳经头痛。（2）前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。（3）侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。（4）巅顶痛：属厥阴经头痛。（5）头痛连齿者：属少阴经头痛。【医学教育网原创】

 故本题答案选 D。
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【中药学】

补养药其煎煮方法宜选用的是

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

A. 武火久煎

 医学教育网
www.med66.com

B. 武火急煎

C. 文火慢煎

 医学教育网
www.med66.com

D. 武火慢煎

E. 文火略煎

 医学教育网
www.med66.com

学员提问：为什么选 C

 医学教育网
www.med66.com

答案及解析：本题答案 C。

一般来讲，解表药、清热药宜武火煎煮，时间宜短，煮沸后煎 3~5 分钟即可；补养药需用文火慢煎，时间宜长，煮沸后再续煎 30~60 分钟。【医学教育网原创】

 医学教育网
www.med66.com

故本题答案选 C。

 医学教育网
www.med66.com

【方剂学】

《伤寒论》原著中，半夏泻心汤证的成因是

A. 桂枝汤证过汗

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

B. 桂枝汤证误下

C. 小承气汤误下

D. 小柴胡汤证误下

 医学教育网
www.med66.com

E. 大承气汤证应下失下

 医学教育网
www.med66.com

学员提问：为什么选 D

答案及解析：本题答案为 D

半夏泻心汤证的形成，在于少阳证误用下法，损伤了脾胃之气，少阳邪热乘虚内犯，以致寒热错杂，气机痞塞而成，表现为“但满而不痛”。【医学教育网原创】

医学教育网
www.med66.com
本题答案选 D。

【中医骨伤科】

当手法复位困难时，允许存在一定的侧方移位，但在干骺端骨折对位不应少于

A. 1/3

B. 2/3

C. 2/4

D. 3/4

E. 1/4

学员提问：为什么选 D

答案及解析：本题答案为 D

功能复位的标准是：

①对线：骨折部位的旋转移位必须完全矫正；成角移位若与关节活动方向一致，日后可在骨痂改造塑形期有一定的矫正和适应，但成人不宜超过 10° ，儿童不宜超过 15° ；【医学教育网原创】成角若与关节活动方向垂直，日后不能矫正和适应，故必须完全复位；膝关节的关节面应与地面平行，否则关节内、外两侧在负重时所受压力不均，日后可以继发损伤性关节炎，引起疼痛及关节畸形。【医学教育网原创】上肢骨折在不同部位，要求亦不同，肱骨干骨折一定程度成角对功能影响不大；前臂双骨折若有成角畸形将影响前臂旋转功能。②对位：长骨干骨折，对位至少应达 1/3 以上；干骺端骨折对位至少应达 3/4 左右。③长度：儿童处于生长发育时期，下肢骨折缩短 2cm 以内，若无骨骺损伤，可在生长发育过程中自行矫正；成人则要求缩短移位不超过 1cm。

故本题答案选 D。