

2020 年口腔执业助理医师：《答疑周刊》第 17 期

【口腔修复学】

在义齿修复前常需进行骨性隆突修整的部位中不包括

- A. 上颌结节
- B. 上颌唇侧
- C. 磨牙后垫
- D. 下颌双尖牙舌侧
- E. 拔牙创部位

【正确答案】 C

【答案解析】 义齿修复前常需进行牙槽骨的上颌结节、上颌唇侧、下颌双尖牙舌侧、拔牙创部位进行修整。骨隆突常发生在：①下颌前磨牙舌侧，一般双侧对称，也可为单侧，其大小不一，也称为下颌隆突；②腭中缝处，呈嵴状隆起，也称为腭隆突；③上颌结节，结节过度增生形成较大的骨性倒凹。对双侧上颌结节肥大的情况，常常只需修整一侧上颌结节，解决妨碍义齿就位的问题即可。

【口腔修复学】

修复前口腔的一般处理不包括

- A. 保证良好的口腔卫生
- B. 牙齿选磨
- C. 拆除不良修复体
- D. 治疗和控制龋病及牙周病
- E. 处理急性症状

【正确答案】 B

【答案解析】 修复前准备口腔的一般处理 是指经过全面检查、诊断之后，按照拟定的口腔修复设计，对口腔组织的病理情况或影响修复效果的情况进行适当的处理，以保证预期效果。其具体包括以下四项：①处理急性症状（牙外伤、急性牙髓炎及慢性牙髓炎急性发作、牙槽脓肿，以及颞下颌关节紊乱病等引起的不适）；②保证良好的口腔卫生；③拆除不良修复体；④治疗和控制龋病及牙周病。

【药理学】

凡与用药目的无关，并为病人带来不适或痛苦的反应统称为

- A. 副作用
- B. 毒性反应
- C. 停药反应
- D. 变态反应

E. 药物不良反应

【正确答案】 E

【答案解析】 凡与用药目的无关，并为病人带来不适或痛苦的反应统称为药物不良反应。

【药理学】

药物出现副作用的主要原因是

A. 药物剂量过大

B. 药物的选择性低

C. 病人对药物过敏

D. 药物代谢的慢

E. 药物排泄的慢

【正确答案】 B

【答案解析】 副作用：由于药物的选择性低，药理效应涉及多个器官，当某一效应用做治疗目的时，其他效应就成为副作用。