

护士执业资格考试《答疑周刊》2020 年第 17 期

1. 【问题】学员提问: 幽门螺杆菌感染性胃炎的治疗?

【解答】常应用两种抗生素如阿莫西林、克拉霉素、替硝唑等和(或)枸橼酸铋钾二联或三联治疗。

2. 【问题】学员提问: 洋地黄药物毒性反应?

【解答】胃肠道表现: 食欲下降、恶心、呕吐等。

神经系统表现: 视力模糊、黄视绿视、头晕、头痛等。

心血管系统表现: 是较严重的毒性反应, 常出现各种心律失常, 室早二联律最为常见, 常有室上性心动过速伴房室传导阻滞、窦性心动过缓等。长期心房颤动病人使用洋地黄后心律变得规则, 心电图 ST 段出现鱼钩样改变, 应注意有发生洋地黄中毒的危险。

3. 【问题】学员提问: 急性心力衰竭患者典型临床表现?

【解答】突发严重呼吸困难、大量粉红色泡沫痰、两肺满布湿啰音。

护理措施: 置病人于两腿下垂坐位或半卧位, 以减少静脉回流。吸入高流量(6~8L/min)氧气, 加入 20%~30%乙醇湿化, 降低肺泡及气管内泡沫的表面张力, 使泡沫破裂, 改善肺通气。

4. 可出现反常呼吸运动的是

- A. 脓胸
- B. 桶状胸
- C. 漏斗胸
- D. 连枷胸
- E. 血气胸

【正确答案】D

【学员问题】老师, 反常呼吸运动是什么?

【解答】反常呼吸运动是一种病理的呼吸运动, 是胸部外伤后至胸部多根多处肋骨骨折, 使胸壁失去完整肋骨支撑而软化所致, 正常人在吸气时胸廓抬起, 呼气时胸壁下降; 反常呼吸运动正好相反, 在吸气时胸廓下降, 呼气时胸壁抬起。在胸外伤, 多处多根肋骨骨折时, 胸廓的完整性遭到破坏, 导致胸部伤处软组织失去胸廓的支撑, 出现反常呼吸, 即随呼气外凸, 吸气时凹陷, 又被称为连枷胸。

5. 患者男性，30 岁，在高空劳作时不慎跌落，意识丧失，心音消失，脉搏触不到，在对其进行开放气道时应采取

A. 托颌法

B. 仰头举颏法

C. 抬颌法

D. 举颌法

E. 后仰法

【正确答案】A

【学员问题】老师，什么时候用仰头举颏法、什么时候用托颌法？

【解答】若无颈部损伤，用仰头抬颏法打开气道；若有颈部损伤，用双手托颌法。患者从高空坠落，可能会有颈部损伤，所以采用双手托颌法。