

## 医学教育网初级护师:《答疑周刊》2020 年第 16 期

1. 【问题】瞳孔缩小。瞳孔睁大, 瞳孔大小不等分别见于哪些病?

【解答】瞳孔缩小 ( $<2\text{mm}$ ) 常见于虹膜炎、有机磷农药中毒、毒蕈中毒, 以及吗啡、氯丙嗪、毛果云香碱等药物影响; 瞳孔扩大 ( $>5\text{mm}$ ) 见于外伤、青光眼绝对期、视神经萎缩、完全失明、濒死状态、颈交感神经刺激和阿托品、可卡因等药物影响。颅内出血最为严重, 常表现头痛、呕吐、瞳孔大小不等、瘫痪, 甚至昏迷或突然死亡。

2. 【问题】隔离消毒的原则?

【解答】隔离消毒的原则:

(1) 明确清洁与污染的概念, 病室门口和病床要悬挂隔离标志。门口备有泡手的消毒液及洒有消毒液的擦鞋垫和挂隔离衣用的立柜或壁橱。

(2) 进入隔离区按规定戴工作帽、口罩及穿隔离衣。穿隔离衣前, 备齐所用物品, 不易消毒的物品应放入塑料袋内避污, 穿隔离衣后, 只能在规定的范围内活动。

(3) 病室内每日须用紫外线行空气消毒一次, 或用消毒液喷洒消毒。每日晨起后用 1% 氯胺溶液或其它消毒液擦拭病床及床旁桌椅。

(4) 病室内污染物品必须先经过消毒后进行清洁处理。任何物品均不可放在地上, 已经在地上或落地的物品视为污染, 必须经过消毒后再用。病人接触过的用物, 须经严格消毒后方可递交, 病人的信件、票证、书籍等须经熏蒸消毒处理后才能重新使用。

(5) 病人的传染性分泌物经培养三次, 结果为阴性或确已渡过隔离期, 经医生开出医嘱解除隔离。解除隔离后病人经过沐浴更衣方可离开, 病室所有用物必须终末消毒。

(6) 终末消毒分类进行。将布类包好注明隔离用物送洗衣房消毒清洗; 茶壶、脸盆、痰杯煮沸消毒; 被褥枕芯曝晒 6 小时或晾在阳台 24 小时; 用通风或紫外线照射形式空气消毒, 必要时以福尔马林熏蒸消毒。熏后通风, 再以 1% 氯胺溶液擦拭床单位。

3. 【问题】诊断脑死亡的标准?

【解答】脑死亡标准是:

1. 无感受性及反应性。

2. 无运动、无呼吸。

3. 无反射。

4. 脑电波平坦。

上述标准 24 小时内反复复查无改变, 并排除体温低于  $32^{\circ}\text{C}$  及中枢神经抑制剂的影响, 即可

作出脑死亡的诊断。

4. 【问题】以下胎盘功能，与绒毛膜促性腺激素 (HCG) 相关的是

A. 气体交换

B. 营养物质供应

C. 排出胎儿代谢产物

D. 防御功能

E. 合成功能

【解答】选择 E。胎盘的功能 (1) 气体交换：氧气是维持胎儿生命的最重要物质。(2) 营养物质供应：替代胎儿的消化系统功能。(3) 排出胎儿代谢产物：替代胎儿的泌尿系统功能。(4) 防御功能：母血中的免疫物质如 IgG 可以通过胎盘，使胎儿得到抗体，对胎儿起保护作用。(5) 合成功能：胎盘能合成数种激素和酶。