

## 医学教育网初级护师:《答疑周刊》2020 年第 17 期

1. 【问题】肝硬化患者腹腔穿刺放腹水的量第一次不超过

A. 1000ml

B. 2000ml

C. 3000ml

D. 4000ml

E. 5000ml

不是 1000ml 吗?

【解答】腹腔穿刺放腹水: 为减轻症状可行穿刺放腹水, 但会丢失蛋白质, 且短期内腹水又复原, 应同时给白蛋白静脉点滴, 可提高疗效。一般第一次放腹水的量不超过 3000ml, 同时静脉点滴白蛋白 40~60g。是 3000 没有问题。

2. 【问题】主动脉骑跨是跨在哪两个地方?

【解答】主动脉骑跨是指: 心脏的正常生理位置为右心室在前, 左心室偏后, 正常情况下血液由上腔静脉流入右心房——右心室——经由肺动脉流入肺脏进行气体交换——再由肺静脉流回左心房——左心室——泵入主动脉流向全身。

正常情况下由左心室发出, 主动脉骑跨时向右前移位跨于两心室之上。常说的骑跨度即指主动脉骑跨右心室的程度。为右心室, 即是室间隔, 主动脉骑跨往往伴有室间隔缺损或移位, 使骑跨程度更为严重。

在法洛氏四联症中, 主动脉骑跨包括三种内容:

①主动脉瓣顺时针转位, 较正常位置转向右侧; ②主动脉瓣右侧移位, 比正常骑跨于右心室上较多。③圆锥室间隔向右前移位, 所以主动脉起源于两心室, 骑跨于室间隔缺损之上。如骑跨在 90%以上, 需作心内隧道, 故在心血管外科中被列入右心室双出口范围内。

3. 【问题】喘息型慢性支气管炎病人合理使用支气管扩张剂后, 仍有明显呼吸道阻塞时, 应使用

A. 抗生素

B. 镇咳剂

C. 祛痰剂

D. 糜蛋白酶

E. 肾上腺皮质激素

【解答】选择 E。喘息型慢性支气管炎合理使用支气管扩张剂后，仍有明显的呼吸道阻塞或反复发作时，应使用肾上腺皮质激素。

【继续提问】为什么？

【解答】和它的药理作用有关：糖皮质激素可以从多个环节抑制气道炎症，是对气道过敏反应炎症上作用最强的抗炎剂。此外，尚有抗过敏（减少组胺）、抗微血管渗漏和间接松气道平滑肌的作用。

4. 【问题】疱疹性咽峡炎是什么可以帮我解释一下吗？

【解答】疱疹性咽峡炎：病原体为柯萨奇 A 组病毒，好发于夏秋季。主要表现为急起高热、咽痛、流涎、拒食等。体检可见咽充血，咽腭弓、腭垂、软腭等处黏膜上有 2~4mm 大小灰白色的疱疹，周围有红晕，疱疹破溃后形成小溃疡。病程 1 周左右。