

医学教育网初级护师:《答疑周刊》2020 年第 18 期

1. 【问题】小儿先心病法洛四联症为何检查出现红细胞计数和血红蛋白增多?

【解答】法洛四联症血液检查: 血红蛋白、红细胞计数、血细胞比容均升高, 查血常规时会出现。

2. 【问题】长期卧床心力衰竭病人, 水肿部位为什么是腰骶部呢?

【解答】水肿先出现在身体下垂部位, 一般病人易出现在双下肢, 卧床病人常出现于枕部、肩胛部及腰骶部等, 严重水肿病人可出现胸腔和腹腔的积液。心力衰竭患者, 活动受限, 所以需要长期卧床。平卧位或者端坐卧位时, 肯定最直接的受压的部位是骶尾部, 骶尾部的骨突处, 脂肪相对过少, 长期受压容易出现压疮, 导致局部皮肤会发红。

3. 【问题】未母乳喂养或未做到及时有效的母乳喂养的产妇, 通常可于产后 3~4d 因乳房血管、淋巴管极度充盈可有发热, 称为

A. 产褥热

B. 产后热

C. 泌乳热

D. 乳腺炎

E. 产褥感染

【解答】选择 C。乳汁产后 3~4 天增多, 由于乳房极度充盈、胀大, 体温可达 37.8~39℃, 称泌乳热, 一般持续 4~16h 下降, 不属病态。

4. 【问题】一般儿童病人输液速度为

A. 10~15 滴

B. 20~40 滴

C. 40~60 滴

D. 70~80 滴

E. 85~90 滴

【解答】选择 B。根据年龄、病情及药物性质调节滴速, 一般成人每分钟 40~60 滴, 儿童每分钟 20~40 滴。