



2020 年公卫执业助理医师: 《答疑周刊》第 21 期

【妇女保健学】

功能失调性子宫出血发病因素不包括

- A. 下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱致
- B. 由于器质性病变引起
- C. 环境变化
- D. 气候骤变、过度劳累
- E. 营养不良

【正确答案】B

【答案解析】青春期功血大多数是月经周期、月经量及持续时间的异常。

【妇女保健学】

青春期功能性子宫出血的原因多为

- A. 子宫肌瘤
- B. 下丘脑-垂体-卵巢功能紊乱
- C. 卵巢肿瘤
- D. 生殖器感染
- E. 垂体肿瘤

【正确答案】B

【答案解析】功能性子宫出血，简称功血，是一种常见的妇科疾病，是指异常的子宫出血，经诊查后未发现有全身及生殖器官器质性病变，而是由于神经内分泌系统功能失调所致。表现为月经周期不规律、经量过多、经期延长或不规则出血。

【临床综合】

诊断冠心病心绞痛最常用的非创伤性检查方法是

- A. 休息时心电图
- B. 24 小时动态心电图
- C. 心电图运动负荷试验
- D. 超声心动图
- E. 心脏 CT 检查

【正确答案】C

【答案解析】心电图负荷试验：是诊断冠心病最常用的非创伤性检查方法。增加心脏负担以激发心肌缺血。运动方式主要有分级运动平板或蹬车。心电图改变主要以 ST 段水平型或下斜型压低 $\geq 0.1\text{mV}$ （从 j 点后 0.06~0.08 秒）持续 2 分钟作为阳性标准。运动中出现步态不稳，室性心动过速或血压下降时，应即停止运动。心肌梗死急性期，不稳定型心绞痛，心力衰竭，严重心律失常或急性疾病者禁作运动试验。

【临床综合】

成人高血压的诊断标准是

- A. $\text{BP} \geq 18.6/12\text{kPa}$ (140/90mmHg)
- B. $\text{BP} \geq 20/18\text{kPa}$ (150/90mmHg)
- C. $\text{BP} \geq 21.3/12\text{kPa}$ (160/90mmHg)
- D. $\text{BP} \geq 21.3/12.6\text{kPa}$ (160/95mmHg)
- E. $\text{BP} \geq 22/12.6\text{kPa}$ (165/95mmHg)

【正确答案】A

【答案解析】18 岁以上成年人高血压定义为：在未服抗高血压药物情况下，收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 。

