

医学教育网初级护师:《答疑周刊》2020 年第 21 期

1. 【问题】内痔分为几期? 依据是什么?

【解答】内痔 位于齿状线以上, 表面覆盖直肠黏膜。好发于直肠下端的左侧、右前或右后方(截石位 3、7、11 点)。主要表现为排便时无痛性出血和痔块脱出, 分为 4 期。I 期: 以排便时无痛性出血, 痔块不脱出肛门外。II 期: 便血加重, 严重时呈喷射状, 排便时痔块脱出, 但便后能自行回纳。III 期: 便血量常减少, 痔块脱出不能自行回纳, 需用手托回。IV 期: 痔块长期脱出于肛门外, 或回纳后又即脱出。当痔块继发感染时局部有疼痛; 若痔块脱出被痉挛的括约肌嵌顿时, 疼痛明显。直肠指检常不能触及, 肛门镜检查可见暗红色、质软的半球形肿物。

2. 【问题】肢体抬高试验是什么?

【解答】肢体抬高试验: 方法是让病人平卧, 下肢抬高 45° , 3 分钟后观察足部皮肤色泽变化。若出现足趾皮肤呈苍白或蜡黄色、自觉麻木疼痛, 让病人坐起, 下肢自然下垂于床沿, 足部皮肤出现潮红或发绀者为阳性。有严重供血不足的肢体, 常出现以上表现。

3. 【问题】意识障碍分级标准?

【解答】

(1). 嗜睡 最轻度的意识障碍。病人处于持续睡眠状态, 但能被言语或轻度刺激唤醒, 醒后能正确、简单而缓慢地回答问题, 但反应迟钝, 刺激去除后又很快入睡。

(2). 意识模糊 其程度较嗜睡深, 表现为思维和语言不连贯, 对时间、地点、人物的定向力完全或部分发生障碍, 可有错觉、幻觉、躁动不安、谵语或精神错乱。

(3). 昏睡 病人处于熟睡状态, 不易唤醒。压迫眶上神经、摇动身体等强刺激可被唤醒, 醒后答话含糊或答非所问, 停止刺激后即又进入熟睡状态。

(4). 昏迷 最严重的意识障碍, 按其程度可分为: ①浅昏迷: 意识大部分丧失, 无自主运动, 对声、光刺激无反应, 对疼痛刺激(如压迫眶上缘)可有痛苦表情及躲避反应。瞳孔对光反射、角膜反射、眼球运动、吞咽反射、咳嗽反射等可存在。呼吸、心跳、血压无明显改变, 可有大小便失禁或潴留。②深昏迷: 意识完全丧失, 对各种刺激均无反应。全身肌肉松弛, 肢体呈弛缓状态, 深浅反射均消失, 偶有深反射亢进及病理反射出现。机体仅能维持循环与呼吸的最基本功能, 呼吸不规则, 血压可下降, 大小便失禁或潴留。

4. 【问题】结肠癌和直肠癌的早期表现是什么?

【解答】结肠癌最早出现的症状是排便习惯及粪便性状的改变, 多表现为排便次数增加, 腹

泻、便秘、粪便中带脓血或黏液。

直肠癌早期直肠癌主要表现为排便习惯改变和便血，病人便意频繁、便前肛门下坠感、里急后重、排便不尽感等。

