

中医内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第28期

问题索引:

1. 疾病发生的内在因素
2. 肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是
3. 通达十二经, 为开窍醒神之要药的药物是
4. 正常成人心尖搏动范围的直径约为
5. 临床上常见的八纲相兼证候不包括

1. 疾病发生的内在因素

- A. 邪气亢盛
- B. 正气旺盛
- C. 正气不足
- D. 邪气损正
- E. 正气抗邪

【答案】C

【解析】正气不足是疾病发生的内在因素, 中医发病学重视人体的正气, 认为正气旺盛, 气血充盈, 卫外[医学教育网]固密, 病邪难于侵入, 疾病无从发生, 《素问·刺法论》说: “正气存内, 邪不可干。”

www.med66.com

2. 肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是

- A. 0.1~0.3g、0.5~1g
- B. 1~2g、0.1~1g
- C. 1~4.5g、1~2g
- D. 5~15g、3~6g

E. 以上都不是

【答案】C

【解析】肉桂用[医学教育网]法用量：煎服，1～4.5g，宜后下或焗服；研末冲服，每次1～2g。

3. 通达十二经，为开窍醒神之要药的药物是

- A. 牛黄
- B. 郁金
- C. 麝香
- D. 苏合香
- E. 水牛角

【答案】C

【解析】麝香通[医学教育网]达十二经，为开窍醒神之要药。

4. 原发性红细胞及血红蛋白绝对性增多，见于

- A. 0.5～1.0cm
- B. 1.0～1.5cm
- C. 1.5～2.0cm
- D. 2.0～2.5cm
- E. 2.5～3.0cm

【答案】D

【解析】正常成人[医学教育网]尖搏动，搏动范围的直径约为2.0～2.5cm。

5. 临床上常见的八纲相兼证候不包括

- A. 表实寒证
- B. 里实热证
- C. 里虚寒证
- D. 里实寒证
- E. 寒热错杂证

【答案】E

【解析】临床常见的八纲相兼证候有表实寒证[医学教育网]、表实热证、里实寒证、里实热证、里虚寒证、里虚热证等，其临床表现一般是有关纲领证候的相加。选项 E 属于八纲中表里寒热虚实的错杂关系，是证候错杂中的内容，不属于证候相兼的范畴。